

ГАТИЛОН®

НОВИНКА

Гатифлоксацин
Раствор для приема внутрь

ФТОРХИНОЛОН ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ГАТИФЛОКСАЦИНА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ
ЭТИОЛОГИИ У ПТИЦ И СВИНЕЙ

По рецепту



НОВЫЙ УРОВЕНЬ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
КОГДА ДРУГИЕ НЕ РАБОТАЮТ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ





АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

Гатилон®



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая чувствительность полевых штаммов возбудителей АПП, бронхита и микоплазменных инфекций
- Преодолевает резистентность к предыдущим поколениям фторхинолонов
- Целенаправленно накапливается и длительно сохраняется в тканях дыхательной системы, что обеспечивает пролонгированный эффект
- Эффективен при ротации с флорфениколами
- Не снижает водопотребление животных


ОПИСАНИЕ

По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от зелено-желтого до коричнево-желтого цвета.

Гатилон® выпускают расфасованным по 1 л в полимерные бутылки и по 5 л в полимерные канистры соответствующей вместимости, укупоренные навинчиваемыми полимерными крышками с контролем первого вскрытия.

Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению препарата.

СОСТАВ



100 мг гатифлоксацин

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Гатифлоксацин, входящий в состав препарата, оказывает бактерицидное действие:

на аэробные грамположительные микроорганизмы

- *Arcanobacterium* spp.
- *Bacillus* spp.
- *Corynebacterium* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Listeria* spp.
- *Listeria monocytogenes*
- *Staphylococcus* spp.
- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus* spp.
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus dysgalactiae*
- *Streptococcus suis*
- *Streptococcus uberis*

на аэробные грамотрицательные микроорганизмы

- *Acinetobacter* spp.
- *Actinobacillus* spp.
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Aeromonas* spp.
- *Borrelia* spp. (спирохеты)
- *Bordetella* spp.
- *Brachyspira* spp.
- *Brachyspira hyodysenteriae*
- *Brachyspira pilosicoli*.
- *Campylobacter* spp.
- *Citrobacter* spp.
- *Enterobacter* spp.
- *Escherichia coli*
- *Haemophilus* spp.
- *Haemophilus ducreyi*
- *Haemophilus influenzae*
- *Haemophilus parainfluenzae*
- *Klebsiella* spp.
- *Leptospira* spp.
- *Moraxella* spp.
- *Moraxella catarrhalis* β +/ β -
- *Morganella* spp.
- *Morganella morganii*
- *Neisseria* spp.
- *Pasteurella* spp.
- *Proteus* spp.
- *Proteus mirabilis*
- *Proteus vulgaris*
- *Providencia* spp.
- *Pseudomonas* spp.
- *Salmonella* spp.
- *Serratia* spp.

на анаэробные микроорганизмы

- *Bacteroides* spp.
- *Bacteroides fragilis*
- *Clostridium* spp.
- *Clostridium perfringens*
- *Fusobacterium* spp.
- *Peptostreptococcus* spp.

другие микроорганизмы

- *Chlamydia* spp.
- *Chlamydia pneumoniae*
- *Chlamydia psittaci*
- *Mycobacterium* spp.
- *Mycoplasma* spp.
- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Rickettsia* spp.
- *Ureaplasma* spp.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Гатифлоксацин действует бактерицидно, воздействуя на процессы репликации бактериальной ДНК (мишенью являются топоизомеры II и IV, которые осуществляют изменение пространственной конфигурации молекулы ДНК на различных этапах ее репликации). Взаимодействуя с топоизомеразой IV, вызывает разрыв молекулы ДНК уже после репликации. Выведение из строя любой из топоизомераз обуславливает гибель бактериальной клетки.

Гатифлоксацин хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта. Прием корма мало влияет на скорость и полноту абсорбции. Биодоступность гатифлоксацина после перорального приема составляет 96%, концентрация в сыворотке крови достигает максимума через 1-2 часа, период полувыведения находится в диапазоне 7-14 часов. Быстрое распределение гатифлоксацина в тканях приводит к его более высоким концентрациям в большинстве органов-мишеней, чем в сыворотке крови. Гатифлоксацин хорошо проникает во многие ткани и жидкости организма (в т. ч. альвеолярную и легочную ткань, половые органы).

Выводится из организма преимущественно в неизменном виде с мочой и частично с фекалиями.

Гатилон® по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гатилон® применяют свиньям, цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур для лечения бактериальных инфекций.



СВИНЬЯМ – для лечения бактериальных заболеваний:

- органов дыхания (в т.ч. актинобациллярной плевропневмонии, энзоотической пневмонии, стрептококковой пневмонии)
- желудочно-кишечного тракта (в т.ч. сальмонеллезе, колибактериозе)
- мочеполовой системы
- инфекций кожи и мягких тканей
- при спирохетозе, стрептококкозе, псевдомонозе и микоплазменных инфекциях
- других заболеваний, вызываемых чувствительными к гатифлоксацину возбудителями



ЦЫПЛЯТАМ-БРОЙЛЕРАМ И РЕМОНТНОМУ МОЛОДНЯКУ КУР ПРИ:

- микоплазмозе
- сальмонеллезе
- колибактериозе
- дизентерии
- некротическом энтерите
- псевдомонозе
- кампилобактериозе
- стафилококкозе
- пастереллезе
- других заболеваниях, вызванных чувствительными к гатифлоксацину возбудителями

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ВИД ЖИВОТНОГО	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	ДОЗИРОВКА	КУРС ЛЕЧЕНИЯ
Свиньи	перорально индивидуально или групповым способом с водой для поения	в дозе 0,1 мл препарата на 1 кг массы тела животного (10 мг гатифлоксацина на 1 кг массы тела животного)	ежедневно в течение 2-3 дней. При сложных и сочетанных инфекциях возможно продление курса до 5 дней
Птица			

В период лечения животные должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат.

В целях предотвращения распространения заболеваний допускается назначение препарата в терапевтической дозе группам животных, контактирующим с больными животными и не имеющим клинических признаков заболевания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Гатилон® не допускается одновременно применять с препаратами, содержащими цинк, магний, алюминий, железо, из-за возможного снижения адсорбции гатифлоксацина в желудочно-кишечном тракте животного.

Рекомендуемый промежуток времени между приемом гатифлоксацина и вышеперечисленными лекарственными средствами должен составлять не менее четырех часов.

Запрещается одновременное применение лекарственного препарата с глюкокортикоидами из-за повышения риска развития тендинита и/или разрыва сухожилий, с нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами из-за повышения риска побочных эффектов со стороны центральной нервной системы, а также с эритромицином из-за повышения риска нарушений ритма сердца.

При одновременном применении с антагонистами витамина К, например – варфарином, повышаются риски кровотечения. Учитывая это, необходимо осуществлять контроль показателей коагуляции.

Препарат не применяется курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур, яйца которых будут использоваться в пищу менее чем за 16 суток до начала яйцекладки, в связи с накоплением гатифлоксацина в яйцах. Противопоказанием к применению препарата Гатилон® является повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата, выраженная печеночная и/или почечная недостаточность.

ОГРАНИЧЕНИЯ



14 суток



16 суток



16 суток

Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанного срока, а также яйца, полученные до истечения указанного срока, могут быть использованы для кормления плотоядных животных.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки - 30 суток. Гатилон® запрещается применять по истечении срока годности.

[illegible]

[illegible]

НИТА-ФАРМ – КЛЮЧЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ РОССИИ

В тесном взаимодействии с ветеринарными
врачами-практиками мы глубоко изучаем
потребности рынка и лучшие мировые
инновации

30+
ЛЕТ НА РЫНКЕ

Наша цель – не просто достигнуть высочайшего
качества, но и превзойти ожидания наших
клиентов, предоставляя им лучшие продукты,
которые делают мир лучше каждый день



**МЫ – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ
НОВЫХ ПРОДУКТОВ
В РОССИИ**

20 НОВИНОК
за 2025 год

22
ПАТЕНТОВАННЫХ
ПРОДУКТА

ВСЕ О НОВИНКАХ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

САЙТ



WWW.NITA-FARM.RU

ВКОНТАКТЕ



@nitafarm

ТЕЛЕГРАМ



@nita_farm

MAX



@nitafarm