

# ЦЕФТОНИТ®

**Цефтиофур 5%**  
Суспензия для инъекций

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ  
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО МОЛОКУ



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ





АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ

# Цефтонит®

Здоровье без ограничений



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подтвержденная эффективность лечения маститов
- **Без ограничений** по молоку
- Быстрое достижение максимальной концентрации через 1-2 часа
- Экономичная дозировка

## ОПИСАНИЕ

Цефтонит - антибактериальный препарат широкого спектра действия **без ограничений** по молоку.

## СОСТАВ



50 мг цефтиофура

## ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефтиофур, входящий в состав препарата Цефтонит, оказывает бактерицидное действие на широкий спектр грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу, и некоторые анаэробные бактерии. Цефтиофура гидрохлорид после введения быстро подвергается метаболизму с образованием десфуриилцефтиофура, который обладает биологической активностью в отношении микроорганизмов.

## ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


Цефтонит применяют с лечебной целью: крупному рогатому скоту при бактериальных инфекциях органов дыхания, вызываемых *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, некробактериоза, ассоциированного с *Fusobacterium necrophorum* и *Porphyromonas assacharolytica* (*Bacteroides melaninogenicus*), и острого эндометрита, свиньям при инфекциях органов дыхания, вызываемых *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* и *Streptococcus suis*, а также других заболеваний, возбудители которых чувствительны к цефтиофуру.

## ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

| Вид животного | Показания                 | Дозировка     | Способ и кратность введения  | Длительность курса |
|---------------|---------------------------|---------------|------------------------------|--------------------|
| КРС           | Респираторные заболевания | 1 мл на 50 кг | Подкожно, 1 раз в сутки      | От 3 до 5 дней     |
|               | Некробактериоз            |               |                              | В течение 3 дней   |
|               | Эндометрит                |               |                              | В течение 5 дней   |
| Свиньи        | Респираторные заболевания | 1 мл на 16 кг | Внутримышечно, 1 раз в сутки | В течение 3 дней   |

*Низкая дозировка: удобство применения + экономия затрат*

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФТОНИТ



*Отсутствие необходимости отбраковки молока позволяет исключить экономические потери*

## ПОКАЗАТЕЛИ СЕКРЕТА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОРОВ

|  | До введения | Через 24 часа | Через 48 часов | Через 72 часа | Через 144 часа |
|--|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
|  | —           | —             | —              | —             | —              |
|  | —           | ++            | +              | +             | + —            |

## МОНОТЕРАПИЯ

ПОДТВЕРЖДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ЛЕЧЕНИИ КЛИНИЧЕСКИХ МАСТИТОВ<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Испытания проводились на базе ЗАО Агрофирма «Волга» Марковского района и ФГУП «Муммовское» МСХА им. К.А. Тимирязева Аткарского района Саратовской области на лактирующих коровах симментальской и черно-пестрой пород с диагнозом клинический мастит

## КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ

### ЭФФЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТА

| Дни применения                   | Препарат | Порядок применения                 |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|
| <b>Гнойно-катаральный мастит</b> |          |                                    |
| 1 день                           | Цефтонит | Подкожно в дозе 1 мл на 50 кг      |
|                                  | Флунекс* | Внутримышечно в дозе 1 мл на 45 кг |
| 2 день                           | Цефтонит | Подкожно в дозе 1 мл на 50 кг      |
|                                  | Флунекс  | Внутримышечно в дозе 1 мл на 45 кг |
| 3 день                           | Цефтонит | Подкожно в дозе 1 мл на 50 кг      |
|                                  | Флунекс  | Внутримышечно в дозе 1 мл на 45 кг |
| <b>Субклинический мастит</b>     |          |                                    |
| 1 день                           | Цефтонит | Подкожно в дозе 1 мл на 50 кг      |
|                                  | Флунекс  | Внутримышечно в дозе 1 мл на 45 кг |
| 2 день                           | Цефтонит | Подкожно в дозе 1 мл на 50 кг      |
|                                  | Флунекс  | Внутримышечно в дозе 1 мл на 45 кг |

\***ФЛУНЕКС** - мощное НПВС, повышающее эффективность антибиотикотерапии.

#### ОГРАНИЧЕНИЯ

Убой на мясо КРС проводят не ранее чем через 8 суток, свиней - через 6 суток после последнего введения лекарственного препарата. Молоко для пищевых целей используется **без ограничений**.



ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ  
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

**НИТА-ФАРМ – КЛЮЧЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ  
ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ РОССИИ**

**30+**  
ЛЕТ НА РЫНКЕ



**22**  
ПАТЕНТОВАННЫХ  
ПРОДУКТА

**МЫ – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ  
НОВЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ**

ВСЕ О НОВИНКАХ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

САЙТ



WWW.NITA-FARM.RU

ВКОНТАКТЕ



@nitafarm

ТЕЛЕГРАМ



@nita\_farm

MAX



@nitafarm