

РИКАЗОЛ®

Рикобендазол 10%
Раствор для инъекций

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ АНТИГЕЛЬМИНТНЫЙ ПРЕПАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ,
НА ОСНОВЕ РИКОБЕНДАЗОЛА, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ
К ИВЕРМЕКТИНУ И БЕНЗИМИДАЗОЛАМ



ПРОТИВОПАЗИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ





ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ

Риказол®

Без компромиссов



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уничтожение всех видов гельминтов
- Эффективность терапии 98-100%¹
- Высокая биодоступность и быстрое действие
- Первый инъекционный препарат на основе рикобендазола

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективный антигельминтный препарат нового поколения на основе активного производного альбендазола, преодолевающий резистентность к прочим бензимидазолам.

Выпускают Риказол расфасованным по 100 мл в стеклянные флаконы, закупоренные резиновыми пробками и закатанные алюминиевыми колпачками.

СОСТАВ




100 мг рикобендазол

¹ Показатель, полученный при применении рикобендазола в дозе 4 мг/кг массы животного при нематодирозе, диктиокаулезе, мониезиозе и стронгилятозе.


Анализ данных по распространенности гельминтозов овец на территории РФ показывает, что из общего числа инвазированных животных моноинвазии диагностируются у 33,6 % (из них поражены мониезиями 19,6 %, нематодами – 13,7 % и стронгилоидами – 0,3 %), а смешанные инвазии у 66,4 %.

Распространенность гельминтозов овец





При ряде **гельминтозных заболеваний**, несмотря на **бессимптомное течение** и отсутствие падежа, **происходит задержка развития и снижение продуктивности** сельскохозяйственных животных.

Снижение массы тела у бычков семментальской породы при смешанной инвазии фасциолеза и дикроцеллиоза




При всасывании из пищеварительного тракта и метаболизме в печени происходит превращение альбендазола в биологически активный альбендазолсульфоксид (рикобендазол) и побочный продукт – альбендазолсульфон.



ТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

При этом из желудочно-кишечного тракта усваивается менее 5% альбендазола. Рикобендазол, являющийся активным метаболитом альбендазола, обладает 100% биодоступностью.

Достижение максимальной концентрации в крови




Эффективность дегельминтизации инъекционным препаратом Риказол при нематодозах и трематодозах **превосходит эффективность** препарата на основе **альбендазола** для орального применения.

Результаты применения препарата Риказол при основных гельминтозах овец²

Название болезни	Число животных	Освободилось от инвазии, гол.	Среднее количество яиц в 1 г фекалий, шт.		Снижение числа яиц в фекалиях, %
			До опыта	После лечения	
Мониезиоз	10	9	192±16,8	1,5±0,4	99,93
Диктиокаулез	12	12	78,6±6,8	0	100
Нематодироз	10	10	183,4±12,4	0	100
Другие стронгилятозы ЖКТ	10	10	182,8±14,7	0	100

Эффективность применения препарата Риказол при мониезиозе овец



Эффективность дегельминтизации при смешанных инвазиях препаратом Риказол составляет **96%** (фасциолез+нематодироз) и **88%** (дикроцелиоз+нематодироз).


Антигельминтная активность альбендазола и рикобендазола в отношении нематодозных и трематодозных инвазий овец

Препарат	Кол-во животных	Нематодозы				Трематодозы	
		Нематодироз		Стронгилоидоз		Фасциолез	
		Освободилось, гол.	ЭД ³ , %	Освободилось, гол.	ЭД, %	Освободилось, гол.	ЭД, %
Риказол (0,08 мл/кг)	50	50	100	50	100	48	96
Суспензия на основе альбендазола (0,15 мл/кг)	50	47	94	40	80	43	86

²Опыт проводился ООО «НИТА-ФАРМ» совместно с ВИГИС в Пестравском районе Самарской области. Терапевтическая доза препарата 4 мг/кг


³ЭД – эффективность дегельминтизации, определяется как отношение количества животных, освободившихся полностью от гельминтов, к количеству обработанных животных

Эффективность применения препарата Риказол при дегельминтизации КРС



Препарат показал **100% эффективность** терапии нематодозов и прочих инвазий смешанного характера крупного рогатого скота⁴

Эффективность применения препарата Риказол при гельминтозах КРС



Риказол показывает высокую эффективность при гельминтозах КРС даже при таких трудно поддающихся лечению заболеваниях как фасциолез и парамфистоматоз.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Риказол относится к фармакотерапевтической группе: антигельминтные средства. Рикобендазол обладает широким спектром антигельминтного действия, активен в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод (*Dictyocaulus* spp., *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Thelazia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Nematodirus* spp., *Cooperia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Bunostomum* spp., *Chabertia ovina* и др.) и цестод (*Moniezia* spp., *Avitellina centripunctata*, *Thysaniezia* spp. и др.), а также половозрелых трематод (*Fasciola* spp., *Paramphistomum* spp., *Dicrocoelium lanceatum*); обладая овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов.

Препарат хорошо всасывается и распределяется во всех органах и тканях организма. Максимальная концентрация в крови достигается через 8 часов.

⁴ Испытания проводились ВИГИС и Самарской НИВС на базе ООО «Тафко» Иса克林ского района Самарской области

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Риказол назначают крупному и мелкому рогатому скоту при нематодозах, цестодозах и трематодозах.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Дегельминтизацию животных проводят по показаниям и с профилактической целью – весной перед выгоном на пастбище и осенью перед постановкой на стойловое содержание.

При введении препарата в объеме, превышающем 5 мл для овец и коз, 15 мл - для крупного рогатого скота, инъекции следует проводить в несколько мест. В холодное время года лекарственный препарат перед введением необходимо подогреть до температуры 20-25°С.



Крупному рогатому скоту Риказол применяют внутримышечно, однократно в дозах, указанных в таблице 1:

Таблица 1.

Гельминтозы	Доза препарата
Мониезиоз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы	1 мл/25 кг массы тела животного
Трихоцефалез	1 мл/20 кг массы тела животного
Хронический фасциолез, парамфистоматоз, дикроцелиоз	1 мл/12,5 кг массы тела животного



Мелкому рогатому скоту Риказол применяют внутримышечно, однократно в дозах, указанных в таблице 2:

Таблица 2.

Гельминтозы	Доза препарата
Мониезиоз, тизаниезиоз, авителлиноз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы	1 мл/25 кг массы тела животного
Хронический фасциолез, дикроцелиоз, парамфистоматоз, трихоцефалез	1 мл/12,5 кг массы тела животного

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказаниями к применению лекарственного препарата является повышенная чувствительность животного к рикобендазолу. Запрещается применение лекарственного препарата при остром франсциозе, во время случного периода, истощенным и больным животным. Запрещается применение лекарственного препарата стельным коровам в первую треть, суягным овцам в первую половину беременности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



30 суток



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия – не более 30 суток.

[illegible]

НИТА-ФАРМ – КЛЮЧЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ РОССИИ

В тесном взаимодействии с ветеринарными
врачами-практиками мы глубоко изучаем
потребности рынка и лучшие мировые
инновации

30+
ЛЕТ НА РЫНКЕ

Наша цель – не просто достигнуть высочайшего
качества, но и превзойти ожидания наших
клиентов, предоставляя им лучшие продукты,
которые делают мир лучше каждый день



**МЫ – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ
НОВЫХ ПРОДУКТОВ
В РОССИИ**

20 НОВИНОК
за 2025 год

22
ПАТЕНТОВАННЫХ
ПРОДУКТА

ВСЕ О НОВИНКАХ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

САЙТ



WWW.NITA-FARM.RU

ВКОНТАКТЕ



@nitafarm

ТЕЛЕГРАМ



@nita_farm

MAX



@nitafarm