



ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ СКОВОДСТВО



ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СКОТОВОДСТВА



70 продуктов



НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Вемелкам 2% НОВИНКА	9
Кетопрофен 10%	11
Флулекс	13



АНТИОКСИДИЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Зуратрол НОВИНКА	17
-------------------------------	----



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Азитронит 	21
Амоксигард	23
Амоксициллин 150	25
Дитрим	27
Дитрим порошок	29
Доксилокс	31
Лексофлон 	33
Неокальф НОВИНКА	36
Нитокс 200	38
Нитокс Форте	40
Номицеф НОВИНКА	43
Пневмотил	45
Тилозин 50 и 200	47
Тулатрин	49
Флорокс	52
Цефтонит	54
Цефтонит Форте	57
Энронит	60



ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Альвет	65
Альвет-суспензия	67
Ивермек	69
Ивермек-ОН 	71
Клозатрем	73
Левамизол 75	75
Мерадок	77
Неозидин	80
Неозидин М	82
Риказол 	84
Цифлунит	86
Цифлунит-ОН	88
Цифлунит Флок 	90



АКУШЕРСКО- ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Йодопен	95
Максинон	97
Мастенит	99
Мастигард	101
Мастисан	103
Мастомицин	104
Миоцид	106
Митрек	108
Номицеф LC НОВИНКА	110
Сенсиверин НОВИНКА	112
Сепранол	114
Септогель	117
Утеротон	119
Утеротон Форте НОВИНКА	121



ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Регостенол	125
Ферголин	128



ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Бутوفан	133
Диастатин	135
Е-селен	137
Е-селен OR	139
Кабуфол НОВИНКА	141
Комплекс витаминов	
А, D ₃ , Е в масле	143
Нитамин	145
Стролитин	147
Тетравит	149
Тетрагидровит	151
Ферран	153



СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ГАН	157
Фулгард	160



— ДРУГИЕ ФАРМ-ГРУППЫ

Гелерон	165
Гель двойного действия	166
Кальция борглюконат 20%	167
Кофеин-бензоат натрия 20%	169
Ксиланит	171
Септо-спрей	173

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 176

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА - АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

D

D-клопростенол

Регостенол 125

L

L-карнитин

Стролитин 147

A

Алкилдиметилбензиламмония хлорид

ГАН 157

Фулгارد 160

Амоксициллин

Амоксигард 23

Амоксициллин 150 25

Альбендазол

Альвет 65

Альвет-суспензия 67

Азитромицин

Азитронит 21

B

Бензоат натрия

Кофеин-бензоат натрия 20% 169

Борная кислота

Кальция борглюконат 20% 167

Бутафосфан

Бутофан 133

Кабуфол 141

B

Висмут субнитрат

Миоцид 106

Витамин B₁₂

Бутофан 133

Ферран 153

Витамин F

Тетравит 149

Витамин C

Нитамином 145

Тетрагидровит 151

Витамин D₃

Комплекс витаминов A, D₃, E в масле 143

Нитамином 145

Тетравит 149

Тетрагидровит 151

Витамин E

Е-селен 137

Е-селен OR 139

Ивермек 69

Комплекс витаминов A, D₃, E в масле 143

Нитамином 145

Тетравит 149

Тетрагидровит 151

G

Гонадотропина ацетат

Ферголин 128

Глиоксаль

ГАН 157

Глутаровый альдегид

ГАН 157

Фулгарт 160

Гентамицин

Мастомицин 104

D

D-пантенол (декспантенол)

Максином 97

Дидецилдиметиламмония хлорид

Фулгарт 160

Декстран железа

Ферран 153

Денаверин гидрохлорид

Сенсиверин 112

Доксициклин

Доксилокс 31

Диминазена диацетурат

Неозидин M 82

Диминазен

Неозидин	80
Неозидин М	82

Дорамектин

Мерадок	77
---------------	----

И

Ивермектин

Ивермек	69
Ивермек-ОН	71

К

Кремния диоксид

Диастатин	135
-----------------	-----

Клоксациллин

Мастенит	99
----------------	----

Кетопрофен

Кетопрофен 10%	11
----------------------	----

Ксилазин

Ксиланит	171
----------------	-----

Кофеин

Кофеин-бензоат натрия 20%	169
---------------------------------	-----

Кальция глюконат

Кальция борглюнат 20%	167
Кабуфол	141

Клиндамицин

Мастомицин	104
------------------	-----

Колистин

Энронит	60
Неокальф	36

Клавулановая кислота

Амоксигард	23
------------------	----

Клозантел

Клозатрем	73
-----------------	----

Л

Лимонная кислота

Диастатин	135
-----------------	-----

Левофлоксацин

Лексофлон	33
Максион	97
Мастигард	101

Левамизол

Левамизол 75	75
--------------------	----

Лидокаин

(лидокаина гидрохлорид)

Мастомицин	104
------------------	-----

М

Магний (магния сульфат)

Стролитин	147
-----------------	-----

Мелоксикам

Вемелкам 2%	9
-------------------	---

Ментол

Гель двойного действия	166
------------------------------	-----

Молочная кислота

Диастатин	135
-----------------	-----

Н

Натрий лимоннокислый

Диастатин	135
-----------------	-----

Нозигептид

Мастигард	101
-----------------	-----

Натрия тетраборат

Кальция борглюнат 20%	167
-----------------------------	-----

Нитазоксанид

Неокальф	36
----------------	----

О

Окситетрациклин

Нитокс 200	38
Нитокс Форте	40

Окситоцин

Утеротон Форте	121
----------------------	-----

П

Прополиса экстракт

Гель двойного действия	166
------------------------------	-----

Пропранолол

Сепранол	114
Утеротон	119
Утеротон Форте	121

Пенициллин (бензилпенициллин)

Мастисан	103
----------------	-----

Повидон-йод

Йодопен	95
Септогель	117
Септо-спрей	174

Р

Рикобендазол

Риказол	84
---------------	----

С

Состав фитокомплекса

Гелерон	165
Гель двойного действия	166

Сорбитол

Стролитин	147
-----------------	-----

Селенит натрия

Е-селен	137
Е-селен OR	139

Стрептомицин

Мастисан	103
----------------	-----

Сульфадимезин

Дитрим	27
Дитрим порошок	29
Мастисан	103

Т

Туйон

Гель двойного действия	166
------------------------------	-----

Танин

Диастатин	135
-----------------	-----

Тилозин

Тилозин 50 и 200	47
------------------------	----

Тилмикозин

Пневмотил	45
-----------------	----

Толтразурил

Зуратрол	17
----------------	----

Триметоприм

Дитрим	27
Дитрим порошок	29

Тулатромицин

Тулатрин	49
----------------	----

Ф

Фолиевая кислота

Ферран	153
--------------	-----

Флорфеникол

Флорокс	52
---------------	----

Флуниксин (флуниксин меглумин)

Нитокс Форте	40
Флунекс	13

Феназон

Неозидин	80
Неозидин М	82

Х

Хлорид калия

Диастатин	135
-----------------	-----

Хлорид натрия

Диастатин	135
-----------------	-----

Хлоргексидин

Сепранол	114
----------------	-----

Ц

Цефапирин

Митрек	108
--------------	-----

Цианокобаламин

Бутофан	133
---------------	-----

Цефкином

Номицеф	43
Номицеф LC	110

Цифлутрин

Цифлунит	86
Цифлунит-ОН	88
Цифлунит Флок	90

Цефтиофул

Цефтонит	54
Цефтонит Форте	57

Э

Эвкалиптол

Гель двойного действия	166
------------------------------	-----

Эфирные масла эвкалипта

Гель двойного действия	166
------------------------------	-----

Эфирные масла гвоздики

Гель двойного действия	166
------------------------------	-----

Экстракт красного перца

Гель двойного действия	166
------------------------------	-----

Энрофлоксацин

Энронит	60
---------------	----

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА



Вемелкам 2% НОВИНКА	9
Кетопрофен 10%	11
Флунекс	13



Вемелкам® 2% **НОВИНКА**

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

20 мг мелоксикам

100 мл



СОВРЕМЕННЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ НПВС (МЕЛОКСИКАМ) С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО КОНТРОЛЯ БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ У ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Качество ключевого российского производителя проверенное временем;
- Пролонгированное действие до 48 часов;
- Высокая эффективность терапии при заболеваниях конечностей.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мелоксикам, входящий в состав препарата, угнетает синтез простагландинов, оказывая противовоспалительное, антиэкссудативное, жаропонижающее и анальгетическое действия.

Механизм действия заключается в избирательном подавлении ферментативной активности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), в результате блокируется синтез воспалительных простагландинов, вызывающих воспаление, боль и отек; незначительно действует на циклооксигеназу-1 (ЦОГ-1), сводя к минимуму развитие побочных эффектов (в т. ч. кровотечения, образование язв и нарушение функции почек). Мелоксикам уменьшает инфильтрацию лейкоцитов в месте воспаления, угнетает агрегацию тромбоцитов, а также блокирует у животных продукцию тромбксана B2, вызываемую эндотоксином *E. coli*.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Вемелкам 2% применяют крупному рогатому скоту и лошадям в качестве противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего средства при акушерско-гинекологических (в том числе маститах, эндометритах), желудочно-кишечных (в том числе при коликах), респираторных инфекциях, острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата и мягких тканей, а также при устранении болевого синдрома различной этиологии.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка
КРС	Подкожно или внутривенно	1 мл на 40 кг м. ж. (0,5 мг мелоксикама на 1 кг м. ж.)
Лошади	Внутривенно	1 мл на 33 кг м. ж. (0,6 мг мелоксикама на 1 кг м. ж.)





ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность.

Запрещается применение телятам, не достигшим недельного возраста, жеребят, не достигшим 6-недельного возраста, жеребьим и лактирующим кобылам, животным с поражениями печени и сердечно-сосудистой системы, нарушениями функции почек, при проявлении геморрагического синдрома.

Запрещается одновременное применение лекарственного препарата с глюкокортикостероидами, другими нестероидными противовоспалительными препаратами, а также антикоагулянтами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



15 суток - КРС,
5 суток - ЛОШАДИ



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.



Кетопрофен 10%

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг кетопрофен

100 мл



ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МОЛОКО И С МИНИМАЛЬНЫМИ СРОКАМИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без ограничений по молоку;
- Разрешен беременным и новорожденным¹;
- Особенно эффективен в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата².

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кетопрофен, входящий в состав препарата, является производным пропионовой кислоты, обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием, подавляет агрегацию тромбоцитов.

Кетопрофен 10% быстро исчезает из плазмы крови, сохраняя терапевтическую концентрацию в очаге воспаления.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Кетопрофен 10% назначают крупному рогатому скоту в качестве противовоспалительного, анальгезирующего и жаропонижающего средства в комплексной терапии острых и хронических заболеваний, сопровождающихся воспалительными процессами, болевыми синдромами и гипертермией различной этиологии, в сочетании с антибактериальными препаратами для комплексного лечения (акушерско-гинекологические, желудочно-кишечные, респираторные и заболевания опорно-двигательного аппарата).

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	В/в или в/м	3 мл на 100 кг м. ж. (эквивалентно 3 мг кетопрофена на 1 кг м. ж.)	Ежедневно, 1 раз в сутки в течение 1-3 дней

Продолжительность курса лечения зависит от состояния животного и определяется лечащим врачом.

¹ Не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия

² Хорошо проникает в синовиальную жидкость и синовиальную оболочку суставов



МАХ
ПЕРИОД
ПОЛУВЫ-
ВЕДЕНИЯ



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Кетопрофен 10% не следует применять одновременно с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, диуретиками, глюкокортикоидами и антикоагулянтами и смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



7 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.

Флунекс

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

83 мг флуниксин меглумин

100 мл



НЕСТЕРОИДНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО, ПОВЫШАЮЩЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ, - СОКРАЩАЕТ СРОКИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И СОХРАНЯЕТ ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЗА СЧЕТ СНЯТИЯ ВОСПАЛЕНИЯ И БОЛЕВОГО СИНДРОМА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощное обезболивающее и противовоспалительное действие;
- Быстрое восстановление продуктивных качеств;
- Пролонгированное действие - 24 часа;
- Действует на 16 часов дольше кетопрофена.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Флуниксин, входящий в состав препарата, угнетает синтез медиаторов воспаления. Препарат кумулируется в очаге воспаления, обеспечивая терапевтический эффект в течение 24 часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Флунекс назначают лошадям, крупному рогатому скоту в качестве противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего средства в комплексной терапии острых воспалительных процессов при акушерско-гинекологических, желудочно-кишечных, респираторных заболеваниях, при болевых синдромах и гипертермии и др.

СОКРАЩАЕТ СРОК ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ НА 1,5 ДНЯ

ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ ТРАХЕОБРОНХИТА ТЕЛЯТ



Использование препарата Флунекс позволяет сократить срок выздоровления на 36 часов, а положительная динамика наблюдается **раньше на 18 часов** в сравнении с монотерапией.

* при соблюдении инструкции по применению не оказывает негативного воздействия на ЖКТ

ОДИН ИЗ САМЫХ
БЕЗОПАСНЫХ
НПВС*



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код




видео о продукте
Флунекс





КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МАСТИТА

ПОЛНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ



Использование препарата Флунекс позволяет сократить срок выздоровления животных при гнойно-катаральном мастите на 12 часов, а положительная динамика наблюдается **раньше на 9 часов** в сравнении с монотерапией.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	Респираторные заболевания	В/м, в/в	2 мл/45 кг	1 раз в сутки, не более 5 дней
	Острые маститы, прочие заболевания			
Лошади	Заболевания опорно-двигательного аппарата	В/в	1 мл/45 кг	1 раз в сутки, не более 5 дней
	Купирование болевого синдрома при коликах			Однократно, при необходимости повторить через 24 часа
	Эндотоксемия, септический шок, прочие патологии, связанные с нарушением кровообращения в ЖКТ		0,2 мл/45 кг	Каждые 6-8 часов, не более 5 введений

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

В связи с возможной болевой реакцией не следует вводить в одно место крупным животным в объеме, превышающем 5 мл, мелким - 2,5 мл.

Не рекомендуется применение препарата беременным самкам, молодняку моложе 1,5-месячного возраста.

Флунекс не следует применять одновременно с другими противовоспалительными средствами и нефротоксическими препаратами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



8 суток - КРС при в/в введении
35 суток - КРС при в/м введении
8 суток - ЛОШАДИ



60 часов

СРОК ГОДНОСТИ

4 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.

АНТИКОКЦИДИЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

	Зуратрол НОВИНКА 17
---	----------------------------------



Зуратрол®

НОВИНКА

СУСПЕНЗИЯ, ПЕРОРАЛЬНО

50 мг толтразурил

500 мл

1 л



ПРОВЕРЕННЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ТОЛТРАЗУРИЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭЙМЕРИОЗА У МОЛОДНЯКА КРС С ОДНОКРАТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ И ШИРОКИМ СПЕКТРОМ АНТИКОКЦИДИЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антикокцидийного действия, эффективен в отношении:

- *Isospora suis*
- *Eimeria arloingi*
- *Eimeria scabra*
- *Eimeria guevarai*
- *Eimeria bovis*
- *Eimeria zuernii*
- *Eimeria alabamensis*



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Зуратрол назначают молодянку крупного рогатого скота с лечебной и лечебно-профилактической целью при кокцидиозе.

Перед применением препарат тщательно взболтать в течение 30 секунд.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Телята	Перорально индивидуально однократно с помощью дозирующего устройства	С 2-недельного возраста в дозе 3 мл суспензии на 10 кг м. т. ж.	1 раз в сутки

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Животным с развитым рубцовым пищеварением препарат применяют при необходимости под контролем ветеринарного врача на основании оценки соотношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

Запрещается применение Зуратрол дойным коровам ввиду его выделения с молоком.

ОГРАНИЧЕНИЯ



63 дня

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.



НОВИНКА

НЕОКАЛЬФ®



КРЕПКОЕ
РЕШЕНИЕ
ДИАРЕИ



По рецепту

**НОВЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ НИТАЗОКСОНИДА И КОЛИСТИНА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЯТ ПРИ ДИАРЕЕ, ВЫЗВАННОЙ КРИПТОСПОРИДИЯМИ,
КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКОЙ, САЛЬМОНЕЛЛОЙ, А ТАКЖЕ КЛОСТРИДИЯМИ**

- ▶ Эффективен против всех актуальных возбудителей диареи телят в неонатальный период
- ▶ Активен против клостридий, в отличие от других препаратов, применяемых против криптоспоридий
- ▶ Отсутствует резистентность к нитазоксаниду
- ▶ Удобен в применении: индивидуальный дозатор
- ▶ Безопасен с первых дней жизни

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



Азитронит 	21
Амоксигард	25
Амоксициллин 150	25
Дитрим	27
Дитрим порошок	29
Доксилокс	31
Лексофлон 	33
Неокальф НОВИНКА	36
Нитокс 200	38
Нитокс Форте	40
Номицеф НОВИНКА	43
Пневмотил	45
Тилозин 50 и 200	47
Тулатрин	49
Флорокс	52
Цефтонит	54
Цефтонит Форте	57
Энронит	60



Азитронит® ХИТ

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг азитромицина дигидрат

ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

100 мл



ПЕРВЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ АНТИБИОТИК НА ОСНОВЕ АЗИТРОМИЦИНА¹ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И МЕТАФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНЫХ, ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ И ДРУГИХ ИНФЕКЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антибиотик нового поколения;
- Целенаправленное действие²;
- Защищает до 7 дней после последней инъекции³;
- Улучшает состояние животного в первые 10-12 часов⁴.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Азитромицин, входящий в состав препарата Азитронит, относится к антибиотикам группы макролидов. Механизм действия азитромицина связан с торможением биосинтеза белка рибосомами бактерий. Азитромицин хорошо всасывается и быстро распределяется в тканях организма, достигая высоких концентраций, во много раз превышающих концентрацию в плазме крови.

САМЫЙ ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ!

Азитронит обладает широким спектром действия, подавляя больше чем 30 патогенов, что более чем в 2 раза шире спектра действия других современных макролидных препаратов.

Сравнение спектра действия азитромицина с другими известными макролидами

Микроорганизмы	Антибиотик			
	Азитромицин (Азитронит)	Гамитромицин	Тилдипрозин	Тулатромицин
Streptococcus pneumoniae ⁵				
Streptococcus pyogenes				
Staphylococcus aureus ⁶				
Enterococcus faecalis ⁷				
Actinobacillus spp.				
Haemophilus parasuis				
Haemophilus somnus				
Moraxella spp.				
Pasteurella spp.				
Clostridium spp.				
Bordetella spp.				
Mycoplasma spp.				
Chlamydia spp.				
Escherichia coli ⁸				
Salmonella spp.				
Listeria spp.				
Erysipelothrix isidiosa				
Campylobacter spp.				
Legionella				
Fusobacterium spp.				
Borrelia spp.				

Доказано воздействие более чем на 30 патогенов



- Серебряная медаль Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 2018г.

¹ Первый препарат на основе азитромицина в ветеринарной фармацевтике в РФ



для перехода на страницу продукта отсканируйте QR-код



видео о продукте Азитронит



видео о продуктах Азитронит и Флулекс





ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КОРОЧЕ СРОКИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Эффективность препарата Азитронит подтверждена испытаниями, в общей сложности, более чем на 700 головах сельскохозяйственных животных при различных заболеваниях.

Эффективность лечения респираторных заболеваний⁹

Диагноз	Вид животного	Действующее вещество, содержание, мг/мл	Улучшение состояния, часы	Срок выздоровления, дни
Острый бронхит	Телята	Азитромицин, 100	12-16	2,9±0,1
		Флорфеникол, 300	20-24	5,1±0,1
		Энрофлоксацин, 100	40-48	5,8±0,2

Азитронит демонстрирует 100% эффективность, быстрое улучшение состояния и короткие сроки выздоровления

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Азитронит применяют крупному рогатому скоту и овцам для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой системы, а также инфекций кожи и мягких тканей, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к азитромицину, для терапии некробактериоза, спирохетоза и микоплазменных инфекций.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Дозировка	Способ и кратность введения	Длительность курса
КРС, овцы	1 мл на 20 кг	Внутримышечно, 1 раз в 24 часа	2 дня, при необходимости инъекцию повторить

ОГРАНИЧЕНИЯ



40 суток - КРС

35 суток - ОВЦЫ

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 30 суток.

² Проникает в клетки иммунной системы и с ними мигрирует в очаг воспаления

³ Проявляет антибиотическое действие за счёт высокой способности накапливаться в воспалённых тканях

⁴ Доказано на практике в ходе испытаний (благодаря своим уникальным свойствам, в т.ч. противовоспалительному и иммуномодулирующему действию)

⁵ Пенициллин-чувствительный

⁶ Метициллин-чувствительный

⁷ ATCC 29212

⁸ ATCC 25922

⁹ Эффективность препарата в описанном эксперименте изучалась на 105 головах телят чёрно-пёстрой породы, в возрасте от 2 до 5 месяцев, весом от 60 до 100 кг. Группы подбирались по принципу аналогов и являлись сопоставимыми, применение препаратов осуществлялось согласно инструкциям.

Амоксигард®

СУСПЕНЗИЯ, ИНЪЕКЦИОННО

140 мг амоксициллина тригидрат,
35 мг клавулановая кислота

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



НАДЁЖНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НА ОСНОВЕ АМОКСИЦИЛЛИНА И КЛАВУЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К БЕТА-ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКАМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность терапии;
- Короткие сроки ограничения по молоку;
- «Новая жизнь» одного из самых востребованных антибиотиков.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксигард относится к антибактериальным препаратам фармакотерапевтической группы пенициллины в комбинациях.

Комбинация амоксициллина и клавулановой кислоты, входящих в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром бактерицидной активности против большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы продуцирующие β-лактамазу:

- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Corynebacterium spp.*
- *Clostridium spp.*
- *Bacillus spp.*
- *Bacillus anthracis*
- *Actinomyces spp.*
- *Actinomyces bovis*
- *Peptostreptococcus spp.*
- *Escherichia coli*
- *Salmonella spp.*
- *Bordetella spp.*
- *Bordetella bronchiseptica*
- *Campylobacter spp.*
- *Klebsiella spp.*
- *Proteus spp.*
- *Pasteurella spp.*
- *Fusobacterium spp.*
- *Fusobacterium necrophorum*
- *Bacteroides spp.*
- *Haemophilus spp.*
- *Moraxella spp.*
- *Actinobacillus spp.*
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Actinobacillus lignieresii*
- *Erysipelothrix spp.*
- *Erysipelothrix rhusiopathiae*
- *Listeria spp.*
- *Leptospira spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Амоксигард применяют крупному рогатому скоту при респираторных, гинекологических (метриты и маститы), хирургических заболеваниях, в том числе инфекциях кожи и мягких тканей (абсцессы, флегмоны, фурункулез).





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Дозировка	Способ и кратность введения	Длительность курса
КРС	1 мл на 20 кг	Внутримышечно, 1 раз в 24 ч	От 3 до 5 дней

Перед каждым использованием флакон с препаратом Амоксигард тщательно встряхивают до получения однородной суспензии.

Место инъекции после введения лекарственного препарата рекомендуется помассировать. Для введения лекарственного препарата используют только сухие шприцы и иглы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не следует применять Амоксигард одновременно с тиамфениколом, хлорамфениколом, антибиотиками группы пенициллина, цефалоспорины и фторхинолонами, а также смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



42 суток - КРС



108 часов

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

Амоксициллин 150

СУСПЕНЗИЯ, ИНЪЕКЦИОННО

150 мг амоксициллина тригидрат

 ПО РЕЦЕПТУ

50 мл

100 мл

250 мл



ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ АМОКСИЦИЛЛИН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У КРС И МРС С БОЛЕЕ ВЫГОДНОЙ СТОИМОСТЬЮ КУРСА ПО СРАВНЕНИЮ С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр антимикробного действия;
- Современная технология производства;
- Мгновенно ресуспендируется при встряхивании;
- Сниженная вязкость.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллин 150 относится к антибактериальным препаратам группы полусинтетических пенициллинов.

Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата, - полусинтетический антибиотик пенициллинового ряда, обладает широким спектром антимикробного действия, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:

- *Actinobacillus spp.*
- *Actinomyces spp.*
- *Bacillus spp.*
- *Bacillus anthracis*
- *Clostridium spp.*
- *Corynebacterium spp.*
- *Erysipelothrix rhusiopathiae*
- *Escherichia coli*
- *Haemophilus spp.*
- *Leptospira spp.*
- *Listeria spp.*
- *Listeria monocytogenes*
- *Pasteurella spp.*
- *Proteus spp.*
- *Proteus mirabilis*
- *Salmonella spp.*
- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Амоксициллин 150 применяют для лечения крупного и мелкого рогатого скота при болезнях бактериальной этиологии желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей и кожи, некробактериозе, пупочных инфекциях, атрофическом рините, синдроме метрит-мастит-агалактия и других первичных и вторичных инфекциях, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
КРС, МРС	Внутримышечно или подкожно	1 мл/10 кг м. ж.	Однократно. При необходимости инъекцию повторяют через 48 часов

Перед каждым применением суспензию следует тщательно взболтать. В холодное время года лекарственный препарат перед введением необходимо подогреть до комнатной температуры (20-25 °С).

Максимальный объем введения лекарственного препарата Амоксициллин 150 в одно место не должен превышать для крупного рогатого скота - 20 мл, овец, коз, телят - 5 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Амоксициллин 150 не следует смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



28 суток



4 суток

СРОК ГОДНОСТИ

4 года со дня производства при соблюдении условий хранения, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

Дитрим®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО


200 мг сульфадимезин, 40 мг триметоприм

ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл

100 мл



КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, ЗАНИМАЮЩИЙ ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ В РОССИИ И СНГ СРЕДИ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ТРИМЕТОПРИМА И СУЛЬФАДИМЕЗИНА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синергизм компонентов предотвращает развитие резистентности;
- Удвоенная сила противомикробного действия¹;
- Подходит для ротации с большинством современных антибиотиков.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дитрим активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Спектр действия препарата охватывает:

- **E.coli**
- **Salmonella spp.**
- **Proteus spp.**
- **Bacillus anthracis**
- **Pasteurella spp.**
- **Haemophilus spp.**
- **Vibrio spp.**
- **Staphylococcus spp.**
- **Streptococcus spp.**
- **Shigella spp.**
- **Corynebacterium spp.**
- **Klebsiella spp.**
- **Bordetella spp.**
- **Campylobacter spp.**
- **Enterobacter spp.**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Дитрим назначают КРС, лошадям для лечения бактериальных инфекций, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, возбудители которых чувствительны к сульфадимезину и триметоприму.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
КРС	Внутримышечно в область шеи	1 мл/10 кг м. ж. один раз в сутки	3-7 суток. При тяжёлом течении болезни первые 2-3 дня препарат вводят дважды в сутки с интервалом 12 часов в той же дозе
Лошади	Внутривенно		

В связи с возможной болевой реакцией не следует вводить в одно место КРС и лошадям более 10 мл препарата.

При применении в рекомендуемых дозах побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

¹ Применение двух действующих веществ





ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применять одновременно с препаратами п-аминобензойной кислоты (новокаином, прокаином, анестезином, бензокаином), а также смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

Запрещается применение препарата Дитрим животным в период беременности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



28 суток



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.

Дитрим® порошок

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

100 мг сульфадимезин, 20 мг триметоприм

ПО РЕЦЕПТУ

500 г



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Короткие сроки ограничения по мясу;
- Компоненты препарата обладают синергидным действием, предотвращая развитие устойчивости у микроорганизмов;
- Возможность задачи с водой и кормом;
- Широкий спектр антимикробной активности.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Входящие в состав лекарственного препарата сульфадимезин и триметоприм, обладая синергидным действием, усиливают действие друг друга путем последовательного воздействия на метаболизм п-аминобензойной и фолиевой кислот в микробной клетке, что обеспечивает широкий спектр антимикробной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая:

- **E.coli**
- **Clostridium spp.**
- **Salmonella spp.**
- **Proteus spp.**
- **Bacillus anthracis**
- **Pasteurella spp.**
- **Haemophilus spp.**
- **Vibrio spp.**
- **Staphylococcus spp.**
- **Streptococcus spp.**
- **Shigella spp.**
- **Corynebacterium spp.**
- **Klebsiella spp.**
- **Fusobacterium spp.**
- **Bordetella spp.**
- **Brucella spp.**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Дитрим порошок назначают телятам, ягнятам, жеребятam для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, кожи и мягких тканей, возбудители которых чувствительны к сульфадимезину и триметоприму.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Дозировка	Курс лечения
В смеси с кормом или суспендируя в небольшом количестве воды, молока или его заменителя. Индивидуально	1-ый день лечения – 5 г/10 кг м. ж. один раз в сутки; в последующие дни лечения – 2,5 г/10 кг м. ж.	3-5 дней. В тяжёлых случаях заболевания - до 7 суток

Побочных явлений и осложнений при применении препарата Дитрим порошок, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам препарата и появлении побочных явлений (отказ от корма, рвота) использование препарата прекращают.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение беременным и лактирующим самкам.

Запрещается одновременное применение препарата Дитрим порошок с препаратами фолиевой кислоты, новокаина, анестезина и других производных парааминобензойной кислоты ввиду их антагонистического взаимодействия.

ОГРАНИЧЕНИЯ



7 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 60 суток.

Доксилокс®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

200 мг доксициклин

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



АНТИБИОТИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ТЕТРАЦИКЛИНОВ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И МЕТАФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальный эффект с одной инъекции;
- Высокая эффективность в борьбе с возбудителями хламидиоза и микоплазмоза.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доксициклин, входящий в состав препарата, относится к полусинтетическим антибиотикам третьего поколения тетрациклиновой группы. Механизм бактериостатического действия доксициклина связан с угнетением энзимов, что приводит к нарушению синтеза белка микробной клетки. Активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:

- *Escherichia coli*
- *Haemophilus spp.*
- *Pasteurella spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Leptospira spp.*
- *Chlamydia spp.*
- *Clostridium perfringens*
- *Listeria monocytogenes*
- *Corynebacterium pyogenes*
- *Rickettsia spp.*
- *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Доксилокс назначают крупному и мелкому рогатому скоту с лечебной целью при инфекциях, вызванных чувствительными к доксициклину микроорганизмами, в том числе колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, хламидиозе, стафилококкозе, гемофилёзе и других заболеваниях бактериальной и микоплазменной этиологии.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
КРС, МРС	Внутримышечно	1 мл/10 кг м. ж.	Однократно. При необходимости инъекцию лекарственного препарата можно повторить через 48 часов





В связи с возможной болевой реакцией при введении лекарственного препарата в объеме, превышающем для ягнят 2,5 мл, овец и телят 5 мл, для крупного рогатого скота 10 мл, инъекции следует проводить дробно в несколько мест.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается применение лекарственного средства одновременно с антибиотиками групп пенициллинов и цефалоспоринов, а также препаратами кальция из-за возможного снижения его активности.

Запрещается применять в период беременности и лактационный период.

ОГРАНИЧЕНИЯ



21 сутки

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.

Лексофлон®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

150 мг левофлоксацин

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



АНТИБИОТИК ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КРС
С КОРОТКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО МОЛОКУ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность применения стельным коровам;
- Альтернатива для ротации с цефалоспоридами;
- Преодолевает резистентность к энрофлоксацину.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левофлоксацин, входящий в состав препарата – антибиотик широкого спектра действия группы фторхинолонов, оказывающий бактерицидное действие на:

- *Enterococcus spp.*
- *Listeria monocytogenes*
- *Staphylococcus spp.*
- (в том числе *Staphylococcus aureus*)
- *Streptococcus spp.*
- *Acinetobacter spp.*
- *Campylobacter spp.*
- *Enterobacter spp.*
- *Escherichia coli*
- *Haemophilus ducreyi*
- *Haemophilus influenzae*
- *Haemophilus parainfluenzae*
- *Klebsiella spp.*
- *Moraxella catarrhalis* β +/ β -
- *Morganella morganii*
- *Pasteurella spp.*
- *Proteus mirabilis*
- *Proteus vulgaris*
- *Providencia spp.*
- *Pseudomonas spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Serratia spp.*
- *Bacteroides fragilis*
- *Clostridium perfringens*
- *Fusobacterium spp.*
- *Peptostreptococcus*
- *Chlamydia pneumoniae*
- *Chlamydia psittaci*
- *Mycobacterium spp.*
- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Rickettsia spp.*

Концентрация левофлоксацина в крови находится выше МИК
спустя более чем 20 часов, что обеспечивает высокую
эффективность лечения



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Лексофлон



- Бронзовая медаль Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 2018 г.






Лексофлон высокоэффективен при лечении острого эндометрита коров




- Срок выздоровления короче на 1 день



- Эффективность выше на 10%

Эффективность Лексофлон при катаральной бронхопневмонии телят



- Эффективность составляет 88%

Лексофлон обеспечивает более быстрое выздоровление при бронхите телят



- Срок выздоровления короче на 2 дня

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Лексофлон применяют крупному рогатому скоту для лечения бактериальных заболеваний органов дыхания, пищеварительной системы, акушерско-гинекологических заболеваний – метритов и маститов, хирургических заболеваний и инфекций мягких тканей (таких как абсцессы, флегмоны), вызываемых чувствительными к левофлоксацину возбудителями, в том числе колибактериоза, пастереллеза, сальмонеллеза, стафилококкоза и микоплазменных инфекций.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
КРС	Внутримышечно	1 мл/30 кг м. т. ж.	Ежедневно в течение 3-5 дней

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается одновременное применение лекарственного препарата с глюкокортикоидами из-за повышения риска развития тендинита и/или разрыва сухожилий, с тетрациклинами и макролидами из-за повышения токсического эффекта левофлоксацина, а также свиньям совместно с нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами. Не рекомендуется применение левофлоксацина одновременно с этанолом.

Самкам в период беременности и вскармливания потомства препарат применяют при необходимости под контролем ветеринарного врача на основании оценки отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



9 суток



4 дня

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия - 28 суток.



Неокальф®

НОВИНКА

СУСПЕНЗИЯ, ПЕРОРАЛЬНО

54 мг нитазоксанид, 600 000 МЕ колистина сульфат



ПО РЕЦЕПТУ

500 мл

НОВЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ НИТАЗОКСАНИДА И КОЛИСТИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЯТ ПРИ ДИАРЕЕ, ВЫЗВАННОЙ КРИПТОСПОРИДИЯМИ, КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКОЙ, САЛЬМОНЕЛЛОЙ, А ТАКЖЕ КЛОСТРИДИЯМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективен против всех актуальных возбудителей диареи телят в неонатальный период;
- Активен против клостридий, в отличие от других препаратов, применяемых против криптоспоридий;
- Отсутствует резистентность к нитазоксаниду;
- Удобен в применении: индивидуальный дозатор;
- Безопасен с первых дней жизни.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нитазоксанид, входящий в состав препарата, прототип тиазолидов, является антипротозойным и антигельминтным средством для перорального введения. Проявляет антибактериальную активность в отношении *Clostridium* spp. Активен в отношении:

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| • <i>Cryptosporidium</i> spp. | • <i>Clostridium</i> spp. | • <i>Strongylidae</i> |
| • <i>Ancylostomatidae</i> | • <i>Haemonchus</i> | • <i>Trichomonas vaginalis</i> |
| • <i>Entamoeba histolytica</i> | • <i>Nematodirus</i> | • <i>Trichostrongylus</i> |
| • <i>Giardia</i> spp. | • <i>Ostertagia</i> | |

Колистина сульфат, входящий в состав препарата, относится к группе полипептиды и активен в отношении ряда грамотрицательных микроорганизмов:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| • <i>E. coli</i> | • <i>Haemophilus</i> spp. | • <i>Pseudomonas aeruginosa</i> |
| • <i>Salmonella</i> spp. | • <i>Klebsiella</i> spp. | • <i>Shigella</i> spp. |
| • <i>Aerobacter aerogenes</i> | • <i>Pasteurella</i> spp. | |
| • <i>Enterobacter</i> spp. | • <i>Proteus</i> spp. | |

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Неокальф применяют телятам, в том числе в неонатальный период, с лечебной целью при криптоспориidioзе, клостридиозе, сальмонеллёзе, колибактериозе, а также при других болезнях ЖКТ, возбудители которых чувствительны к нитазоксаниду и колистину.

Перед применением препарат тщательно взболтать в течение 30 секунд.




ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Телята	для лечения криптоспориديоза	однократно перорально индивидуально с помощью дозатора или с индивидуальной порцией молока, молозива, ЗЦМ, воды	1-2 мл на 10 кг массы тела животного	3-5 дней
	для лечения смешанных инфекций		2 мл на 10 кг массы тела животного	

При задаче телятам препарата Неокальф в смеси с молоком, молозивом, ЗЦМ или водой необходимо тщательно перемешать смесь непосредственно перед задачей.

1 НАЖАТИЕ ДОЗАТОРА = 5 МЛ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, а также тяжелые поражения печени и почек.

При передозировке лекарственного препарата может наблюдаться беспокойство, дезориентация, потеря аппетита, тошнота, диарея.

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении Неокальф с препаратами, действующие вещества которых имеют высокую степень связывания с белками по причине конкуренции в этом случае с нитазоксанидом (например, варфарин). Рекомендуемый интервал между применением вышеперечисленных лекарственных средств и препаратом Неокальф должен составлять не менее двух часов.

ОГРАНИЧЕНИЯ



13 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.



Нитокс® 200 **ХИТ**

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

200 мг окситетрациклин

 ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл

100 мл



САМЫЙ ПРИМЕНЯЕМЫЙ¹ ПРЕПАРАТ ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА НА ОСНОВЕ МАГНИЕВОГО КОМПЛЕКСА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованная технология производства, позволяющая добиться высокого качества;
- Курс лечения - 1 инъекция;
- Доверие профессионалов в области ветеринарии;
- Выгодная стоимость лечения.




для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нитокс 200 относится к антибактериальным лекарственным препаратам. Окситетрациклин, входящий в состав препарата, действует бактериостатически на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| • Streptococcus | • Pseudomonas |
| • Staphylococcus | • Actinobacteria |
| • Corynebacterium | • Escherichia coli |
| • Clostridium erysipeloidum | • Chlamydia |
| • Pasteurella | • Rickettsia |
| • Fusobacteriia | • Spirochaetales |
| • Salmonella | |

Введение одной дозы обеспечивает эффективную концентрацию в плазме крови в течение 3-4 дней, что в большинстве случаев достаточно для проведения курса лечения



¹ По данным исследований консалтинговой компании CONCOL

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нитокс 200 применяют крупному, мелкому рогатому скоту для лечения инфекционных заболеваний, вызванных чувствительными к окситетрациклину возбудителями, в том числе: респираторные заболевания бактериальной этиологии, пастереллез, атрофический ринит, энзоотический аборт, мастит, кератоконъюнктивит, копытная гниль, гнойный артрит, пупочный сепсис, абсцесс, перитонит, раневые и послеродовые инфекции, анаплазмоз, а также вторичные инфекции при вирусных заболеваниях.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Дозировка и способ введения	Длительность курса
КРС, МРС	1 мл на 10 кг Глубоко внутримышечно	Однократно. При необходимости повторить через 72 ч.

Максимальная доза для введения в одну точку тела: крупному рогатому скоту – 20 мл, мелким животным – 5-10 мл. Если объем вводимого раствора более указанного, его следует вводить животным в несколько мест.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Лекарственный препарат нельзя применять одновременно с кортикостероидами и эстрогенами. В связи с выраженным снижением антибактериального эффекта окситетрациклина препарат не рекомендуется применять одновременно с антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового ряда.

ОГРАНИЧЕНИЯ



28 суток



7 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия флакона – не более 28 суток.



Нитокс® Форте

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

300 мг окситетрациклин, 20 мг флуниксин меглумин

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



СУПЕРПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОКСИТЕТРАЦИКЛИН, УСИЛЕННЫЙ НПВС, ДЛЯ КРС С ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 5 ДНЕЙ С ОДНОЙ ИНЪЕКЦИЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сверхдолгое действие 5 дней обеспечивает удобство лечения;
- Быстрый лечебный эффект в течение первого часа;
- Восстановление продуктивных качеств в течение 12 часов;
- НПВС в составе препарата повышает эффективность антибиотикотерапии.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код


ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нитокс Форте относится к группе окситетрациклинов в комбинациях антибактериальных препаратов. Окситетрациклин, антибиотик из группы тетрациклинов, входящий в состав препарата, действует бактериостатически на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| • Streptococcus | • Pseudomonas |
| • Staphylococcus | • Actinobacteria |
| • Corynebacterium | • Escherichia coli |
| • Clostridium erysipeloidum | • Chlamydia |
| • Pasteurella | • Rickettsia |
| • Fusobacteriia | • Spirochaetales |
| • Salmonella | |

При внутримышечном введении окситетрациклин быстро всасывается из места инъекции и достигает максимальных концентраций в органах и тканях через 30-50 минут после введения.

Особая форма препарата обеспечивает его **длительное действие** в течение **5 дней** и антибактериальную активность против широкого спектра возбудителей.




Флуниксин оказывает вспомогательное действие, увеличивающее эффективность терапии окситетрациклином.

Концентрация флуниксина резко нарастает и достигает своего максимума в течение первого часа после инъекции, после чего обеспечивает противовоспалительное и жаропонижающее действие в течение 12 часов, продолжительностью до 24 часов.




ПОЛНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ С ОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Проведенные клинические испытания Нитокс Форте при лечении острого трахеобронхита телят, осложненного гастроэнтеритом, показали высокие результаты. После однократного применения Нитокс Форте **выздоровление** наблюдалось в течение **3 дней** после одной инъекции. **В течение первых суток** отмечалось **исчезновение клинических симптомов** и улучшение аппетита. Препараты сравнения применялись двукратно, при этом выздоровление наступало на сутки дольше.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИТОКС ФОРТЕ ПРЕВОСХОДИТ МОНОТЕРАПИЮ



При лечении респираторных заболеваний телят Нитокс Форте по терапевтической эффективности **превосходит монотерапию** препаратом на основе окситетрациклина. Полное клиническое **выздоровление** отмечалось на **2-3 суток быстрее**, чем при проведении монотерапии препаратом, содержащим 20% окситетрациклина.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нитокс Форте применяют крупному рогатому скоту для лечения острых и хронических заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, пастереллеза, перитонита, гнойного артрита, операционных, раневых инфекций, кератоконъюнктивитов, копытной гнили, анаплазмоза и других первичных и вторичных инфекций бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к тетрациклинам.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Дозировка и способ введения	Длительность курса
КРС	1 мл на 10 кг м. ж., глубоко внутримышечно	1 введение (однократное)

В случае необходимости и при хроническом течении болезни допускается повторное введение через 5 суток.

Максимальная доза для введения в одно место для взрослых животных - 10 мл, для молодняка - 5 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказаниями к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к антибиотикам тетрациклинового ряда и/или нестероидным противовоспалительным средствам. Запрещается внутривенное или внутриартериальное введение Нитокс Форте, его применение при сердечной, печеночной или почечной недостаточности и животным, больным микозами, а также дойным коровам, молоко которых используется в пищевых целях.

ОГРАНИЧЕНИЯ



35 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки - не более 28 суток.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не следует использовать автоматические инъекторы и многоразовые шприцы с комплектующими из поливинилхлорида для применения Нитокс Форте, так как компоненты препарата могут на них воздействовать.

Промывание многоразовых шприцев и инъекторов этиловым спиртом 95% сразу после их использования снижает вероятность негативного воздействия компонентов препарата на комплектующие. Для этого шприц или инъектор необходимо полностью заполнить спиртом и оставить на 5-10 минут, затем удалить спирт из инструмента.

Номицеф®

НОВИНКА

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

25 мг цефкином

ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ИНЪЕКЦИОННЫЙ ЦЕФКИНОМ ОТ КЛЮЧЕВОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - КАЧЕСТВО МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Короткие сроки ограничения на молоко и мясо;
- Широкий спектр действия, эффективный при ротации антибиотиков;
- Доступность современных решений.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефкинома сульфат - цефалоспорин четвертого поколения, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе:

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • <i>Escherichia coli</i> | • <i>Bacillus spp.</i> |
| • <i>Citrobacter spp.</i> | • <i>Corynebacterium spp.</i> |
| • <i>Klebsiella spp.</i> | • <i>Staphylococcus spp.</i> |
| • <i>Mannheimia haemolytica</i> | • <i>Streptococcus spp.</i> |
| • <i>Pasteurella multocida</i> | • <i>Bacteroides spp.</i> |
| • <i>Proteus spp.</i> | • <i>Clostridium spp.</i> |
| • <i>Salmonella spp.</i> | • <i>Fusobacterium spp.</i> |
| • <i>Serratia marcescens</i> | • <i>Prevotella spp.</i> |
| • <i>Histophilus somni</i> | • <i>Actinobacillus spp.</i> |
| • <i>Arcanobacterium pyogenes</i> | • <i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i> , |

включая штаммы, продуцирующие β -лактамазу.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Номицеф назначают крупному рогатому скоту для лечения респираторных заболеваний; пальцевого дерматита, инфекционного бульбарного некроза и острого межпальцевого некробактериоза (копытной гнили); острого мастита; эшерихиоза (колибактериоза) телят.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Номицеф вводят животным внутримышечно один раз в сутки в течение 2-5 дней, в дозах, указанных в таблице.

Вид животного	Показания	Дозировка	Курс применения
КРС	Респираторные заболевания, пальцевый дерматит, инфекционный бульбарный некроз и острый межпальцевый некробактериоз (копытная гниль)	1 мг цефкином/1 кг массы животного (1 мл препарата/ 25 кг массы животного)	3-5 дней
	Острый мастит		2 дня
	Эшерихиоз телят (колибактериоз)	2 мг цефкином/1 кг массы животного (2 мл препарата/ 25 кг массы животного)	3-5 дней

Рекомендуется вторую и последующие инъекции делать в различные места. Перед каждым использованием, флакон с препаратом следует тщательно встряхнуть.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, а также к другим β -лактамным антибиотикам.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток



1 сутки

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

Пневмотил®


РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

250 мг тилмикозина фосфат

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл

1 л



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Направленное действие и длительная защита благодаря концентрации в клетках иммунной системы;
- Преодолевает резистентность к предыдущим поколениям макролидов;
- Высокоэффективен против микоплазм;
- Сбалансирован для разведения в воде;
- Высокая стабильность в жесткой воде.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилмикозина фосфат, входящий в состав препарата, относится к антибиотикам группы макролидов, активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:

- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Pasteurella spp.*
- *Clostridium spp.*
- *Arcanobacterium spp.*
(*Corynebacterium*)
- *Brachyspira hyodysenteriae*
- *Chlamydia spp.*
- *Spirochaeta spp.*
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Mannheimia haemolytica*
- *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Пневмотил назначают с лечебной целью телятам при респираторных болезнях, вызванных *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma dispar*, а также при смешанных инфекциях, вторичных инфекциях при вирусных болезнях и других заболеваниях животных, возбудители которых чувствительны к тилмикозину.






ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс применения
Телята	индивидуально с водой для поения или заменителем молока	0,5 мл/10 кг м. ж. два раза в день	3-5 дней подряд

Лечебный раствор готовят ежедневно (срок хранения не более 24 часов).

Схема фагоцитоза лейкоцитами, обогащёнными **ТИЛМИКОЗИНОМ**.



Уникальные фармакокинетические свойства препарата Пневмотил позволяют применять его при различных респираторных заболеваниях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается применение препарата Пневмотил с антибиотиками аминогликозидного ряда, ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений (диарея, анорексия, парезы, нефротоксические эффекты).

В целях предотвращения адсорбции и снижения антибактериальной активности лекарственное средство не следует применять одновременно с препаратами и кормовыми добавками, содержащими бентонит.

Не допускается применение препарата Пневмотил взрослым жвачным с развитым рубцовым пищеварением, животным с выраженными нарушениями функции печени и (или) почек.

ОГРАНИЧЕНИЯ



35 суток - ТЕЛЯТА

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 3-х месяцев.

Тилозин 50 и 200 **ХИТ**

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

50 МГ И 200 МГ ТИЛОЗИН СООТВЕТСТВЕННО

20 мл

 ПО РЕЦЕПТУ

50 мл

50 мл

100 мл

100 мл

ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ С ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ТИЛОЗИНА В ВИДЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ПРИ БОЛЕЗНЯХ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ, ЛИДЕР ПРОДАЖ СРЕДИ ИНЪЕКЦИОННЫХ МАКРОЛИДНЫХ АНТИБИОТИКОВ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тилозин основание обладает большей стабильностью и эффективностью в отличие от тилозина тартрата;
- Один из наиболее безопасных антибиотиков;
- Обладает хорошей переносимостью;
- Экономически выгодная стоимость курса лечения;
- Короткие сроки ограничения по мясу и молоку.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилозин 50 и Тилозин 200 относятся к антибактериальным препаратам группы макролидов. Тилозин оказывает бактериостатическое действие, подавляя белковый синтез в бактериальных клетках. Тилозин активен против грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе:

- *E. coli.*
- *Bacillus anthracis*
- *Pasteurella spp.*
- *Haemophilus spp.*
- *Leptospira spp.*
- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Erysipelothrix spp.*
- *Corynebacterium spp.*
- *Mycoplasma spp.*
- *Chlamydia spp.*
- *Treponema spp.*
- *Brachyspira*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тилозин 50 и Тилозин 200 применяют для лечения:

- Бронхопневмонии крупного и мелкого рогатого скота;
- Маститов крупного рогатого скота;
- Инфекционной агалактии овец и коз;
- Вторичных инфекций при вирусных заболеваниях.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тилозин 50 и Тилозин 200 вводятся только внутримышечно 1 раз в сутки 5-7 дней подряд. При повторном применении необходимо менять место инъекции. Рекомендуемые дозы из расчёта на 1 кг массы животного.

Вид животного	Тилозин 50	Тилозин 200
Крупный рогатый скот, телята	0,1-0,2 мл	0,025-0,05 мл
Овцы, козы	0,2-0,24 мл	0,05-0,06 мл

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не рекомендуется одновременное применение с тиамулином, клиндамицином, левомицетином, пенициллинами (особенно с ампициллином и оксациллином), цефалоспоринами и линкомицином в связи с выраженным снижением антибактериального эффекта тилозина.

ОГРАНИЧЕНИЯ



8 суток



4 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки - не более 28 суток.

Тулатрин®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг тулатромицин

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СВЕРХПРОЛОНГИРОВАННЫЙ МАКРОЛИД НА ОСНОВЕ ТУЛАТРОМИЦИНА ДЛЯ КОНТРОЛЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У КРС С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимум эффективности при метафилактике;
- Одна инъекция - весь курс применения;
- Период защиты до 15 дней;
- Высокая концентрация в легких.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тулатрин – антибактериальный лекарственный препарат, относится к группе макролидов.

Тулатромицин – действующее вещество препарата – обладает широким спектром действия в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе и в отношении:

- | | |
|---|------------------------------------|
| • <i>Pasteurella</i> spp. | • <i>Moraxella</i> spp. |
| • <i>Mannheimia (Pasteurella) haemolytica</i> | • <i>Moraxella bovis</i> |
| • <i>Pasteurella multocida</i> | • <i>Neisseria</i> spp. |
| • <i>Haemophilus</i> spp. | • <i>Streptococcus</i> spp. |
| • <i>Haemophilus somnus</i> | • <i>Staphylococcus</i> spp. |
| • <i>Haemophilus parasuis</i> | • <i>Staphylococcus aureus</i> |
| • <i>Mycoplasma</i> spp. | • <i>Bordetella</i> spp. |
| • <i>Mycoplasma bovis</i> | • <i>Bordetella bronchiseptica</i> |
| • <i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> | • <i>Enterococcus</i> spp. |
| • <i>Mycoplasma bovigenitalium</i> | • <i>Enterococcus faecalis</i> |
| • <i>Actinobacillus</i> spp. | • <i>Enterobacter</i> spp. |
| • <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> | • <i>Enterobacter agglomerans</i> |

Механизм бактериостатического действия тулатромицина основан на подавлении белкового синтеза на рибосомальном уровне.

Тулатромицин быстро всасывается из места инъекции, достигая пика концентрации в плазме крови через 30 минут после введения, и медленно выводится из организма. Препарат накапливается в нейтрофилах и альвеолярных макрофагах, в результате чего достигается повышенная концентрация тулатромицина в легких.




для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





ЗАЩИТА ОТ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ КРС

После однократной инъекции Тулатрин способен обеспечивать высокую терапевтическую концентрацию в легочной ткани более чем 15 дней. При этом его концентрация в средостенных лимфоузлах у крупного рогатого скота даже на 19-й день после инъекции находится на уровне, превышающем минимальную ингибирующую концентрацию для основных респираторных патогенов в несколько раз.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тулатрин назначают:

- крупному рогатому скоту для лечения бактериальных инфекций, вызываемых *Mannheimia* (*Pasteurella*) *haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus* и *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma bovis genitalium*, *Enterococcus faecalis*, *Enterobacter agglomerans*, *Staphylococcus aureus*, инфекционного кератоконъюнктивита, вызываемого *Moraxella bovis*, *Neisseria* spp., и других заболеваний, возбудители которых чувствительны к тулатромицину;
- в целях предотвращения распространения заболеваний допускается назначение препарата в терапевтической дозе группе животных, контактирующей с больным животным и не имеющей клинических признаков заболевания.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс применения
КРС	Подкожно	1мл/40 кг м.т.ж.	Однократно

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применять Тулатрин животным при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата, а также дойным коровам, молоко которых используют в пищевых целях.

Препарат запрещается применять стельным коровам и телкам менее чем за 2 месяца до ожидаемого срока отела, если молоко планируется использовать в пищевых целях. Возможность применения препарата самкам в период беременности и вскармливания приплода определяет лечащий ветеринарный врач на основании оценки отношения пользы к возможному риску применения препарата.

В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Тулатрин не рекомендуется применять одновременно с другими макролидами и линкозамидами, а также смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



49 суток - КРС*

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

* При условии зачистки (выбраковки) места инъекции (диаметр 15 см, глубина 2,5 см). При отсутствии возможности определения точной локализации места инъекции, убой крупного рогатого скота разрешается не ранее 55 суток после применения препарата.



Флорокс

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

300 мг флорфеникол

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ОДИН ИЗ САМЫХ ДОСТУПНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ФЛОРФЕНИКОЛА НА РЫНКЕ РФ И СТРАН СНГ, ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ТЕЛЯТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Флорфеникол разработан специально для ветеринарии;
- Снижение потерь молодняка и сохранение привесов за счет быстрого действия препарата;
- Повышенная биодоступность.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флорфеникол, входящий в состав препарата, обладает бактериостатическим действием и активен в отношении бактерий, которые вырабатывают ацетилтрансферазу, и являются устойчивыми к хлорамфениколу. Флорфеникол обладает широким спектром антибактериального действия, в том числе в отношении:

- *Staphylococcus* spp.
- *Streptococcus* spp.
(в т. ч. *Streptococcus pneumoniae*)
- *Escherichia coli*
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Pasteurella* spp.
(в т. ч. *Pasteurella multocida*)
- *Bordetella bronchiseptica*
- *Haemophilus* spp.
(в т. ч. *Haemophilus parasuis*,
Haemophilus somnus)
- *Fusobacterium necrophorum*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Moraxella bovis*
а также микоплазм:
- *M. hyopneumoniae*
- *M. hyorhinis*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Флорокс назначают крупному рогатому скоту для лечения заболеваний бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к флорфениколу: болезни органов дыхания, вызванные *Pasteurella multocida*, *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus somnus*, некробактериоз, инфекционный кератоконъюнктивит, вызванный *Moraxella bovis*.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка	Курс лечения
КРС	Внутримышечно	1 мл/15 кг м. ж. (флорфеникола 20 мг/кг м. ж.)	Двукратно с интервалом 48 часов
	Подкожно	2 мл/15 кг м. ж. (флорфеникола 40 мг/кг м. ж.)	Однократно

Максимальный объём введения препарата Флорокс в одно место животному не должен превышать 10 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата беременным и лактирующим самкам. Не допускается одновременное применение препарата Флорокс с тиаμφениколом и хлорамфениколом, а также смешивание его в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



34 суток - КРС (в/м),
42 суток - КРС (п/к)

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки - не более 30 суток.



Цефтонит® ХИТ

СУСПЕНЗИЯ, ИНЪЕКЦИОННО

50 мг цефтиофур

 ПО РЕЦЕПТУ



100 мл

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ШИРОКОГО СПЕКТРА
ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОЛОКУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КРС

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подтвержденная эффективность лечения маститов¹;
- Отсутствуют ограничения по молоку;
- Быстрое терапевтическое действие через 1-2 часа;
- Удобная дозировка: одна инъекция – одно место введения;
- Возможно применение препарата фактически до убоя, за счет коротких сроков ограничений по использованию мяса.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефтиофур, входящий в состав препарата Цефтонит, - цефалоспориновый антибиотик третьего поколения, широкого спектра действия, оказывающий бактерицидное действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии, включая штаммы, продуцирующие β -лактамазу, и некоторые анаэробные бактерии:

- | | |
|---|--|
| • <i>Actinobacillus</i> spp. | • <i>Pasteurella multocida</i> |
| • <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> | • <i>Porphyromonas</i> spp. |
| • <i>Actinomyces</i> spp. | • <i>Porphyromonas assacharolytica</i>
(<i>Bacteroides melaninogenicus</i>) |
| • <i>Actinomyces pyogenes</i> | • <i>Porphyromonas levii</i> , |
| • <i>Bacillus</i> spp. | • <i>Proteus</i> spp. |
| • <i>Citrobacter</i> spp. | • <i>Salmonella</i> spp. |
| • <i>Enterobacter</i> spp. | • <i>Salmonella choleraesuis</i> |
| • <i>Escherichia</i> spp. | • <i>Salmonella typhimurium</i> |
| • <i>Escherichia coli</i> | • <i>Staphylococcus</i> spp. |
| • <i>Fusobacterium</i> spp. | • <i>Staphylococcus aureus</i> |
| • <i>Fusobacterium necrophorum</i> | • <i>Streptococcus</i> spp. |
| • <i>Haemophilus</i> spp. | • <i>Streptococcus suis</i> |
| • <i>Haemophilus parasuis</i> | • <i>Streptococcus zooepidemicus</i> |
| • <i>Histophilus somni</i>
(<i>Haemophilus somnus</i>) | • <i>Streptococcus equi</i> |
| • <i>Klebsiella</i> spp. | • <i>Streptococcus uberis</i> |
| • <i>Pasteurella</i> spp. | • <i>Streptococcus agalactiae</i> |
| • <i>Pasteurella (Mannheimia)</i>
<i>haemolytica</i> | • <i>Streptococcus dysgalactiae</i> |
| | • <i>Streptococcus bovis</i> |

¹ Эффективность подтверждена клиническими испытаниями




ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Цефтонит применяют с лечебной целью: крупному рогатому скоту при бактериальных инфекциях органов дыхания, вызываемых *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, некробактериоза, ассоциированного с *Fusobacterium necrophorum* и *Porphyromonas assacharolytica* (*Bacteroides melaninogenicus*), и острого эндометрита.


ФЛУНЕКС В КОМПЛЕКСЕ С ЦЕФТОНИТ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ

Совместное применение при маститах у коров препаратов Цефтонит и Флунекс в сниженной дозировке (1 мл/45 кг массы животного) позволяет сократить сроки выздоровления при гнойно-катаральном мастите на 12 часов, по сравнению с терапией одним препаратом Цефтонит².

Результаты лечения коров при субклиническом мастите (n = 15, P = 0,95)



Результаты лечения коров при клиническом мастите (n = 15, P = 0,95)



² Исследования проводились на базе хозяйства Марковского района Саратовской области. Для проведения эксперимента использовали коров дойного стада черно-пестрой породы средней массой 450-550 кг в возрасте от 2-х до 5 лет с диагнозом клинический и субклинический мастит. По принципу аналогов с учетом диагноза были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой.

³ Количество соматических клеток в 1 см³ не более 170 000



После парентерального введения цефтиофур быстро метаболизируется в десфуроилцефтиофур и создает в организме терапевтические концентрации на протяжении не менее 20 ч. Максимальная концентрация антибиотика в организме животных достигается через 0,5-2 часа после введения препарата Цефтонит. Выводится десфуроилцефтиофур из организма преимущественно через почки.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения	Курс лечения, дней
КРС	Заболевания дыхательных путей	п/к	1 мл/50 кг	1 раз в сутки	3-5
	Некробактериоз				3
	Эндометрит				5

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность животных к цефтиофуру и другим бета-лактамам антибиотикам. Цефтонит не следует применять одновременно с тетрациклинами, левомицетином, аминогликозидами, фуросемидом, этакридиновой кислотой.

ОГРАНИЧЕНИЯ



8 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.

Цефтонит® Форте

СУСПЕНЗИЯ, ИНЪЕКЦИОННО

200 мг цефтиофур (пролонгированная форма)

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает 7 дней;
- Без ограничений по молоку;
- Курс лечения - 1 инъекция;
- Эффективен при полиартритах и полисерозитах.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефтонит Форте обладает широким спектром действия в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая некоторые анаэробные бактерии и штаммы, продуцирующие β -лактамазу, в том числе:

- *Actinobacillus* spp.
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Actinomyces* spp.
- *Actinomyces pyogenes*
- *Bacillus* spp.
- *Citrobacter* spp.
- *Enterobacter* spp.
- *Escherichia* spp.
- *Escherichia coli*
- *Fusobacterium* spp.
- *Fusobacterium necrophorum*
- *Haemophilus* spp.
- *Haemophilus parasuis*
- *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*)
- *Klebsiella* spp.
- *Pasteurella* spp.
- *Pasteurella* (*Mannheimia*) *haemolytica*
- *Pasteurella multocida*
- *Porphyromonas* spp.
- *Porphyromonas asaccharolytica* (*Bacteroides melaninogenicus*)
- *Porphyromonas levii*
- *Proteus* spp.
- *Salmonella* spp.
- *Salmonella choleraesuis*
- *Salmonella typhimurium*
- *Staphylococcus* spp.
- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus* spp.
- *Streptococcus suis*
- *Streptococcus zooepidemicus*
- *Streptococcus equi*
- *Streptococcus uberis*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus dysgalactiae*
- *Streptococcus bovis*




для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Цефтонит Форте



**ЦЕФТОНИТ ФОРТЕ: 1 ИНЪЕКЦИЯ - 7 ДНЕЙ ДЕЙСТВИЯ**

Цефтонит Форте быстро резорбируется из места инъекции, достигает **максимальной концентрации** в плазме крови уже **через 12 часов** и благодаря особой пролонгированной форме цефтиофура сохраняется на терапевтическом уровне не менее **7 дней**.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ С ОДНОЙ ИНЪЕКЦИИ

Цефтонит Форте обладает высокой терапевтической эффективностью в лечении различных актуальных заболеваний КРС, в том числе при маститах, что доказано испытаниями.

Вид животного	Голов	Заболевание	Количество инъекций	Срок выздоровления	Терапевтическая эффективность
Коровы	25	Эндометрииты	1	72 ч	100 %
	30	Субклинический, острый, скрытый и клинический маститы			
Телята	50	Респираторные заболевания (трахеобронхит)			

Цефтонит Форте демонстрирует максимальную эффективность при минимальных трудозатратах

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Крупному рогатому скоту Цефтонит Форте назначают для лечения респираторных инфекций бактериальной этиологии, вызываемых *Pasteurella* (*Mannheimia*) *haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, для лечения некробактериоза, вызываемого *Fusobacterium necrophorum* и *Porphyromonas levii*, *Bacteroides* spp., *Prevotella* spp., а также для лечения острого эндометриита, вызываемого *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* и *Fusobacterium necrophorum*, а также других заболеваний, возбудители которых чувствительны к цефтиофуру.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед применением Цефтонит Форте флакон встряхивают до получения однородной суспензии.
2. В холодное время года препарат рекомендуется нагревать до комнатной температуры (18-23 °С).
3. Иглу вводят подкожно у основания уха, вперёд по направлению на противоположный глаз животного.
4. КРС вводят однократно в дозе 1 мл на 30 кг массы животного, не более 30 мл лекарственного препарата в одно место.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению препарата Цефтонит Форте является индивидуальная повышенная чувствительность животных к β -лактамным антибиотикам. При совместном применении с аминогликозидами и/или петлевыми диуретиками, особенно при имеющемся нарушении функции почек, возможно повышение риска нефротоксичности. Недопустимо совместное применение с тетрациклинами и амфениколами, так как возможно значительное падение, вплоть до полной утраты, их противомикробной активности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



20 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.



Энронит®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

50 мг энрофлоксацин, 500 000 МЕ колистин

 ПО РЕЦЕПТУ

50 мл

100 мл



КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В БОРЬБЕ С КОЛИБАКТЕРИОЗОМ, К КОТОРОМУ МЕДЛЕННО ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЗА СЧЕТ СИНЕРГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ЭНРОФЛОКСАЦИНА И КОЛИСТИНА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективнее монопрепаратов на основе энрофлоксацина с сопоставимой стоимостью курса лечения;
- Медленное привыкание микроорганизмов в сравнении с препаратами, содержащими только энрофлоксацин в качестве действующего вещества, позволяет применять препарат в течение длительного времени;
- Высокая эффективность в борьбе с колибактериозом;
- Компоненты препарата обладают синергетическим эффектом.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Входящие в состав препарата Энронит энрофлоксацин и колистина сульфат обладают синергидным действием, обеспечивают широкий спектр антимикробной активности лекарственного средства в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Механизм действия энрофлоксацина, соединения группы фторхинолонов, основан на ингибировании активности фермента гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки, что приводит к нарушению синтеза белков и подавлению роста и развития грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| • <i>Escherichia coli</i> | • <i>Pseudomonas aeruginosa</i> |
| • <i>Haemophilus spp.</i> | • <i>Mycoplasma spp.</i> |
| • <i>Pasteurella spp.</i> | • <i>Enterobacter spp.</i> |
| • <i>Salmonella spp.</i> | • <i>Proteus mirabilis</i> |
| • <i>Staphylococcus spp.</i> | • <i>Proteus vulgaris</i> |
| • <i>Streptococcus spp.</i> | • <i>Klebsiella spp.</i> |
| • <i>Clostridium perfringens</i> | • <i>Erysipelothrix spp.</i> |
| • <i>Bordetella spp.</i> | • <i>Actinobacillus spp.</i> |
| • <i>Campylobacter spp.</i> | • <i>Fusobacterium spp.</i> |
| • <i>Corynebacterium pyogenes</i> | • <i>Bacteroides spp.</i> |



Колистина сульфат нарушает проницаемость клеточной стенки бактерии путем соединения с липопротеинами, что приводит к изменению внутриклеточного метаболизма и вызывает гибель грамотрицательных бактерий, в том числе:

- **Escherichia coli**
- **Pseudomonas aeruginosa**
- **Klebsiella spp.**
- **Salmonella spp.**
- **Proteus spp.**

Максимальная концентрация энрофлоксацина в сыворотке крови достигается через 1-2 часа, колистина сульфата - через 1 час.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Энронит назначают телятам, ягнятам для лечения колибактериоза, сальмонеллеза, пастереллеза, респираторных и других заболеваний, вызванных чувствительными к энрофлоксацину и колистину микроорганизмами.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка	Кратность применения	Курс лечения
Телята, ягнята	Подкожно	0,5 мл/10 кг м. ж.	Однократно	3-5 дней

В связи с возможной болевой реакцией не следует вводить в одно место телятам более 5 мл, ягнятам – более 2,5 мл лекарственного препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается применение препарата Энронит одновременно с левомицетином, антибиотиками групп макролидов и тетрациклинов, теофилином и нестероидными противовоспалительными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



21 сутки

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

ТУЛАТРИН®



По рецепту

**ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СВЕРХПРОЛОНГИРОВАННЫЙ МАКРОЛИД
НА ОСНОВЕ ТУЛАТРОМИЦИНА ДЛЯ КОНТРОЛЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ
ИНФЕКЦИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У КРС И СВИНЕЙ С ПЕРВЫХ
ДНЕЙ ЖИЗНИ**

- ▶ Максимум эффективности при метафилактике
- ▶ Одна инъекция - весь курс применения
- ▶ Период защиты до 15 дней
- ▶ Высокая концентрация в легких

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



Альвет	65
Альвет-суспензия	67
Ивермек	69
Ивермек-ОН 	71
Клозатрем	73
Левамизол 75	75
Мерадок	77
Неозидин	80
Неозидин М	82
Риказол 	84
Цифлунит	86
Цифлунит-ОН	88
Цифлунит Флок 	90



Альвет®

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

200 мг альбендазол

 ПО РЕЦЕПТУ

50 г

500 г

12,5 кг



БЕЗОПАСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С ИНВАЗИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ, ОБЛАДАЮЩЕЕ ПОВЫШЕННОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И РЕЦЕПТУРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность в отношении нематод, цестод и трематод;
- Повышенная биодоступность за счет специально подобранных компонентов;
- Особые вкусовые добавки обеспечивают хорошую поедаемость животными.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Альвет обладает широким спектром антигельминтного действия, эффективен при моно- и полиинвазиях, активен в отношении имаго и личинок нематод и цестод, а также имаго трематод. Обладая овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат Альвет назначают без предварительной голодной диеты и применения слабительных средств согласно приведенным в таблице ниже данным.

ВНИМАНИЕ

Перед массовой дегельминтизацией каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (10-15 голов). При отсутствии в течение 3-х суток осложнений приступают к обработке всего поголовья.





Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Индивидуально:				
КРС	мониезиоз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы	в смеси с концентрированными кормами	3,75 г/100 кг м. ж. (альбендазола 7,5 мг/1 кг м. ж.)	однократно
	хронический фасциолез		5,0 г/100 кг м. ж. (альбендазола 10,0 мг/1 кг м. ж.)	
Лошади	параскаридоз, стронгилятозы (альфортиоз, делафондиоз), аноплосцефалез и циаостомоз		3,75 г/100 кг м. ж. (альбендазола 7,5 мг/1 кг м. ж.)	
Индивидуально или групповым способом:				
Овцы	мониезиоз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы	в смеси с концентрированными кормами	2,5 г/100 кг м. ж. (5,0 мг/кг альбендазола)	однократно
	хронический фасциолез		3,75 г/100 кг м. ж. (7,5 мг/кг альбендазола)	

При групповом способе применения навеску препарата Альвет, рассчитанную на группу не более 150 овец, тщательно смешивают с комбикормом (из расчета 50-100 г комбикорма на животное). Смесь раскладывают в кормушки, обеспечивая животным свободный доступ к ним.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение лекарственного препарата стельным коровам и жеребым лошадям в первую треть беременности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



20 суток



4 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 60 суток.

Альвет®-суспензия

СУСПЕНЗИЯ, ПЕРОРАЛЬНО



100 мг альбендазол

100 мл

1 л



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность в отношении легочных и желудочно-кишечных нематод, цестод и трематод;
- Повышенная стабильность и биодоступность суспензии за счет оригинальной рецептуры и технологии микронизации частиц.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Альвет-суспензия обладает широким спектром антигельминтного действия, эффективен при моно- и полиинвазиях, активен в отношении имаго и личинок нематод, цестод, а также имаго трематод; обладая овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат Альвет-суспензия назначают с лечебной и профилактической целью, крупному рогатому скоту, овцам и лошадям при нематодозах, трематодозах и цестодозах.

Препарат вводят индивидуально в дозах, указанных в таблице. Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	мониезиоз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы	перорально	7,5 мл/100 кг м. ж. (альбендазола 7,5 мг/1 кг м. ж.)	однократно
	хронический фасциолез		10 мл/100 кг м. ж. (альбендазола 10,0 мг/1 кг м. ж.)	
Лошади	параскаридоз, стронгилятозы (альфортиоз, деляфондиоз), аноплосцефалез и циастостомоз		7,5 мл/100 кг м. ж. (альбендазола 7,5 мг/1 кг м. ж.)	
Овцы	мониезиоз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы		0,5 мл/10 кг м. ж.	
	хронический фасциолез		0,75 мл/10 кг м. ж.	



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

Перед применением препарат необходимо тщательно взболтать.





Перед массовыми обработками каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (10-15 голов), за которыми ведут наблюдение в течение 3 суток. При отсутствии осложнений препарат применяют всему поголовью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата стельным коровам и жеребым лошадям в первую треть, а суягным овцам - в первую половину беременности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



20 суток



7 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 60 суток.

Ивермек®

ХИТ

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

10 мг ивермектин, 40 мг витамин Е

ПО РЕЦЕПТУ

1 мл	100 мл
20 мл	250 мл
50 мл	500 мл



ЛИДЕР ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ С УНИКАЛЬНОЙ ВОДНО-ДИСПЕРСНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ ИВЕРМЕКТИНА И ВИТАМИНА Е ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованная водно-дисперсная форма;
- Быстрое всасывание без раздражения места инъекции;
- Содержит самые активные изомеры авермектинов;
- Витамин Е оказывает антиоксидантное действие.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Ивермек обладает выраженным противопаразитарным действием на личиночные и половозрелые стадии нематод желудочно-кишечного тракта, легких и глаз, личинок подкожных, носоглоточных, желудочных оводов, вшей, кровососок и саркоптоидных клещей. После введения препарата ивермектин быстро всасывается из места инъекции и распределяется в органах и тканях животного, обеспечивая паразитоцидное действие в течение 10-14 дней.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Ивермек применяют с лечебно-профилактической целью при арахноэнтомозах и нематодозах:

- крупному рогатому скоту при стронгилятозах, трихоцефалезе, стронгилоидозе, телязиозе, сифункулятозах, гиподерматозе, псороптозе; саркоптозе и хориоптозе;
- овцам и козам при диктиокаулезе, протостронгилезе, мюллерииозе, гемонхозе, остертагиозе, нематодирозе, маршаллагииозе, коопериозе, хабертиозе, эзофагостомозе, мелофагозе, буностомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе, маллофагозе, эстрозе, псороптозе и хабертиозе;
- оленям при диктиокаулезе, остертагиозе, нематодирозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе, эдемагенозе, цефеномиозе и саркоптозе;
- верблюдам при диктиокаулезе, остертагиозе, нематодирозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе и саркоптозе.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат Ивермек вводят животным с соблюдением правил асептики внутримышечно в область крупа или шеи в следующих дозах:

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС МРС Олени Верблюды	Нематодозы, арахноэнтомозы	В/м	1 мл/50 кг м. ж.	Однократно
	Тяжелые случаи саркоптоидозов			Двукратно с интервалом 8-10 дней

В случае если объем препарата превышает 10 мл, его следует вводить в несколько мест.

Обработку животных при нематодозах проводят осенью перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выводом на пастбище; при оводовых инвазиях обработку проводят сразу после окончания лета оводов; при арахно-энтомозах обработку проводят по показаниям.

Ивермек предварительно испытывают на небольшой группе животных. При отсутствии осложнений в течение 3 дней приступают к обработке всего поголовья.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не разрешается применение препарата Ивермек больным инфекционными болезнями и истощенным животным, а также беременным самкам, молоко которых будет использоваться в пищевых целях, менее чем за 28 суток до начала лактации.

ОГРАНИЧЕНИЯ



28 дней



28 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона – не более 42 суток.

Ивермек®-ON

РАСТВОР ДЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ

10 мг ивермектин

1 л



ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ ЭКТОПАРАЗИТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективность против эктопаразитов до 100%¹;
- Имеет нейтральный запах.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Ивермектин, входящий в состав средства, относится к полусинтетическим авермектинам, представляет собой смесь дигидроавермектинов В1а и В1b, обладает выраженным инсектоакарицидным действием на личинки и взрослые особи мух, вшей, блох, гамазовых (в т.ч. красного куриного клеща) и иксодовых клещей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ивермек-ON применяют для дезинсекции (или обработки) объектов ветеринарного надзора в отсутствие животных с целью уничтожения личинок и взрослых особей мух, вшей, блох, гамазовых (в т.ч. красного куриного клеща) и иксодовых клещей.

Средство обладает острой инсектицидной активностью и остаточным действием в течение 40 дней после применения.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Для дезакаризации используют свежеприготовленный под руководством ветеринарного врача или ветеринарного фельдшера рабочий раствор Ивермек-ON с концентрацией ДВ 0,01%, что соответствует разведению 1:100 (одна часть Ивермек-ON на 100 частей воды соответственно).

Для приготовления рабочих растворов Ивермек-ON разводят в воде при комнатной температуре, при равномерном перемешивании в течение 5 минут.

Срок использования рабочего раствора не должен превышать 24-х часов после его приготовления.

При использовании рабочего раствора Ивермек-ON применяют распыляющую или опрыскивающую аппаратуру различных марок.

Норма расхода рабочего раствора составляет 100 мл/м² (не впитывающая влагу поверхность) и 500 мл/м² (впитывающая влагу поверхность).



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



- Лучший продукт Международной выставки «AgroFarm» 2014г.

¹ Эффективность продукта подтверждена испытаниями в ГНУ ВИГИС им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии





Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям (при появлении насекомых).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Ивермек-ON не рекомендуется сочетать с другими инсектоакарицидными средствами.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия упаковки – 28 суток.

Клозатрем®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

50 мг клозантел

100 мл

250 мл



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ И ОВОДОВЫХ ИНВАЗИЙ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная эффективность при лечении фасциолёза;
- Лечение нематодозов и оводовых инвазий;
- Направленное действие инъекционного раствора.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Клозантел, входящий в состав лекарственного средства, является производным салициланилида, обладает широким спектром противопаразитарного действия в отношении нематод, трематод, а также личинок оводов:

- **Haemonchus spp.**
- **Nematodirus spp.**
- **Trichostrongylus spp.**
- **Ostertagia spp.**
- **Oesophagostomum radiatum**
- **Bunostomum spp.**
- **Chabertia ovis**
- **Fasciola hepatica**
- **Fasciola gigantica**
- **Hypoderma bovis**
- **Hypoderma lineatum**
- **Oestrus ovis**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Клозатрем назначают с лечебной и профилактической целью крупному рогатому скоту при гемонхозе, эзофагостомозе, буностомозе, трихостронгилезе, остертагиозе, фасциолезе и гиподерматозе; овцам и козам – при гемонхозе, нематодирозе, трихостронгилезе, хабертиозе, буностомозе, эзофагостомозе, фасциолезе и эстрозе.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	Нематодозы, фасциолёз	В/м или п/к	0,5 мл/10 кг м. ж. (клозантела 2,5 мг/кг м. ж.)	Однократно
	Гиподерматоз		1 мл/10 кг м. ж. (клозантела 5 мг/кг м. ж.)	
МРС	Нематодозы, эстроз	П/к	0,5 мл/10 кг м. ж. (клозантела 2,5 мг/кг м. ж.)	
	Фасциолёз		1 мл/10 кг м. ж. (клозантела 5 мг/кг м. ж.)	

Перед массовыми обработками каждую серию Клозатрема испытывают на небольшой группе (10-15 голов) животных разной упитанности.





При отсутствии в течение 3 дней осложнений лекарственное средство применяют всему поголовью. Обработку животных против гельминтов с лечебной целью проводят по показаниям, с профилактической – перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище, против оводовых инвазий – сразу после окончания лета оводов и весной (март - апрель).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата Клозатрем дойным животным, а также коровам, овцам, козам, менее чем за 30 суток до отела или окота, ввиду выделения препарата с молоком.

Не следует применять Клозатрем одновременно с хлороорганическими и фосфорорганическими инсектицидными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



28 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства. После первого вскрытия флакон хранят 28 суток.

Левамизол 75

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

75 мг левамизол

 ПО РЕЦЕПТУ

50 мл



ТРАДИЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ЛЕВАМИЗОЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРИ НЕМАТОДОЗАХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальное содержание ДВ;
- Эффективен при борьбе со всеми нематодами;
- Экономичен в применении.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левамизола гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает широким спектром нематоцидного действия, активен в отношении личиночных и половозрелых фаз развития нематод желудочно-кишечного тракта и легких.

- **Haemonchus spp.**
- **Ostertagia spp.**
- **Trichostrongylus spp.**
- **Cooperia spp.**
- **Dictyocaulus spp.**
- **Protostrongylus spp.**
- **Nematodirus spp.**
- **Bunostomum spp.**
- **Oesophagostomum spp.**
- **Chabertia spp.**
- **Ascaris suum**
- **Strongyloides ransomi**
- **Metastrongylus spp.**
- **Oesophagostomum spp.**
- **Toxocara spp.**
- **Toxascaris leonina**
- **Uncinaria stenocephala**
- **Ancylostoma caninum**

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят без предварительной голодной диеты и применения слабительных средств:

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС МРС	Диктиокаулез, гемонхоз, буностомоз, эзофагостомоз, нематодироз, остертагиоз, хабертиоз, коопериоз, стронгилоидоз	В/м или п/к	1 мл/10 кг м.ж.	Однократно

Максимально вводимая доза препарата не должна превышать:

- для крупного рогатого скота – 30 мл;
- для овец – 4,5 мл.





ВНИМАНИЕ

Перед массовыми обработками каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (5-10 голов), за которыми ведут наблюдение в течение 3 суток. При отсутствии осложнений лекарственное средство применяют всему поголовью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Левамизол 75 нельзя применять совместно, а также в течение 10 дней до и 10 дней после использования фосфорорганических лекарственных препаратов, пирантела, морантела и левомицетина.

ОГРАНИЧЕНИЯ



7 суток



3 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия флакона - 28 суток.

Мерадок®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

10 мг дорамектин

ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ АВЕРМЕКТИНОВ, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ИВЕРМЕКТИНУ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СВЕРХДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ОТ РЕИНВАЗИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Срок защиты от реинвазии - 28 дней;
- Курс лечения – 1 инъекция;
- Преодолевает резистентность к ивермектину.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Дорамектин, являющийся основным действующим веществом препарата Мерадок, относится к противопаразитарным лекарственным средствам системного действия класса макроциклических лактонов.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

После введения Мерадок **сохраняет защитное действие в течение 28 дней.**

Длительность действия Мерадок (на основе дорамектина)
и препарата на основе ивермектина




Длительность действия препарата Мерадок превосходит цикл развития саркоптоидных клещей, что **гарантирует защиту от реинвазии.**





Динамика изменения концентрации дорамектина в сыворотке крови после применения препарата Мерадок



Применение Мерадок в рекомендуемых дозах для теплокровных **безопасно**. Инъекции препарата безболезненны и не вызывают стресс у животного. Благодаря экономичной дозировке Мерадок вводится одной инъекцией, что менее травмирует животное.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мерадок назначают крупному рогатому скоту, овцам для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых нематодами желудочно-кишечного тракта, легких, подкожной клетчатки, слезных протоков, личинками подкожных и носоглоточных оводов, личинками мух, вшами, чесоточными и иксодовыми клещами.



- *Ostertagia ostertagi*
- *O. lyrata*
- *Haemonchus placei*
- *H. similis*
- *Trichostrongylus axei*
- *T. colubriformis*
- *T. longispicularis*
- *Mecistocirrus digitatus*
- *Cooperia oncophora*
- *C. pectinata*
- *C. punctata*
- *C. spatulata*
- *C. sumabada*
- *Nematodirus helvetianus*
- *N. spathiger*
- *Bunostomum phlebotomum*
- *Strongyloides papillosus*
- *Oesophagostomum radiatum*
- *Trichocephalus discolor*
- *Dictyocaulus viviparus*
- *Thelazia* spp.
- *Parafilaria bovicola*
- *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*
- *Haematopinus eurysternus*
- *Linognathus vituli*
- *Solenopotes capillatus*
- *Psoroptes bovis*, *Sarcoptes bovis*, *Chorioptes bovis*
- *Boophilus microplus*
- *Ornithodoros* spp.



- Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta
- Haemonchus contortus
- Trichostrongylus axei
- T. colubriformis
- T. vitrinus
- Cooperia curticei
- C. oncophora
- Oesophagostomum venulosum
- Nematodirus spp.
- Strongyloides papillosus
- Trichocephalus ovis
- Dictyocephalus filaria
- Psoroptes ovis, Sarcoptes ovis
- Oestrus ovis

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	Арахноэнтормозы Нематодозы	П/к в область шеи	1 мл/50 кг	Однократно
МРС		В/м		

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

В связи с выделением дорамектина с молоком запрещается применение препарата Мерадок дойным, а также стельным коровам менее чем за 60 суток до предполагаемого отела (начала лактации), дойным, а также суягным овцам менее чем за 70 суток до предполагаемого окота, если молоко планируется использовать в пищевых целях.

ОГРАНИЧЕНИЯ



70 дней

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет со дня производства, после первого вскрытия флакона - не более 90 суток.



Неозидин®

ПОРОШОК, ИНЪЕКЦИОННО

450 мг диминазен, 550 мг феназон

 ПО РЕЦЕПТУ

2,36 г

**БЫСТРОЕ И НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КРОВЕПАРАЗИТОВ
С ВЫГОДНЫМ КУРСОМ ЛЕЧЕНИЯ**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый лечебный эффект - препарат начинает действовать через 3-5 часов;
- Жаропонижающее и анальгезирующее действие;
- Выгодная стоимость курса лечения.

для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Неозидин обладает широким спектром антипротозойного действия, активен в отношении возбудителей бабезиоза, франсаиеллеза, нутталлиоза, тейлериоза и трипаносомоза, паразитирующих у животных, оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие, способствует уменьшению проницаемости сосудов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Неозидин применяют крупному рогатому скоту, овцам, лошадям с лечебной и профилактической целью при кровепаразитарных болезнях - бабезиозе (пироплазмозе), франсаиеллезе, нутталлиозе, тейлериозе, трипаносомозе.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для приготовления инъекционного 7 % раствора во флакон с порошком Неозидин 2,36 г вводят 12,5 мл воды для инъекций или физиологического раствора и получают 13 мл готового к применению препарата. Приготовленный раствор можно хранить в стерильной плотно закрытой емкости в темноте при комнатной температуре в течение суток, в холодильнике – не более 2 суток. Кипячение или нагревание раствора выше 37° С недопустимо.

Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Бабезиоз (пироплазмоз), франсаиеллез, нутталлиоз	В/м	1 мл/20 кг м. ж. (3,5 мг диминазена/1 кг м. ж.)	Однократно
Тейлериоз		1,5 мл/20 кг м. ж. (5 мг диминазена на 1 кг м. ж.)	
Трипаносомоз, вызванный <i>T. brucei</i> (болезнь Нагана)		2,2 мл/20 кг м. ж. (8 мг диминазена на 1 кг м. ж.)	

В случаях, если у больных животных после первого введения Неозидина не снижается температура и не улучшается общее состояние, через 24 часа допускается повторное введение препарата в той же дозе. Больным животным предоставляют покой и дополнительно, в зависимости от физиологического состояния, назначают симптоматические



средства (сердечные, антигистаминные, слабительные, витамины, микроэлементы).

С профилактической целью, при обнаружении в стаде одного или нескольких животных с признаками пироплазмидозов, или после перегона животных в неблагополучную по кровепаразитарным заболеваниям местность, Неозидин применяют однократно в дозе 3,5 мг диминазена на 1 кг массы животного, при необходимости инъекцию повторяют в той же дозе через 10-15 дней. Перед массовой обработкой животных каждую серию препарата Неозидин предварительно испытывают на небольшой группе животных (5-10 голов). При отсутствии осложнений в течение 3-х суток обрабатывают всё поголовье.

При введении препарата в объеме, превышающем 10 мл для крупных животных и 2,5 мл для мелких животных, в связи с возможной болевой реакцией, инъекции следует вводить в несколько мест.

Дозы препарата в зависимости от массы животного и заболевания

Масса животного, (кг)	Доза диминазена на 1 кг массы животного		
	Бабезиоз (пироплазмоз), франсаиллез, нуттаолиоз 3,5 мг	Тейлериоз 5 мг	Трипаносомоз 8 мг
	Объем вводимого 7% раствора (мл)		
10	0,5	0,8	1,1
20	1,0	1,5	2,2
50	2,5	3,5	5,7
100	5,0	7,0	11,5
150	7,5	11,0	17,0
200	10,0	14,0	23,0
250	12,5	18,0	28,5
300	15,0	21,5	34,0
350	17,5	25,0	40,0
400	20,0	29,0	46,0
500	25,0	36,0	57,0

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат нельзя применять одновременно с другими антипротозойными препаратами.

Запрещается использовать Неозидин в течение 4-х недель после вакцинации животного живой вакциной против бабезиоза и анаплазмоза.

ОГРАНИЧЕНИЯ



21 день



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона препарат хранению не подлежит.



Неозидин® М

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

57,5 мг диминазен, 57,5 мг феназон

 ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл

100 мл



БЫСТРОЕ И УВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КРОВЕПАРАЗИТОВ БЛАГОДАРЯ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ФОРМЕ РАСТВОРА ДИМИНАЗЕНА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективность 98,8% с 1 инъекции;
- Быстрый лечебный эффект через 3-5 часов;
- Запатентованная форма повышает эффективность лечения¹;
- Жаропонижающее и анальгезирующее действие;
- Готовый раствор для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Неозидин М обладает широким спектром антипротозойного действия, активен в отношении возбудителей бабезиоза (пироплазмоза), франсаиеллеза, трипаносомоза, тейлериоза и нутталлиоза, паразитирующих у животных.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Неозидин М назначают крупному рогатому скоту, овцам, лошадям с лечебной и профилактической целью при трипаносомозе, бабезиозе, франсаиеллезе, нутталлиозе, тейлериозе и смешанных инвазиях.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения	Курс лечения
КРС МРС Лошади	Бабезиоз Трипаносомоз Франсаиеллез Нутталлиоз Тейлериоз	В/м	1 мл/20 кг	Однократно	При необходимости повторить через 24 часа

Больным животным предоставляют покой и дополнительно, в зависимости от физиологического состояния, назначают симптоматические средства (сердечные, при атонии кишечника - слабительные).

При введении препарата в объеме, превышающем 10 мл, инъекции следует проводить в несколько мест.

С профилактической целью, при обнаружении в стаде животных с клиническими признаками болезни или после перегона животных в неблагополучную по кровепаразитарным заболеваниям местность, Неозидин М применяют однократно в терапевтической дозе. При необходимости обработку повторяют через 10-15 дней.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



¹ За счёт лучшего проникновения в эритроциты

Перед массовой обработкой животных Неозидин М предварительно испытывают на небольшой группе (5-10 голов) животных. При отсутствии осложнений обрабатывают все поголовье.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат нельзя применять одновременно с другими препаратами против кровепаразитов.

Запрещается использовать Неозидин М в течение 4-х недель после вакцинации животного живой вакциной против бабезиоза и анаплазмоза.

ОГРАНИЧЕНИЯ



21 сутки



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев с даты производства, после вскрытия флакона – 28 суток.



Риказол®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг рикобендазол

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ АНТИГЕЛЬМИНТНЫЙ ПРЕПАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО ПРОИЗВОДНОГО АЛЬБЕНДАЗОЛА, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ПРОЧИМ БЕНЗИМИДАЗОЛАМ

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Первый инъекционный препарат на основе активного метаболита альбендазола;
- Одновременное действие на все виды гельминтов;
- 98-100%¹ эффективность применения;
- Быстрое действие и высокая биодоступность;
- Преодоление резистентности к прочим бензимидазолам.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Риказол относится к группе антигельминтных средств. Рикобендазол, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антигельминтного действия в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод, цестод, а также половозрелых трематод, обладает овоцидным действием.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| • <i>Dictyocaulus</i> spp. | • <i>Bunostomum</i> spp. |
| • <i>Haemonchus</i> spp. | • <i>Chabertia</i> ovina |
| • <i>Ostertagia</i> spp. | • <i>Moniezia</i> spp. |
| • <i>Thelazia</i> spp. | • <i>Avitellina centripunctata</i> |
| • <i>Trichostrongylus</i> spp. | • <i>Thysaniezia giardi</i> |
| • <i>Nematodirus</i> spp. | • <i>Fasciola</i> spp. |
| • <i>Cooperia</i> spp. | • <i>Paramphistomum</i> spp. |
| • <i>Oesophagostomum</i> spp. | • <i>Dicrocoelium lanceatum</i> |

Достижение максимальной концентрации в крови



Уникальность рикобендазола заключается в том, что он уже является активным веществом, в отличие от альбендазола, для активации которого требуется целая цепочка биохимических превращений в организме животного.



- Лучший продукт Международной выставки «AgroFarm» 2016г.


¹ Показатель, полученный при применении рикобендазола в дозе 4 мг/кг массы животного при нематодирозе, диктиокаулезе, мониезиозе и стронгилятозе.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



Сравнительная антигельминтная активность Риказола и препарата на основе альбендазола



Эффективность дегельминтизации инъекционным препаратом Риказол **превосходит эффективность альбендазола** для орального применения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Риказол назначают крупному и мелкому рогатому скоту при нематодозах, цестодозах и трематодозах.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Дегельминтизацию животных проводят по показаниям и с профилактической целью – весной перед выгоном на пастбище и осенью перед постановкой на стойловое содержание.

При введении препарата в объеме, превышающем 5 мл для овец и коз, 15 мл - для крупного рогатого скота, инъекции следует проводить в несколько мест. В холодное время года лекарственный препарат перед введением необходимо подогреть до температуры 20-25°С.

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	Мониезиоз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы	В/м	1 мл/25 кг	Однократно
	Трихоцефалез		1 мл/20 кг	
	Хронический фасциолез, парамфистоматоз, дикроцелиоз		1 мл/12,5 кг	
Овцы и козы	Мониезиоз, тизаниезиоз, авителлиноз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы		1 мл/25 кг	
	Хронический фасциолез, дикроцелиоз, парамфистоматоз, трихоцефалез		1 мл/12,5 кг	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказаниями к применению лекарственного препарата является повышенная чувствительность животного к рикобендазолу. Запрещается применение лекарственного препарата при остром франсциозе, во время случного периода, истощенным и больным животным. Запрещается применение лекарственного препарата стельным коровам в первую треть, суягным овцам в первую половину беременности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



30 суток



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия – не более 30 суток.



Цифлунит®

РАСТВОР, НАРУЖНО

10 мг цифлутрин



100 мл

500 мл

ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ КОРОВ И ТЕЛЯТ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защитное действие до 6 недель;
- Эффективность не зависит от погодных условий;
- Профилактика инфекционных заболеваний КРС, переносчиками которых являются мухи и другие двукрылые;
- Возможность применения телятам массой менее 100 кг;
- Отсутствие раздражающего и токсического эффекта.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цифлунит относится к инсектицидным препаратам группы синтетических пиретроидов. Цифлутрин, входящий в состав препарата, обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием, активен в отношении двукрылых насекомых.


- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| • <i>Haematobia irritans</i> | • <i>Tabanidae</i> |
| • <i>Haematobia stimulans</i> | • <i>Hypodermatidae</i> |
| • <i>Musca autumnalis</i> | • <i>Culicidae</i> |
| • <i>Stomoxys calcitrans</i> | • <i>Simuliidae</i> |



видео о продукте
Цифлунит

Цифлунит обеспечивает надежное защитное действие в течение 4-6 недель против зоофильных мух, слепней, комаров, мошек и подкожных оводов вне зависимости от погодных условий.

Эффективность применения препарата Цифлунит против семейств насекомых¹



¹ Испытания препарата проводили летом в период максимальной численности двукрылых насекомых на КРС выпасного содержания на пастбище в Павловском районе Нижегородской области



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Цифлунит применяют для защиты крупного рогатого скота от зоофильных мух, слепней, оводов, комаров и мошек в пастбищный период.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработку крупного рогатого скота проводит ветеринарный врач, фельдшер или специально обученные люди под их руководством. На флакон навинчивают прилагаемый в упаковке дозатор. Цифлунит с помощью дозатора наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца в дозе 10 мл на животное, что соответствует примерно трем нажатиям дозатора, заполненного препаратом. Обработку животных проводят в пастбищный период один раз в 4–6 недель. Дойных коров следует обрабатывать сразу после дойки.

Животным весом менее 300 кг препарат наносят в дозе 1 мл на каждые 50 кг массы тела животного на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Цифлунит не следует наносить на влажную, поврежденную и загрязненную кожу.

Цифлунит не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия бутылки – не более 60 суток.



Цифлунит®-ON

РАСТВОР ДЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ

50 мг цифлутрин

100 мл

1 л

5 л



ПРОВЕРЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРИМЫКАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ С ДЕЙСТВИЕМ ДО 3-Х МЕСЯЦЕВ, ПРОТИВ ЧЛЕНИСТОНОГИХ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уничтожает все виды членистоногих;
- Эффективен на всех стадиях развития насекомых;
- Безопасен для металлов, пластмассы, резины и других материалов;
- На основе безопасных растворителей;
- Удобен и эффективен при обработке жилых помещений, дачных участков и территорий вблизи водоемов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Цифлутрин, входящий в состав инсектоакарицидного средства, относится к группе синтетических пиретроидов. Цифлутрин обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием, активен в отношении насекомых и клещей, в том числе зоофильных насекомых, включая *Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Stomoxys calcitrans*, слепней (Tabanidae), оводов (Hypodermatidae), комаров (Culicidae) и мошек (Simuliidae), а также тараканов, муравьев, жуков-чернотелок (хрущаков) и красного куриного клеща.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Цифлунит-ON применяют для уничтожения тараканов, жуков-чернотелок (хрущаков), муравьев, клопов, блох, мух, комаров, красных куриных клещей, крысиных клещей и других насекомых при обработке помещений и примыкающих территорий.

Средство обладает острой инсектицидной активностью и остаточным действием на насекомых в течение 1-3 месяцев.

РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНЕНИЕ В БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Перед проведением обработки желательно провести механическую очистку и мойку помещения во время санитарного перерыва.

На время обработки из помещений убирают корма, пищевую тару, а также продукцию, которая может адсорбировать инсектоакарицидное средство. В момент обработки в помещении не должны находиться посторонние люди и животные.

Для уничтожения членистоногих используют свежеприготовленный рабочий раствор Цифлунит-ON в разведениях, указанных в таблице.

Для приготовления рабочего раствора отмеряют, согласно таблице,



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



необходимое количество инсектоакарицидного средства Цифлунит-ON, вносят в необходимое количество воды и тщательно перемешивают до полной однородности при комнатной температуре.

Вид членистоногого	Разведение	Количество средства на 1 л воды	Расход рабочего раствора на обработку 1 м ²	
			поверхности, не впитывающей влагу	поверхности, впитывающей влагу
Чернотелка (хрущак), тараканы, красный куриный клещ	1:100	10 мл	50 мл	100 мл
Муравьи, сверчки, мухи (имаго, личинки)	1:200	5 мл		
Клопы, блохи, комары (имаго, личинки), клещи крысиные	1:400	2,5 мл		

Необходимый для обработки объем рабочего раствора готовят непосредственно перед применением. Срок хранения приготовленного рабочего раствора Цифлунит-ON не должен превышать 24-х часов после его приготовления.

При работе с рабочим раствором Цифлунит-ON используют распыляющую или опрыскивающую аппаратуру различных марок для нанесения на поверхности.

Норма расхода рабочего раствора может колебаться в зависимости от типа обрабатываемой поверхности: от 50 мл/м² (не впитывающая влагу поверхность) до 100 мл/м² (впитывающая влагу). Убирают нанесенное средство влажным способом - через 24 часа после нанесения, но не позднее чем за 3 часа до начала рабочего дня; из других мест – через 1-3 месяца, или после потери его эффективности. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям (при появлении насекомых).

Обработку раствором Цифлунит-ON методом аэрозольного распыления осуществляют в отсутствие птицы, при выключенной вентиляции, в виде тумана, полученного с помощью генератора тумана или другого подобного оборудования. Инсектицидное средство применяется в виде 10% водного раствора (1 часть концентрата и 9 частей воды), с нормой расхода готового раствора 10 литров на 1000 м³.

После окончания аэрозольной обработки кормушки, поилки и оборудование промывают теплой водой, помещение проветривают и просушивают.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Цифлунит-ON может вступать во взаимодействие с другими инсектоакарицидными средствами, поэтому сочетание его с другими средствами нежелательно, так как это может повлиять на эффективность.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия заводской тары – 28 суток.



Цифлунит® Флок

РАСТВОР, НАРУЖНО

1,13 мг цифлутрин



500 мл

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСЕКТИЦИД В ФОРМЕ ПУР-ОН ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ ОТ ДВУКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ, ВОЛЬФАРТИОЗА, ВЛАСОЕДА И РУНЦА С ДЛИТЕЛЬНЫМ ПЕРИОДОМ ЗАЩИТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобная весенняя обработка **во время стрижки**;
- Легкая обработка в зимний период;
- Защита до 4 недель в любое время года;
- Без ограничений по мясу и молоку.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цифлутрин, входящий в состав препарата, обладает выраженным контактным инсектицидным и репеллентным действием, активен в отношении имаго и личинок насекомых, в том числе зоофильных мух (*Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Stomoxys calcitrans*, *Wohlfahrtia magnifica*), слепней (*Tabanidae*), комаров (*Culicidae*) и мошек (*Simuliidae*), оводов (*Oestrus ovis*), рунца овечьего (*Melophagus ovinus*), власоедов (*Bovicola ovis*), вшей (*Linognathidae ovillus*, *Linognathidae pedalis*).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Цифлунит Флок применяют овцам и козам с лечебной и профилактической целью против оводов (эстро́за), рунца овечьего (мелопфаго́за), вшей (сифункулято́за), власоедов (триходекто́за), зоофильных мух (вольфарти́оза), а также в целях защиты животных от нападения двукрылых насекомых на пастбище.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат наносят наружно однократно животному на кожу спины, раздвинув шерсть, вдоль позвоночника от холки до крестца в следующих дозах:

- 5 мл на животное массой 10-20 кг;
- 7 мл на животное массой 21-30 кг;
- 10 мл на животное массой 31-60 кг.

Животным массой более 60 кг дополнительно наносят по 1 мл препарата на каждые 6 кг веса.

1 НАЖАТИЕ
ДОЗАТОРА

=

5 мл
Цифлунит
Флок



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Цифлунит Флок



- Лучший продукт Международной выставки «AgroFarm» 2016 г.




ЦИФЛУНИТ ФЛОК ОБЕСПЕЧИТ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ОТ НАСЕКОМЫХ - ПАРАЗИТОВ

Эффективность борьбы с вольфартиозом возрастает при применении инсектоакарицидных средств после стрижки

Эффективность препарата Цифлунит Флок против *W. magnifica*

Цифлунит Флок



**Цифлунит Флок обеспечивает длительный защитный период
после стрижки**

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 5 лет со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 60 суток.

НОМИЦЕФ® LC



По рецепту

**ИНТРАМАММАРНЫЙ ШПРИЦ НА ОСНОВЕ ЦЕФКИНОМА
ОТ КЛЮЧЕВОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - КАЧЕСТВО
МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ**

- Быстрое и эффективное лечение
- Короткие сроки ограничения на молоко
- Снижение риска повторных инфекций

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

	Йодопен	95
	Максинон	97
	Мастенит	99
	Мастигард	101
	Мастисан	103
	Мастомицин	104
	Миоцид	106
	Митрек	108
	Номицеф LC НОВИНКА	110
	Сенсиверин НОВИНКА	112
	Сепранол	114
	Септогель	117
	Утеротон	119
	Утеротон Форте НОВИНКА	121



Йодопен®

СУППОЗИТОРИИ, ВНУТРИМАТОЧНО

в 1 суп. 1,5 г повидон-йод (1,57 % активного йода)

по 2 суп.

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СУППОЗИТОРИИ НА ОСНОВЕ ПОВИДОН-ЙОДА ШИРОКОГО СПЕКТРА АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр антимикробного действия, присущий активному йоду;
- Отсутствует привыкание микроорганизмов;
- Обильное пенообразование обеспечивает максимальное соприкосновение действующего вещества с эндометрием;
- Не раздражает слизистую оболочку матки;
- Возможность применения в виде раствора.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Йодопен обладает антимикробным, противовоспалительным действием, улучшает пролиферативные процессы в половых органах, сокращает сроки выздоровления животных.

Действующее вещество препарата - органическое соединение йода (повидон-йод) - соединяется с белками микробной клетки, блокируя её дыхательные ферменты, что приводит к гибели.

Микробиологическая эффективность повидон-йода (содержание активного йода 0,1%)			
Вид микроорганизма	Время гибели (сек.)	Вид микроорганизма	Время гибели (сек.)
Staphylococcus aureus	15-30	Pseudomonas aeruginosa	15-30
Proteus vulgares	60-90	Diplococcus pneumoniae	60
Enterobacter spp.	60	Bacillus subtilis	30
Streptococcus faecalis	60	Clostridium septicum	30
Streptococcus pyogenes	60	Escherichia coli	30-60
Streptococcus haemolyticus	15		
Salmonella typhimurium	30		

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Йодопен применяют коровам для профилактики и лечения острого послеродового эндометрита и других воспалительных заболеваний бактериальной этиологии матки после родовспоможения при осложненных и патологических родах, оперативного отделения последа и абортов.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

Рекомендуем
применять
Йодопен
совместно с
гелем для
ветеринарных
манипуляций на
основе
природных
компонентов -
Гелерон
(стр.165).

Гелерон

Легкость скольжения

250 мл
5 л

**ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ**

Вид животного	Показания к применению	Способ введения	Дозировка	Кратность применения
Вводят сразу после отделения последа, аборта или родовспоможения				
КРС	С профилактической целью	Суппозитории вводят в полость матки рукой, в полиэтиленовой перчатке разового использования	1 суппозиторий	Однократно
	С лечебной целью			Двукратно, с интервалом 24-48 часов

В особых случаях лечение повторить.

Перед введением суппозитория Йодопен проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста.

Благодаря пенообразующей основе препарата после введения одного суппозитория образуется не менее 300 мл пены, что обеспечивает максимальное соприкосновение действующего вещества с эндометрием.

При закрытии шейки матки и невозможности введения препарата в форме суппозитория, рекомендуется использовать его в виде раствора. Для приготовления раствора рекомендуется растворить один суппозиторий в 150-200 мл предварительно подогретого до 40 °С стерильного физраствора или воды. Разрушение образующейся пены осуществляется механически или с помощью пеногасителей (этиловый спирт). Полученный раствор набрать в шприц Жане или кружку Эсмарха и вводить внутриматочно, медленно при помощи катетера для искусственного осеменения или силиконовой трубки длиной 20-25 см, диаметром 0,5 см, с полистироловой пипеткой на конце. Обработка проводится один раз в сутки, до выздоровления.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение одновременно с другими препаратами для внутриматочного введения.

Йодопен не предназначен для применения животным в период беременности.

ВНИМАНИЕ

Йодопен необходимо хранить в сухом месте, при температуре от 4°С до 25°С.

ОГРАНИЧЕНИЯ

0 суток



24 часа

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев со дня производства, после вскрытия блистера хранению не подлежит.

Максинон®

РАСТВОР, ВНУТРИМАТОЧНО

25 мг левофлоксацин, 10 мг декспантенол

 ПО РЕЦЕПТУ

1 л



НОВЫЙ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ВНУТРИМАТОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КОРОВ НА ОСНОВЕ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фторхинолон последнего поколения в ветеринарии, преодолевающий резистентность к используемым антибиотикам;
- Декспантенол обеспечивает быструю регенерацию и восстановление эндометрия;
- Короткие сроки ограничения на молоко – 2 дня.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внутриматочный раствор Максинон относится к фармакотерапевтической группе фторхинолоны в комбинациях. Входящий в состав препарата Максинон левофлоксацина гемигидрат относится к антибиотикам из группы фторхинолонов и обладает широким спектром действия на аэробные грамположительные и грамотрицательные, анаэробные и другие микроорганизмы:

- *Arcanobacterium spp.*
- *Arcanobacterium pyogenes*
- *Corynebacterium spp.*
- *Enterococcus spp.*
- *Listeria monocytogenes*
- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Acinetobacter spp.*
- *Campylobacter spp.*
- *Enterobacter spp.*
- *Escherichia coli*
- *Haemophilus spp.*
- *Klebsiella spp.*
- *Moraxella spp.*
- *Morganella morganii*
- *Pasteurella spp.*
- *Proteus spp.*
- *Proteus vulgaris*
- *Providencia spp.*
- *Pseudomonas spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Serratia spp.*
- *Bacteroides spp.*
- *Clostridium spp.*
- *Fusobacterium spp.*
- *Peptostreptococcus spp.*
- *Chlamydia spp.*
- *Chlamydia psittaci*
- *Mycoplasma spp.*
- *Rickettsia spp.*

D-пантенол - производное пантотеновой кислоты, обладает регенеративными свойствами, стимулирует эпителизацию и заживление кожных покровов и слизистых оболочек, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон, оказывает умеренно выраженное противовоспалительное действие. Не оказывает раздражающего действия на ткани.





ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Максинон применяют для лечения эндометритов и предотвращения развития акушерско-гинекологических заболеваний у коров, вызванных микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

Максинон вводится внутриматочно с помощью шприца Жанэ, в дозе 50-100 мл на животное, 2-3 раза с интервалом 24 часа до выздоровления.

Для предотвращения послеродовых акушерско-гинекологических заболеваний после родовспоможения при осложненных и патологических родах, оперативного отделения последа и абортов препарат вводят в дозе 150 мл на животное однократно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не предназначен для применения беременным самкам и молодняку, а также животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

ОГРАНИЧЕНИЯ



9 суток



48 часов

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

Мастенит®

СУСПЕНЗИЯ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

600 мг клоксациллин

 ПО РЕЦЕПТУ



3,6 г

АНТИМАСТИТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОРОВ В ПЕРИОД СУХОСТОЯ
С ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ БОЛЕЕ 7 НЕДЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Действие 7 недель – весь сухостойный период;
- Широкий спектр активности, в том числе, против штаммов, резистентных к пенициллину;
- Эффективно работает в тканях вымени.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мастенит относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы полусинтетических пенициллинов. Клоксациллин – действующее вещество препарата Мастенит – обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении грамположительных бактерий, обычно выделяемых из секрета вымени в сухостойный период, в том числе:

- **Streptococcus spp.** (включая *Streptococcus agalactiae*)
- **Staphylococcus spp.** (в том числе и штаммов, резистентных к пенициллину)
- **Corynebacterium pyogenes**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мастенит применяют однократно для лечения мастита коров перед переводом в сухостойный период, но не позднее 42 дней до предполагаемого отела.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат Мастенит вводится коровам непосредственно перед запуском. Перед введением препарата Мастенит необходимо выдоить молоко. Сосок снаружи протирают 70% раствором спирта или специальной антисептической салфеткой. Для спокойных животных снимают только верхнюю часть крышки, закрывающей канюлю шприца, а для беспокойных – снимают полностью. После этого канюлю шприца вводят в отверстие соска и, осторожно надавливая на поршень, вводят лекарственный препарат. В каждую четверть вымени вводят содержимое одного шприца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не следует применять одновременно с другими препаратами для интрацистернального введения.

Мастенит запрещается применять лактирующим коровам.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



для просмотра
видео
отсканируйте QR-код





ОГРАНИЧЕНИЯ



28 суток



5 суток (после отела)

В случае ошибочного введения препарата лактирующим коровам или если отел произошел ранее 42 дней после введения препарата, молоко можно использовать через 46 суток после введения препарата.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки хранению не подлежит.

Мастигард®

ГЕЛЬ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

1000 мг левофлоксацин, 5 мг нозигептид,
преднизолон 20 мг

 ПО РЕЦЕПТУ



10 г

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ КОМПЛЕКС НОВЫХ АНТИБИОТИКОВ И
ПРЕДНИЗОЛОНА ДЛЯ БЫСТРОГО ЛЕЧЕНИЯ ВСЕХ ФОРМ МАСТИТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новые антибиотики в составе – левофлоксацин и нозигептид;
- Эффективен против всех известных бактериальных возбудителей маститов, включая золотистый стафилококк;
- Быстрое восстановление продуктивности коровы;
- Выраженное противовоспалительное действие.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мастигард относится к фармакотерапевтической группе – фторхинолоны в комбинациях. Левофлоксацин, входящий в состав препарата Мастигард, оказывает бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы:

- *Acinetobacter* spp.
- *Actinobacillus* spp.
- *Aeromonas* spp.
- *Arcanobacterium pyogenes*
- *Bacillus* spp.
- *Bacteroides* spp.
- *Bacteroides fragilis*
- *Campylobacter* spp.
- *Clostridium* spp.
- *Clostridium perfringens*
- *Corynebacterium* spp.
- *Enterobacter* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Escherichia coli*
- *Fusobacterium* spp.
- *Haemophilus* spp.
- *Haemophilus ducreyi*
- *Haemophilus influenzae*
- *Haemophilus parainfluenzae*
- *Klebsiella* spp.
- *Leptospira* spp.
- *Listeria* spp.
- *Listeria monocytogenes*
- *Moraxella* spp.
- *Moraxella catarrhalis* β +/ β -
- *Morganella* spp.
- *Morganella morganii*
- *Mycobacterium* spp.
- *Pasteurella* spp.
- *Peptostreptococcus* spp.
- *Proteus* spp.
- *Proteus mirabilis*
- *Proteus vulgaris*
- *Providencia* spp.
- *Pseudomonas* spp.
- *Salmonella* spp.
- *Serratia* spp.
- *Staphylococcus* spp.
- *Streptococcus* spp.
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus dysgalactiae*
- *Streptococcus uberis*
- *Trueperella pyogenes*
- *Chlamydia* spp.
- *Chlamydia pneumoniae*
- *Chlamydia psittaci*
- *Mycobacterium* spp.
- *Mycoplasma* spp.
- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Rickettsia* spp.
- *Staphylococcus aureus*
- *Staphylococcus intermedius*





Нозигептид, входящий в состав препарата Мастигард, оказывает антимикробное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, включая:

- **Clostridium spp.**
- **Streptococcus spp.** (в том числе **Streptococcus agalactiae**, **Streptococcus dysgalactiae**, **Streptococcus uberis**)
- **Staphylococcus spp.** (в том числе **Staphylococcus aureus**, продуцирующий бета-лактамазу и коагулазонегативные стафилококки).

Преднизолон, входящий в состав препарата Мастигард, является синтетическим глюкокортикостероидом, оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и противоотечное действие.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мастигард применяют для лечения субклинических и клинических форм мастита у коров в период лактации, вызванных чувствительными к левофлоксацину и нозигептиду микроорганизмами.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед введением препарата Мастигард содержимое доли вымени сдаивают, молоко обеззараживают кипячением и утилизируют. Сосок снаружи протирают 70% раствором спирта или специальной антисептической салфеткой.

Мастигард вводится интрацистернально в дозе 10 г (содержимое 1 шприца) на пораженную четверть вымени. Препарат вводят 1-2-кратно с интервалом 24 часа, при необходимости введение повторить.

При введении спокойным животным снимают только верхнюю часть колпачка, закрывающую канюлю шприца, а беспокойным – колпачок снимают полностью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не предназначен для одновременного применения с другими интрацистернальными препаратами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



10 суток



4 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки – хранению не подлежит.

Мастисан

СУСПЕНЗИЯ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

28 мг стрептомицин, 14 мг бензилпенициллин,
70 мг сульфадимезин

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



АНТИМАСТИТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ФОРМЕ МАСЛЯНИСТОЙ ГОМОГЕННОЙ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность препарата благодаря синергетическому действию входящих в состав веществ;
- Широкий спектр действия;
- Доступная цена.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Мастисан обладает широким спектром антибактериального действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококки, стрептококки, протей, кишечная палочка, сальмонеллы и др.), обусловленным входящими в состав препарата действующими веществами.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Мастисан применяют для лечения мастита у лактирующих коров.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед введением препарата Мастисан молоко выдаивают из больной четверти вымени и утилизируют, сосок дезинфицируют. Содержимое флакона перед применением нагревают до 36-39°C, тщательно встряхивают до получения равномерной взвеси. Препарат набирают из флакона стерильным шприцем в количестве 5-20 мл, плотно прижимают канюлю шприца к отверстию соскового канала и вводят осторожным нажатием на поршень шприца в сосковую цистерну вымени. После введения проводят легкий массаж соска пораженной четверти вымени снизу вверх. В зависимости от тяжести воспалительного процесса препарат вводят в дозе 5-20 мл с интервалом 24 часа в течение 5-8 дней, а при гнойном и гнойно-катаральном мастите до 10 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат Мастисан не следует назначать одновременно с другими противовоспалительными препаратами для интрацистернального введения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



3 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства. После вскрытия флакона - 28 суток.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





Мастомицин®

ГЕЛЬ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

15 мг гентамицин, 20 мг клиндамицин,
50 мг лидокаин

 ПО РЕЦЕПТУ



10 мл

ПРОТИВОМАСТИТНЫЙ ГЕЛЬ С УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, УВЕЛИЧИВАЮЩИМИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальное сочетание гентамицина и клиндамицина дает синергический эффект;
- Не содержит преднизолон;
- Гелевая основа препарата обладает уникальными свойствами термочувствительности¹;
- Оказывает местное обезболивающее действие;
- Короткие сроки браковки продукции.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мастомицин обладает широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, протей, кишечной палочки, сальмонелл), являющихся основным патогенетическим звеном в возникновении мастита у коров.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мастомицин применяют для лечения различных форм мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастомицин вводят интрацистернально в дозе 10 мл (1 шприц) на каждую пораженную четверть вымени 2-6 раз (в зависимости от тяжести заболевания) с интервалом 12 часов, вплоть до полного исчезновения симптомов заболевания. Перед введением Мастомицина содержимое соска сдаивают, молоко обеззараживают кипячением и утилизируют, а сосок дезинфицируют. Наконечник шприца вводят в сосковый канал осторожным нажатием на поршень шприца и выдавливают содержимое, после чего проводят легкий массаж четверти вымени и соска в направлении снизу вверх (не проводить массаж при гнойных и гнойно-катаральных формах мастита).

При лечении тяжелых форм маститов у коров для достижения наибольшего терапевтического эффекта и сокращения сроков лечения рекомендуем применение препарата **Мастомицин** в комплексе с инъекционными антибиотиками **Амоксигард**, **Амоксициллин 150**, **Лексофлон**, **Нитокс 200**, **Цефтонит**².

¹При комнатной температуре вязкость геля близка к вязкости жидкости, что облегчает введение препарата. При температуре тела животного гель загустевает, фиксируя антибиотики и лидокаин на эпителии молочной железы, что обеспечивает сохранение концентрации действующего вещества на терапевтическом уровне до следующего введения препарата.

²В зависимости от чувствительности микрофлоры.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время лечения препаратом Мастомицин не рекомендуется применение хлорамфеникола (левомицетина) и макролидных антибиотиков (тилозин, эритромицин, спирамицин), а также одновременное внутриветеринарное введение других препаратов.

ОГРАНИЧЕНИЯ



1 сутки - МЯСО,
3 суток - ВЫМЯ



3 суток

Во время лечения и в течение 72 часов после последнего применения Мастомицина молоко сдаивают в отдельную посуду, обеззараживают кипячением и утилизируют.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства.



Миоцид®

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В СОСКОВЫЙ КАНАЛ

2,6 г висмута субнитрат



4 г

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ СОСКОВОГО КАНАЛА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПАТОГЕНОВ В ПЕРИОД СУХОСТОЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАСТИТОВ, ИДЕНТИЧНОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ КЕРАТИНОВОЙ ПРОБКЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает заболеваемость маститами;
- Обладает противомикробным и противовоспалительным действием;
- Защищает от проникновения возбудителей маститов;
- Без ограничений на молоко и мясо.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Миоцид относят к группе антисептических средств. Висмута субнитрат, действующее вещество препарата Миоцид, обладает вяжущим, адсорбирующим, противомикробным и противовоспалительным действием. Висмута субнитрат коагулирует белки, образуя на поверхности ткани защитную пленку из денатурированных белков, оказывает сосудосуживающее действие, уменьшает воспаление. После введения препарата Миоцид в сосок вымени образуется сгусток альбумината висмута, который механически закрывает канал, что предотвращает проникновение возбудителей инфекции в вымя и профилактирует возникновение мастита в сухостойный период. Миоцид не резорбируется и не оказывает отрицательного действия на ткани вымени.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Миоцид применяют для профилактики возникновения мастита у коров в сухостойный период.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Миоцид применяют коровам, однократно, после последней дойки, непосредственно перед запуском. Содержимое одного шприца вводят в каждый сосок вымени. Введение лекарственного препарата Миоцид, охлажденного ниже комнатной температуры, может быть затруднено вследствие повышения вязкости.

С целью облегчения введения препарата рекомендуется выдержать до комнатной температуры. Перед введением препарата Миоцид необходимо полностью выдоить молоко из вымени. Сосок снаружи протирают 70% раствором спирта или специальной антисептической салфеткой. Для спокойных животных снимают только верхнюю часть колпачка, закрывающего канюлю шприца, а для беспокойных – снимают полностью. После этого канюлю шприца осторожно вводят в отверстие соска,



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



для просмотра
видео
отсканируйте QR-код



сжимают сосок у основания, и, плавно надавливая на поршень шприца, вводят препарат. После введения препарата сосок вымени и вымя не массировать. Миоцид применяют здоровым коровам. В случае субклинического мастита перед применением препарата Миоцид рекомендуется использовать препарат Мастенит. После отела Миоцид удаляют из соскового канала осторожным выдавливанием пальцами от основания соска.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат Миоцид при выявлении мастита у животных перед запуском. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применять препарат в период лактации.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки хранения не подлежит.



Митрек®

СУСПЕНЗИЯ, ВНУТРИМАТОЧНО

500 мг цефепирин

 ПО РЕЦЕПТУ



19 г

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА, С МИНИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ОЖИДАНИЯ ПО МОЛОКУ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Срок ожидания по молоку 1 день;
- На основе цефалоспоринового антибиотика;
- Однократное применение;
- Шприц с катетером для удобства введения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Входящий в состав препарата цефепирин - антибиотик группы цефалоспоринов - обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении:

- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus pyogenes*
- *Pasteurella spp.*
- *Proteus mirabilis*
- *Fusobacterium spp.*
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella spp.*
- *Neisseria spp.*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Enterococcus spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Shigella spp.*
- *Haemophilus influenzae*

и других патогенных микроорганизмов, главным образом, выделяемых при подострой и хронической формах эндометрита у коров.

Бактерицидное действие цефепирин заключается в ингибировании синтеза клеточной стенки, что вызывает разрушение цитоплазматической мембраны и гибель бактериальной клетки. Антибиотик устойчив к действию фермента пенициллиназы и сохраняет свою активность в аэробных и анаэробных условиях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Митрек применяют коровам для лечения подострой и хронической форм эндометрита бактериальной этиологии, а также при скрытых формах эндометрита.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят коровам в полость матки в дозе 19 г (содержимое одного шприца). Для лечения подострой и хронической форм эндометрита препарат Митрек применяют не ранее чем через 14 суток после отела. При необходимости лечение повторяют через 7-14 суток в той же дозе.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Митрек



Для лечения скрытых форм эндометрита препарат вводят через 6-24 часа после осеменения.

Применение препарата Митрек при скрытом эндометрите позволяет излечить 93% коров после первого применения и повысить процент оплодотворяемости на 33%, в отличие от применения внутриматочного раствора, эффективность которого составляет 60%. При этом раствор необходимо применять не менее двух раз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается одновременное применение препарата Митрек и других препаратов для внутриматочного введения, содержащих антибиотики. Запрещено применять стельным коровам.

ОГРАНИЧЕНИЯ



24 часа



24 часа

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки препарат хранению не подлежит.



Номицеф® LC **НОВИНКА**

 ПО РЕЦЕПТУ

СУСПЕНЗИЯ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

75 мг цефкином



8 г

ИНТРАМАММАРНЫЙ ШПРИЦ НА ОСНОВЕ ЦЕФКИНОМА ОТ КЛЮЧЕВОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - КАЧЕСТВО МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое и эффективное лечение;
- Короткие сроки ограничения на молоко;
- Снижение риска повторных инфекций.



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефкинома сульфат - цефалоспорин IV-поколения, обладающий широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий:

- *Actinomyces pyogenes*
- *Bacillus spp.*
- *Bacteroides spp.*
- *Citrobacter spp.*
- *Clostridium spp.*
- *Corynebacterium spp.*
- *Enterobacteriaceae*
- *Enterococcus spp.*
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella spp.*
- *Pasteurella spp.*
- *Prevotella spp.*
- *Proteus spp.*
- *Pseudomonas spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Serratia spp.*
- *Staphylococcus spp.*
- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus spp.*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus dysgalactiae*
- *Streptococcus uberis*

включая штаммы, продуцирующие β -лактамазу.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Номицеф LC применяют для лечения маститов у коров в период лактации, вызванных чувствительными к цефкиному микроорганизмами в том числе: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* и *Streptococcus uberis*.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Номицеф LC вводят после доения, интрацистернально, трёхкратно с интервалом в 12 часов, по 1 шприцу-дозатору в каждую пораженную четверть вымени. Каждый шприц-дозатор предназначен для одноразового использования.

Перед введением препарата Номицеф LC содержимое доли вымени сдаивают, молоко обеззараживают кипячением и утилизируют. Сосок снаружи протирают 70% раствором спирта или специальной антисептической салфеткой. При введении спокойным животным снимают только верхнюю часть колпачка, закрывающую канюлю шприца, а беспокойным – колпачок снимают полностью. После этого канюлю шприца вводят в сосковый канал, осторожным нажатием на поршень выдавливают содержимое шприца, затем канюлю извлекают, верхушку соска пережимают пальцами и массирующими движениями снизу-вверх продвигают лекарственный препарат по каналу соска в цистерну вымени. Далее при возможности проводят легкий массаж четверти вымени в направлении снизу-вверх для лучшего распределения лекарственного препарата в цистерне вымени (не проводить массаж вымени при гнойных и гнойно-катаральных формах мастита).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность животного к цефалоспорином, а также к другим β -лактамам антибиотикам.

ОГРАНИЧЕНИЯ



48 часов



84 часа

СРОК ГОДНОСТИ

2 года с даты производства. Содержимое шприца-дозатора необходимо использовать сразу после вскрытия.



Сенсиверин®

НОВИНКА

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

40 мг денаверин гидрохлорид

 ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ С СЕЛЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА ОСНОВЕ ДЕНАВЕРИНА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РОДОВСПОМОЖЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Избирательность действия: снижение сопротивления родовых путей без ослабления родовой активности;
- Качество мировых лидеров;
- Доступность современных решений.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Денаверин гидрохлорид, входящий в состав препарата Сенсиверин, относится к селективным бета-адреноблокаторам, обладает расслабляющим действием на гладкую мускулатуру шейки матки и способствует увеличению эластичности родовых путей. Препарат блокирует отдельные рецепторы матки, тем самым способствует проявлению действия эндогенного окситоцина и нормализует сократительную способность гладкой мускулатуры матки. Денаверин гидрохлорид обладает анестезирующим и противосудорожным действием, а также легким транквилизирующим и жаропонижающим эффектом. Денаверин гидрохлорид быстро метаболизируется в печени и полностью выводится из организма в течение 3-5 часов. Терапевтический эффект денаверина гидрохлорида при подкожном, внутримышечном или интраперитонеальном применении коровам наблюдается через 10-15 минут. Релаксация мышц сохраняется до нескольких часов, а анальгезирующее действие до полутора часов. Денаверин может усиливать действие окситоцина и его аналогов в случае совместного применения. В связи с этим при необходимости совместного применения дозы препаратов должны подбираться индивидуально.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Сенсиверин применяется крупному рогатому скоту (коровам и первотёлкам) для регуляции родовой деятельности и расслабления гладкой мускулатуры шейки матки при:

- родовспоможении (регулирует сокращения матки во время родов);
- патологическом положении плода (неправильные предлежания или членорасположения) с целью его коррекции;
- аномалиях развития плода (крупноплодность, гидроцефалии и др.);
- фетотомии для ограничения риска травмирования родовых путей.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



Действие препарата Сенсиверин начинается через 5-10 минут после введения и полностью проявляется в последующие 10-15 минут.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Нетели: молочная порода	Внутримышечно или подкожно	5,0 мл/животное (200 мг денаверина гидрохлорида на животное)	Однократно
мясная порода		10,0 мл/животное (400 мг денаверина гидрохлорида на животное)	
Коровы		10,0 мл/животное (400 мг денаверина гидрохлорида на животное)	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и симптоматическую терапию.

Запрещается применять в одном шприце совместно с другими препаратами.

Запрещено одновременное применение препарата с другими спазмолитиками.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 дней



0 дней

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.



Сепранол®

СУППОЗИТОРИИ, ВНУТРИМАТОЧНО

60 мг хлоргексидин, 343 мг пропранолол

по 2 суп.

ПО РЕЦЕПТУ



БЕЗОПАСНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, СТИМУЛИРУЮЩИЙ АКТИВНОСТЬ МАТКИ, ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТОВ КОРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без антибиотиков и гормонов;
- Стимулирует отделение последа;
- Эффективен против большинства бактерий, а также грибов Candida;
- Предотвращает послеродовые эндометриты¹;
- Воздействует на всю полость матки благодаря пенообразующей форме.



для перехода на страницу продукта отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Хлоргексидина гидрохлорид, входящий в состав препарата Сепранол, обладает широким антибактериальным спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших и грибов:

- **E. Coli**
- **Klebsiella**
- **Salmonella**
- **Snigella и Proteus**
- **Staphylococcus**
- **Streptococcus**
- **Micrococcus**
- **Bacillus**
- **Corynebacterium pyogenes**
- **Campylobacter fetus**
- **Enterobacter**
- **Trichomanas vaginalis**
- **Candida albicans**

Рекомендуем применять **Сепранол** совместно с гелем для ветеринарных манипуляций на основе природных компонентов - **Гелерон** (стр.165).

Гелерон

Сепранол обладает **100%** эффективностью при профилактике Легкость скольжения послеродовых эндометритов².



¹ За счет широкого антибактериального и антимикотического спектра действия и усиления сокращений матки при профилактических обработках.

² Профилактику возникновения послеродовых эндометритов изучали на коровах черно-пестрой «Венгерской» породы в возрасте 3-5 лет, средней упитанности и массой тела 450 кг на базе хозяйства Марковского района Саратовской области.



Препарат Сепранол, образуя обильную пену в полости матки, активно воздействует на слизистую оболочку, заполняя всю область поражённого органа, в отличие от растворов.




РАСТВОР



ПЕНА

Применение препарата Сепранол совместно с антибиотиком при минимальном сроке курса лечения позволяет добиться выздоровления животных в 93% случаев³.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Сепранол применяют коровам для стимуляции отделения последа, профилактики и лечения острого послеродового эндометрита, а также лечения эндометрита, вызванного микроорганизмами, чувствительными к хлоргексидина гидрохлориду.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Дозировка	Длительность курса
КРС	Для отделения последа	2 суппозитория внутриматочно	Однократно
	Для профилактики острых эндометритов		Однократно через 2-4 часа после отделения последа
	Для терапии острых послеродовых эндометритов		Двукратно с интервалом 24 часа
	Для терапии хронических эндометритов		Трехкратно с интервалом 24 часа

³ Сафарова М.И., Панков И.Ю., Панфилова М.Н., Сидоркин В.А. Препарат Сепранол для лечения коров при гнойном эндометрите, осложненном микозами // Ветеринария. 2013. №11. С.33-37



При закрытии шейки матки и невозможности введения суппозитория рекомендуется использовать свежеприготовленный раствор препарата.

Для раствора: 2 суппозитория смешать с 150-200 мл стерильной воды или физраствора, предварительно подогретых до 40° С.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

Запрещается применять одновременно с другими средствами для внутриматочного введения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



48 часов



48 часов

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев со дня производства.

Септогель®

ГЕЛЬ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

65 мг повидон-йод



10 мл

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРОТИВОМАСТИТНЫЙ ГЕЛЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЛОКА И МЯСА, НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЙОДА¹

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без ограничений по использованию молока и мяса;
- Возможно сочетать с антибиотиками, не имеющими ограничений по использованию молока;
- Не содержит гормонов;
- Не вызывает резистентность к микроорганизмам².



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Повидон-йод, входящий в состав препарата Септогель, обладает анти-септическим, дезинфицирующим, бактерицидным, противогрибковым, противопротозойным и противовирусным действием.

ЛЕЧЕНИЕ РАЗНЫХ ФОРМ МАСТИТОВ

Препарат Септогель вводят интрацистернально в дозе 10 мл на четверть вымени:

- при субклиническом и катаральном маститах - 1-3 раза с интервалом 12 часов;
- при фибринозном и гнойном маститах - до клинического выздоровления, с интервалом 12 часов (но не более 10 введений).

При тяжелых формах клинических маститов с целью усиления терапевтического эффекта рекомендуется применять препарат Септогель в составе системной антибиотикотерапии.

Перед введением препарата Септогель необходимо освободить пораженную четверть вымени от содержимого, сосок продезинфицировать. Наконечник ввести в отверстие соскового канала и осторожным нажатием на поршень шприца выдавить содержимое, после чего провести легкий массаж четверти и соска в направлении снизу вверх (не проводить массаж при гнойных и гнойно-катаральных формах мастита).

¹ повидон-йод

² повидон-йод является антисептиком и не вызывает бактериальную резистентность





ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не рекомендуется одновременное применение препарата Септогель с другими противомаститными препаратами, вводимыми интрацистернально. Применение препарата Септогель разрешается не ранее чем через сутки после последнего интрацистернального введения ранее применявшихся препаратов. Не исключается применение других лекарственных препаратов орального и парентерального способов введения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



Молоко можно использовать в пищевых целях только после полного исчезновения клинических признаков мастита, подтвержденного соответствующими тестами. Во время лечения молоко из пораженных долей сдаивают в отдельную посуду, обеззараживают кипячением и утилизируют. Молоко, полученное из остальных долей, может быть использовано после кипячения в корм животным.



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 60 суток.

Утеротон®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

5 мг пропранолол

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стимулирует мягкие, продолжительные сокращения миометрия матки до 6-8 часов (в отличие от традиционной терапии окситоцином);
- Воздействует на β -адренорецепторы - не блокирует работу эндокринной системы организма в отличие от гормонотерапии;
- Повышает оплодотворяемость после первого осеменения на 20,4% за счет стимуляции миометрия матки;
- Однократное применение Утеротон снижает заболеваемость коров субинволюцией матки приблизительно в 2 раза по сравнению с применением окситоцина;
- Обладает выраженным антистрессовым действием.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Утеротон оказывает блокирующее действие на бета-адренорецепторы миометрия, что способствует проявлению активности эндогенного окситоцина, вследствие чего усиливаются сокращения гладкой мускулатуры матки и молочной железы. Является антагонистом катехоламинов, обладает выраженным антистрессовым действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Утеротон применяют для стимуляции родов при атонии, гипотонии матки, профилактики задержания последа, субинволюции матки, для повышения оплодотворяемости, извлечения эмбрионов у коров-доноров, в составе комплексной терапии для лечения послеродового эндометрита у коров.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Утеротон вводят внутримышечно или внутривенно.

Показания к применению/Кратность применения	Доза на одно животное, мл
	Корова
Стимуляция родовой деятельности и профилактика послеродовых осложнений, однократно в день родов	10
Задержание последа, трехкратно с интервалом 12 часов	10
Лечение субинволюции матки и послеродовых эндометритов, трёхкратно с интервалом 24 часа (в комбинации с другими препаратами)	10
При искусственном осеменении и случке для повышения оплодотворяемости, за 20-30 минут до осеменения	5
При извлечении эмбрионов коровам-донорам за 10-15 мин до вымывания	5

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Утеротон противопоказан в период беременности и молодняку животных.

Препарат нельзя применять одновременно с адреномиметиками, пропранолол удлиняет действие недеполяризующих миорелаксантов. Седативные и снотворные препараты при одновременном применении с пропранололом усиливают угнетающее действие на ЦНС.

При внутривенном или внутримышечном введении йодсодержащих препаратов на фоне приема пропранолола повышается риск развития анафилактических реакций.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 14 суток.

Утеротон® Форте

НОВИНКА

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

50 мг пропранолол, 30 МЕ окситоцин

ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает оптимальную продолжительность действия за счет синергетического эффекта;
- Эффективен для профилактики заболеваний в послеотельный период;
- Удобство однократного введения.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Пропранолол оказывает блокирующее действие на бета-адренорецепторы миометрии, что способствует проявлению активности эндогенного окситоцина, вследствие чего усиливаются сокращения гладкой мускулатуры матки и молочной железы. Является антагонистом катехоламинов, обладает выраженным антистрессовым действием.

Окситоцин - синтетический полипептидный аналог гормона задней доли гипофиза. Оказывает стимулирующее действие на гладкую мускулатуру матки, особенно в конце беременности, а также в течение родовой деятельности за счет увеличения проницаемости клеточных мембран для ионов кальция и увеличения его внутриклеточной концентрации. Под влиянием окситоцина снижается потенциал покоя мембраны и повышается ее возбудимость. Вызывает схватки, усиливает сократительную способность матки.

Окситоцин стимулирует секрецию молока, усиливая выработку пролактина передней долей гипофиза. Сокращает миоэпителиальные клетки вокруг альвеол молочных желез, стимулирует поступление молока в крупные протоки или синусы, способствуя усилению отделения молока, в связи с чем лактирующим животным Утеротон Форте рекомендуется применять за 5-15 минут до дойки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Утеротон Форте применяют коровам для:

- стимуляции родовой деятельности (при атонии, гипотонии матки);
- профилактики задержания последа, эндометрита, субинволюции матки;
- лечения послеродового эндометрита у коров в составе комплексной терапии.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Утеротон Форте вводят внутримышечно.

Показания к применению/Кратность применения	Доза на одно животное, мл
Стимуляция родовой деятельности (при атонии, гипотонии матки) Профилактика послеродовых осложнений (в том числе для профилактики задержания последа), однократно	3
Лечения субинволюции матки, однократно	5
Лечение послеродовых эндометритов, однократно	7-10

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Утеротон Форте противопоказан к применению в период беременности и при патологическом расположении плода, а также в случае индивидуальной гиперчувствительности.

Не рекомендуется одновременное применение препарата с: адреномиметиками; недеполяризующими миорелаксантами; седативными и снотворными лекарственными средствами из-за возможного усиления их, в том числе угнетающего действия на ЦНС; йодсодержащими препаратами при внутривенном и внутримышечном их введении в связи с повышением риска развития анафилактических реакций.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

	<table><tr><td>Регостенон</td><td>125</td></tr><tr><td>Ферголин</td><td>128</td></tr></table>	Регостенон	125	Ферголин	128
Регостенон	125				
Ферголин	128				



Регостенол

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

0,263 мг D-клопростенол

 ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ГОРМОН ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ОХОТЫ И ТЕРАПИИ БОЛЕЗНЕЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОРОВ, СОДЕРЖАЩИЙ ТОЛЬКО АКТИВНЫЙ D-КЛОПРОСТЕНОЛ (ПГФ2α)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Качество мировых лидеров;
- Высокая активность действующего вещества;
- Экономичное применение;
- Без ограничений на молоко.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакологическая группа - простагландины, тромбоксаны, лейкотриены и их аналоги в комбинациях. D-клопростенол, входящий в состав лекарственного препарата, синтетический аналог простагландина F2α (ПГФ2α). Его применение в лютеиновой фазе полового цикла вызывает регрессию желтого тела и создает условия для начала физиологических процессов, связанных со снижением уровня прогестерона, снятием блокады с гипоталамо-гипофизарной системы и повышением ФСГ и ЛГ в крови животных, что способствует росту фолликулов в яичниках и, как следствие этого, увеличению уровня эстрогенов в крови, появлению половой охоты с последующей овуляцией зрелых фолликулов. D-клопростенол вызывает сокращение гладкой мускулатуры (матки, желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, сосудов).

В организме животных D-клопростенол быстро метаболизируется и выводится в основном с мочой в течение 24 часов.

Эффективность препарата Регостенол при индукции половой охоты*



- Эффективность выше на 17% и сопоставима с дозировкой в 2 раза меньше




для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код






Эффективность препарата Регостенол при синхронизации полового цикла*



Эффективность препарата Регостенол при лечении лютеиновых кист*



Эффективность препарата Регостенол при лечении персистентного жёлтого тела*



Эффективность препарата Регостенол при лечении эндометрита*



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Регостенол применяют коровам и телкам для нормализации воспроизводительной функции, синхронизации полового цикла, индукции половой охоты, лечения гинекологических заболеваний, в том числе лечения функциональных расстройств яичников (лютеиновая киста, персистентное желтое тело), лечения фолликулярных кист (в сочетании с хорионическим гонадотропином согласно инструкции по применению), профилактики и лечения послеродовых заболеваний матки, прерывания беременности при патологии плода.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Регостенол вводят глубоко внутримышечно в дозе 1-2 мл на животное, однократно, с соблюдением правил асептики. Выбор дозы в каждом конкретном случае должен определять ветеринарный специалист на основании анамнеза животных в зависимости от сложности патологического процесса и/или от срока наступления клинического эффекта после введения препарата.

* «Оценка терапевтической эффективности лекарственного препарата для ветеринарного применения Регостенол при применении крупному рогатому скоту», испытания проведены в хозяйствах Ленинградской и Волгоградской области, общая численность поголовья 8500 голов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Индукция половой охоты и синхронизация полового цикла	Регостенол вводят коровам и телкам в любую фазу полового цикла с последующим осеменением при появлении признаков половой охоты. Животным, не пришедшим в охоту на 11-е сутки после первого введения, вводят препарат повторно в той же дозе Если осеменение проводят без выявления охоты, то животных осеменяют через 72 ч и 96 ч после второй инъекции
Лечение функциональных расстройств яичников (лютеиновая киста, персистентное желтое тело)	Регостенол вводят коровам в указанной дозе после установления диагноза с последующим осеменением при появлении признаков половой охоты
Лечение фолликулярных кист	После установления диагноза коровам вводят хорионический гонадотропин, а через 11 суток Регостенол вводят в указанной дозе
Профилактика и лечение послеродовых заболеваний матки (задержание последа, эндометрит, пиометра)	Регостенол вводят коровам в указанной дозе в комплексе со средствами этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии При хронических эндометритах возможно повторное введение препарата Регостенол в той же дозе через 10-14 суток
Стимуляция отела и профилактика задержания последа	Регостенол вводят коровам в указанной дозе в день отёла при слабой родовой деятельности, за исключением случаев большого размера и неправильного расположения плода
Прерывание беременности при патологии плода	Регостенол вводят коровам в указанной дозе с 1 недели до 5-го месяца стельности; аборт происходит на 2-7 сутки после инъекции

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению препарата Регостенол является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, а также период стельности, кроме случаев прерывания беременности при патологии плода или стимуляции отёла. Запрещается применять животным с заболеваниями респираторного или желудочно-кишечного трактов, сопровождающихся спастическим компонентом.

Разрешается применение препарата в период лактации.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



48 часов

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.



Ферголин®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

0,1 мг гонадорелин

 ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ГОРМОН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА И НОРМАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ, СОДЕРЖАЩИЙ АКТИВНЫЙ ГОНАДОРЕЛИН (ГнРГ)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Качество мировых лидеров;
- Высокая эффективность;
- Экономичное применение;
- Без ограничений на продукцию животноводства.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ферголин относят к группе гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и их антагонисты.

Гонадорелин (ГнРГ), входящий в состав лекарственного препарата, является синтетическим аналогом природного гормона гипоталамуса, который стимулирует высвобождение и секрецию из гипофиза гонадотропинов: фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов.

Фармакологические свойства препарата Ферголин связаны с совместным действием этих гормонов: ФСГ стимулирует образование и рост фолликулов, синтез и секрецию эстрогенов, а ЛГ является гормоном, ответственным за созревание фолликула, последующую овуляцию и контроль функции желтого тела. Внутримышечное введение препарата в рекомендованной дозе вызывает быстрое повышение уровней ЛГ и ФСГ в плазме крови, что способствует улучшению качества фолликулогенеза у самок животных. Из места введения гонадорелин быстро всасывается, период полувыведения из плазмы крови составляет около 20 минут. Гонадорелин метаболизируется до неактивных пептидов и аминокислот.


Гонадорелин выводится из организма с мочой и выдыхаемым воздухом.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



Эффективность препарата Ферголин при стимуляции и синхронизации полового цикла*



Эффективность препарата Ферголин при лечении фолликулярных кист*



Эффективность препарата Ферголин при индукции овуляции*

В дозе 2,5 мл на голову



В дозе 5 мл на голову



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ферголин применяют крупному рогатому скоту с целью стимуляции половой охоты, синхронизации полового цикла, индукции овуляции, лечения гипофункции яичников и фолликулярных кист, нормализации полового цикла у коров.

* «Оценка терапевтической эффективности лекарственного препарата для ветеринарного применения Ферголин при применении крупному рогатому скоту», испытания проведены в хозяйствах Ленинградской и Волгоградской области, общая численность поголовья 8500 голов.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ферголин вводят глубоко внутримышечно с соблюдением правил асептики. Доза зависит от вида животного и показания к применению:

ПОКАЗАНИЯ	ДОЗИРОВКА	КУРС ПРИМЕНЕНИЯ
Лечение фолликулярных кист и гипофункции яичников	5 мл	Однократно
Индукция овуляции перед осеменением	2,5 мл	Однократно
Стимуляция половой охоты и синхронизация полового цикла	1-2,5 мл	Однократно
Нормализация полового цикла (в послеродовой период)	1-2,5 мл	Однократно

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Запрещается применять препарат коровам на поздних сроках беременности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 часов

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

	Бутофан	133
	Диастатин	135
	Е-селен	137
	Е-селен OR	139
	Кабуфол НОВИНКА	141
	Комплекс витаминов	143
	А, D ₃ , Е в масле	
	Нитамин	145
	Стролитин	147
	Тетравит	149
	Тетрагидровит	151
	Ферран	153

Бутофан®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг бутафосфан, 0,05 мг В₁₂ (цианокобаламин)

100 мл



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СТИМУЛИРУЮЩИЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращает реабилитационный период;
- Повышает жизнеспособность;
- Улучшает производственные показатели поголовья;
- Повышает сохранность молодняка и взрослого стада;
- Профилактирует бесплодие и послеродовые осложнения;
- Повышает репродуктивность.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Бутофан нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее действие на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию молодняка животных.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Бутофан назначают крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства:

- в целях активизации родовой деятельности и профилактики послеродовых осложнений (тетания матки, родильный парез);
- для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии и неблагоприятным факторам внешней среды;
- для нормализации функций печени, белкового, углеводного и жирового обмена и регенеративных процессов;
- как дополнительное средство при лечении заболеваний, обусловленных недостатком в организме кальция и магния;
- при тяжёлых физических нагрузках и повышенной физической активности у спортивных лошадей (за 2-3 дня до соревнований).



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Доза (мл на животное)	Кратность и курс применения
Взрослые лошади и КРС	Внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно)	10,0-25,0	Один раз в сутки в течение 4-5 дней
Жеребята, телята		5,0-12,0	
Взрослые овцы и козы		2,5-8,0	
Ягнята, козлята		1,5-2,5	

При хроническом течении болезни назначают $\frac{1}{2}$ дозы препарата Бутофан, указанной в таблице. Повторный курс лечения при необходимости проводят с интервалом 5-14 дней.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет со дня производства, после вскрытия флакона - 28 суток.

Диастатин®

СУСПЕНЗИЯ, ПЕРОРАЛЬНО

80-119 мг хлорид натрия, 59-88 мг хлорид калия,
47-70 мг диоксид кремния, 3,4-5 мг танин,
28-42 мг молочная кислота, 51-76 мг лимонная кислота,
34-51 мг натрий лимоннокислый



500 мл

**КОМПЛЕКСНЫЙ РЕГИДРАТАНТ ДЛЯ БЫСТРОЙ НОРМАЛИЗАЦИИ
ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ ДИАРЕЕ ТЕЛЯТ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нормализует pH в кишечнике и баланс электролитов в организме;
- Содержит танины, обеспечивающие вяжущий и уплотняющий эффект;
- Содержит энтеросорбент, нейтрализующий токсины;
- Без антибиотиков в составе.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кормовая добавка Диастатин используется для нормализации процессов пищеварения при функциональных нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, легкой и средней степени дегидратации у телят молозивного и молочного периодов.

Входящий в состав кормовой добавки неорганический неселективный полифункциональный энтеросорбент на основе высокодисперсного кремнезема обладает сорбционными и детоксикационными свойствами. Танины, входящие в состав кормовой добавки, обладают вяжущими и дубильными свойствами и способствуют лучшему перевариванию и всасыванию питательных веществ, улучшению состояния слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных животных. Макроэлементы поддерживают осмотическое давление в клетках тканей, регулируют водно-электролитный баланс, предупреждая обезвоживание организма, создают оптимальную буферную среду в организме животного с первых дней жизни.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Диастатин используют для нормализации процессов пищеварения при устранении функциональных нарушений работы желудочно-кишечного тракта, легкой и средней степени дегидратации у телят молозивного и молочного периодов, вызванных нарушениями технологии содержания и кормления животных, в том числе: сменой рациона, перегруппировкой и скученным содержанием, нахождением в одном помещении разновозрастных животных.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Диастатин применяют перорально индивидуально с помощью дозатора или в смеси с водой (молозивом, молоком) в следующих дозах:

Вид животного	Показания	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Телята	При легкой степени дегидратации	Перорально	10 мл/30–40 кг м.т.ж. 2 раза в сутки	1-3 дня
	При средней степени дегидратации			3-5 дней

При необходимости Диастатин можно задавать в указанных количествах повторно.

Перед применением Диастатин необходимо тщательно взболтать.

Дозатор после использования промыть и просушить.

1 НАЖАТИЕ ДОЗАТОРА

БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА
(удобно при применении КРС) = 5 мл
Диастатин



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Диастатин совместим с другими кормовыми добавками. В случаях содержания в корме лекарственных препаратов для ветеринарного применения, при использовании Диастатин, возможно снижение эффективности этих лекарственных препаратов в связи с наличием у кормовой добавки адсорбционных свойств.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.

Е-селен®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

0,5 мг селен (в форме селенита натрия),
50 мг витамин Е

50 мл

100 мл



ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ В ВИДЕ КОМПЛЕКСА ВИТАМИНА Е И СЕЛЕНА В ИНЪЕКЦИОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА Е И СЕЛЕНА В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выраженное антиоксидантное действие;
- Увеличение привесов и выхода молодняка;
- Иммуностимулирующее, антистрессовое и антитоксическое действие;
- Высокая эффективность при низких дозировках;
- Введение 1 раз в 2-4 месяца;
- Гепатопротекторное действие.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Е-селен восполняет недостаточность витамина Е и селена в организме животных. Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃, оказывает влияние на состояние иммунитета, общую сопротивляемость организма.

Биологическая роль селена связана с его антиоксидантными свойствами. Он способствует выведению токсических веществ из организма, повышению иммунитета животных.

Введение препарата в организм приводит к быстрому возрастанию уровня витамина Е и селена в организме животных, нормализации обменных процессов.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Е-селен применяют крупному рогатому скоту, мелкому рогатому скоту, лошадям для профилактики и терапии заболеваний, развивающихся на фоне недостаточности витамина Е и селена при:

- нарушениях репродуктивной функции;
- нарушениях развития плода;
- беломышечной болезни, травматическом миозите и кардиопатии;
- задержке роста и недостаточных привесах;
- инфекционных и инвазионных заболеваниях;
- профилактических прививках и дегельминтизациях;
- отравлении нитратами, тяжелыми металлами и микотоксинами;
- стрессах и стрессовых ситуациях;
- токсической дистрофии печени.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят животным внутримышечно или подкожно (лошадям только внутримышечно) в дозах:

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения	
			с профилактической целью	с лечебной целью
Взрослые животные	Внутримышечно или подкожно	1 мл/50 кг м. ж.	1 раз в 2-4 месяца	2-3 раза с интервалом 7-10 дней
Молодняк с/х животных		0,2 мл/10 кг м. т.		

Для удобства введения малых объемов препарата его можно разбавить стерильной водой или физраствором и тщательно перемешать.

Лечебная доза может быть увеличена в 1,5 раза, а в регионах, дефицитных по содержанию селена, – до 5 раз.

Доза одному животному не должна превышать: для лошадей – 20 мл; коров – 15 мл; овец, коз – 5 мл.

Схема применения препарата Е-селен для профилактики беломышечной болезни в геодефицитных по содержанию селена зонах¹

Животные	Способ применения	Доза, мл на 10 кг массы	Интервал, дней	Количество инъекций
Телята, ягнята до 3-х месяцев	Внутримышечно или подкожно	0,5	14	6
Молодняк старше 3-х месяцев		0,2	30	1 (ежемесячно)
Телята, ягнята в группах с заболевшими животными		1,0	7	3
Коровы за 60 дней до отела		15 мл на животное	10-14	3-4
Овцематки за 30 дней до ягнения		0,5	10	2

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Совместное применение с витамином С снижает биодоступность Е-селена. Недопустимо совместное применение с препаратами мышьяка – химический антагонизм. Е-селен разрушается при взаимодействии с тяжелыми металлами (ртуть, медь, свинец, олово).

ОГРАНИЧЕНИЯ



14 суток - МРС,
30 суток - КРС



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 14 суток.

¹ Применение препарата Е-селен по данной схеме допустимо только в хозяйствах, в которых недостаток селена в организме животных подтвержден клиническими и биохимическими исследованиями.

Е-селен® OR

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

0,5 мг селен (в форме селенита натрия),
50 мг витамин Е

1 л

5 л



ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ В ФОРМЕ ПЕРОРАЛЬНОГО РАСТВОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА Е И СЕЛЕНА В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выраженное антиоксидантное действие;
- Увеличение привесов и выхода молодняка;
- Иммуностимулирующее, антистрессовое и антитоксическое действие;
- Высокая эффективность при низких дозировках;
- Гепатопротекторное действие.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃, оказывает влияние на состояние иммунитета, общую сопротивляемость организма.

Биологическая роль селена связана с его антиоксидантными свойствами. Он способствует выведению токсических веществ из организма, повышению иммунитета животных.

Введение препарата в организм приводит к быстрому возрастанию уровня витамина Е и селена в организме животных, нормализации обменных процессов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Е-селен OR применяют для профилактики и лечения заболеваний, вызванных недостатком витамина Е и селена, у сельскохозяйственных животных.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС МРС Лошади	С профилактической целью	в смеси с водой или кормом	1 мл/50 кг м.т. - взрослые жив. 0,5 мл/10 кг - молодняк	1 раз в 2-3 недели
	С лечебной целью			2-3 раза с интервалом 7-10 дней

При необходимости лечебная доза может быть увеличена в 1,5 раза, а в регионах, дефицитных по содержанию селена - до 5 раз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению служит индивидуальная повышенная чувствительность животных к селену либо избыточное содержание селена в кормах и организме (щелочная болезнь).

Совместное применение с витамином С снижает биодоступность Е-селен ОР. Недопустимо совместное применение с препаратами мышьяка – химический антагонизм.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - 7 суток.

Кабуфол®

НОВИНКА

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

328 мг кальция глюконат, 81 мг кальция глицерофосфат,
42 мг магния хлорид, 8 мг бутафосфан

250 мл

100 мл



КОМПЛЕКС КАЛЬЦИЯ, МАГНИЯ И ФОСФОРА, УСИЛЕННЫЙ БУТАФОСФАНОМ, С МОЩНЫМ СИНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ КОМПОНЕНТОВ, ДЛЯ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРОВ ПОСЛЕ ОТЕЛА, ЛЕЧЕНИЯ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У МОЛОДНЯКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Восстанавливает нервно-мышечную проводимость (в том числе в матке) и снимает спазм;
- Повышает неспецифическую резистентность организма к неблагоприятным факторам;
- Первая помощь при лечении острых состояний, вызванных стрессовыми факторами;
- Бутафосфан улучшает обмен кальция, магния и фосфора в организме.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комплексный состав препарата позволяет нормализовать обменные и ассимиляционные процессы, восстановить и сбалансировать соотношение кальция, фосфора и магния в организме. Действующие вещества Кабуфол находятся в соотношении, близком к физиологическому, хорошо и быстро всасываются при парентеральном введении.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Кабуфол применяют крупному рогатому скоту для лечения и профилактики нарушений обмена веществ, связанных с недостатком кальция, фосфора и магния, в том числе: при рахите, остеодистрофии, остеомалации, тетаниях, парезах и других заболеваниях обмена веществ, связанных с недостатком микро- и макроэлементов в организме, а также как дополнительное средство в составе комплексной терапии при токсикозах и аллергиях.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс применения
КРС	Подкожно, внутримышечно или внутривенно	2-5 мл/10 кг м.т.ж.	Однократно. При необходимости – повторно в тех же дозах через 24 часа

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению препарата Кабуфол является гиперкальциемия, ацидоз, тяжелое нарушение функции почек, мерцательная аритмия предсердий, повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

Комплекс витаминов А, D₃, Е в масле

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО, ПЕРОРАЛЬНО

30 000 МЕ витамин А, 40 000 МЕ витамин D₃, 20 мг витамин Е

100 мл



ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГИПОВИТАМИНОЗОВ У ЖИВОТНЫХ, ПОВЫШАЮЩИЙ ВЫНОСЛИВОСТЬ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нормализует обмен веществ и повышает устойчивость к стрессам;
- Обладает иммуностимулирующим действием.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комплекс витаминов А, D₃, Е в масле восполняет недостаток витаминов в организме животных.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Комплекс витаминов А, D₃, Е в масле применяется:

- для профилактики и лечения гиповитаминозов;
 - для повышения выносливости при стрессах;
 - при транспортировке животных;
 - при смене рациона;
 - во время беременности (только во второй половине);
 - в период лактации,
 - при нарушениях воспроизводительной функции;
 - при задержке роста и недостаточном привесе;
 - при инфекционных и инвазионных заболеваниях (как вспомогательное средство);
- при ветеринарных мероприятиях:
- профилактических прививках и дегельминтизации;
 - после оперативных вмешательств или травм.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят животным внутримышечно, подкожно или перорально в следующих дозах (мл на животное в сутки):

Вид животного	Доза, мл/гол.	Вид животного	Доза, мл/гол.
Крупный рогатый скот	5-6	Овцы, козы	1-2
Лошади	3-5	Ягнята	1
Телята, жеребята	2-3		

С профилактической целью препарат вводят животным 1 раз в 2-3 недели, с лечебной целью – один раз в 7-10 дней.

Сухостойным коровам препарат вводят за 1-1,5 месяца до отела.

При пероральном введении препарат дают животным в смеси с кормом в течение трех недель.

Одновременно с назначением препарата необходимо сбалансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не применять одновременно с кортикостероидами, сердечными гликозидами и тетрациклинами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - 28 суток.

Нитамин

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО, ПЕРОРАЛЬНО

50 000 МЕ витамин А, 5 000 МЕ витамин D₃,
50 мг витамин Е, 100 мг витамин С

50 мл

100 мл



ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ В УНИКАЛЬНОЙ ВОДНО-ДИСПЕРСНОЙ ФОРМЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ОРГАНИЗМ ВИТАМИНАМИ НА 2 МЕСЯЦА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстро восполняет недостаток витаминов;
- Снижает последствия стресса;
- Сбалансированная рецептура;
- Высокая биодоступность;
- Не инкапсулируется в месте инъекции.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нитамин восполняет недостаток витаминов в организме животных. Витамин А регулирует строение, функции и регенерацию эпителиальных тканей и тем самым повышает сопротивляемость против инфекции. Повышенные дозы препятствуют снижению веса и повышают обмен веществ. Витамин D₃ регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в желудочно-кишечном тракте, обладает противорахитным действием. Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃. Витамин С является важным фактором нормального роста и повышает защитные функции организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нитамин применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов, нормализации обмена веществ:

- во время беременности (только во второй половине) и в период лактации;
- при нарушениях воспроизводительной функции;
- при задержке роста и недостаточном привесе;
- при инфекционных и инвазионных заболеваниях;
- при проведении профилактической вакцинации и дегельминтизации;
- при оперативных вмешательствах или ранениях;
- при стрессовых состояниях;
- при замене кормов на откорме;
- при перемещении животных.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемые дозы лекарственного препарата с учетом вида животного, возраста и метода введения:

Вид и возраст животного	Метод введения		Курс и кратность применения
	Внутримышечно или подкожно, мл на 10 кг живой массы	Орально, мл на 10 кг живой массы	
КРС, лошади	0,2-0,25	0,3-0,5	Один раз в 4-8 недель
Телята, жеребята	0,2-0,5	0,5-0,6	
Овцы, козы	0,5-0,8	0,75-1,25	
Ягнята	1,5-2,0	2,0-3,0	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Гипервитаминоз и сверхчувствительность к составным частям лекарственного средства.

Препарат нельзя применять одновременно с кортикостероидными гормонами - способствуют выведению витамина D из организма, а также нарушают всасывание и обмен кальция. Одновременное применение препарата с сердечными гликозидами может усиливать их токсическое действие (повышается риск проявления нарушений ритма сердца). Одновременное применение с тетрациклинами увеличивает риск развития внутричерепной гипертензии.

С осторожностью применяют при одновременном назначении НПВС.

Необходимо избегать контакта растворов препарата с дезинфектантами и окислителями.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 14 суток.

Стролитин®

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

50 мг L-карнитин, 250 мг магний, 250 мг сорбитол

1 л

5 л



РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС С ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫМИ СВОЙСТВАМИ, УЛУЧШАЮЩИЙ МЕТАБОЛИЗМ В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ, НА ОСНОВЕ L-КАРНИТИНА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает конверсию корма;
- Повышает привесы;
- Увеличивает сохранность поголовья;
- Стабилизирует производственные показатели.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Стролитин обладает анаболическим, антигипоксическим и антитиреоидным действием, стимулирует регенеративную активность тканей, способствует нормализации метаболических процессов, предотвращает остеопороз и активизирует жировой обмен.

L-карнитин, входящий в состав кормовой добавки - аминокислота, родственная витаминам группы B, которая синтезируется в организме из аминокислот лизина, метионина, витаминов C, B₃, B₆, B₉, B₁₂, железа, и ряда ферментов.

L-карнитин находится в мышечной ткани и в печени, где интенсифицирует разрушение молекул жирных кислот. L-карнитин оказывает анаболическое, антигипоксическое и антитиреоидное воздействие, стимулирует регенеративную активность тканей, способствует нормализации метаболических процессов, снижает уровень холестерина, предотвращает остеопороз и апоптоз, улучшает аппетит и активизирует жировой обмен. Экзогенный L-карнитин обладает аналогичными эндогенному веществу свойствами.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Стролитин применяют КРС, МРС, лошадям:

- для улучшения обмена веществ у сельскохозяйственных животных;
- для повышения продуктивности, резистентности организма;
- для улучшения работы печени и почек;
- после перенесенных заболеваний;
- для снижения влияния стрессовых факторов (транспортировка, вакцинация, изменение рациона, тепловой стресс, первые дни жизни, отъем молодняка).



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Стролитин



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного		Кратность выпойки	Дозировка	
			общая	для снятия стресса
Молодняк	КРС, лошади	Ежедневно	15 мл на гол./5 дней	20 мл на гол./5 дней
	Овцы, козы		1 мл на гол./10 дней	2 мл на гол./5 дней
Взрослые	КРС, лошади		20 мл на гол./10 дней	50 мл на гол./5 дней
	Овцы, козы		15 мл на гол./10 дней	40 мл на гол./5 дней

Стролитин совместим с кормовыми добавками и лекарственными препаратами, кроме антибиотиков тетрациклинового ряда.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

Тетравит

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО, ПЕРОРАЛЬНО

50 000 МЕ витамин А, 25 000 МЕ витамин D₃,
20 мг витамин Е, 5 мг витамин F

100 мл



КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНОВ А, D₃, Е И F В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ, ПОВЫШЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ В ФОРМЕ РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность перорального, внутримышечного и подкожного введения;
- Повышает выносливость в стрессовых ситуациях;
- Стимуляция иммунной защиты организма;
- Способствует заживлению ран;
- Комплексный состав способствует укреплению костной ткани.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тетравит восполняет недостаток витаминов в организме животных.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тетравит применяют:

- для профилактики и лечения гиповитаминозов;
- для повышения выносливости в стрессовых ситуациях; когда увеличивается потребность в витаминах из-за дополнительных нагрузок:
- во время беременности (только во второй половине);
- в период лактации, при нарушениях воспроизводительной функции;
- при транспортировке животных;
- при замене рациона;
- при задержке роста и недостаточном привесе;
- при инфекционных и инвазионных заболеваниях (в качестве вспомогательного средства);
- при ветеринарных мероприятиях;
- при проведении профилактических прививок и дегельминтизации;
- после оперативных вмешательств или травм.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутримышечно, подкожно или орально животным в следующих дозах (на животное в сутки):

Вид животного	Доза, мл	Вид животного	Доза, мл
Крупный рогатый скот	5-6	Овцы, козы	1-2
Лошади	3-5	Ягнята	1
Телята, жеребята	2-3		

С профилактической целью препарат вводят животным 1 раз в 2-3 недели, с лечебной целью – один раз в 7-10 дней.

Сухостойным коровам препарат вводят за 1-1,5 месяца до отела.

При оральном введении препарат дают животным в смеси с кормом в течение трех недель.

Одновременно с назначением препарата необходимо сбалансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Избегать контакта лекарственного средства с дезинфектантами.

Не применять одновременно с кортикостероидами. С осторожностью применять с НПВС, сердечными гликозидами и тетрациклинами, так как препарат усиливает их действие.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона- 28 суток.

Тетрагидровит

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

**25000 МЕ витамин А, 5000 МЕ витамин D₃,
25 мг витамин Е, 50 мг витамин С**

100 мл



**ДОСТУПНЫЙ ВОДНОДИСПЕРСНЫЙ КОМПЛЕКС ЖИРОРАСТВОРИ-
МЫХ ВИТАМИНОВ ДЛЯ МОЛОДНЯКА ЖИВОТНЫХ**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает последствия стресса;
- Сбалансированная рецептура;
- Удобная дозировка для молодняка;
- Повышенная биодоступность;
- Не инкапсулируется в месте инъекции и быстро всасывается.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тетрагидровит восполняет недостаток витаминов в организме животных.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тетрагидровит применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов, нормализации обмена веществ:

- во время беременности (только во второй половине) и в период лактации;
- при нарушениях воспроизводительной функции;
- при задержке роста и недостаточном привесе;
- при инфекционных и инвазионных заболеваниях;
- при проведении профилактической вакцинации и дегельминтизации;
- при стрессовых состояниях;
- после оперативных вмешательств или ранений;
- при снижении продуктивности и дополнительных нагрузках;
- при перемещении животных;
- при замене кормов на откорме.

Одновременно с назначением препарата необходимо сбалансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тетрагидровит вводят животным подкожно или внутримышечно.

Рекомендуемые дозы лекарственного препарата с учетом вида животного, возраста и метода введения:

Вид животного	Дозировка	Вид животного	Дозировка
КРС, лошади	0,2-0,25 мл/10 кг м. ж.	Овцы, козы	0,5-0,8 мл/10 кг м. ж.
Телята, жеребята	0,2-0,5 мл/10 кг м. ж.	Ягнята	1,5-2,0 мл/10 кг м. ж.

С профилактической целью Тетрагидровит применяют 1 раз в 2-3 недели в вышеуказанных дозировках, с лечебной целью дозу и кратность применения увеличивают в 2-3 раза.

Сухостойным коровам Тетрагидровит вводят за 1-1,5 месяца до отела.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат нельзя применять одновременно с кортикостероидными гормонами - способствуют выведению витамина D₃ из организма, а также нарушают всасывание и обмен кальция. Одновременное применение препарата с сердечными гликозидами может усиливать их токсическое действие (повышается риск появления нарушений ритма сердца). Одновременное применение с тетрациклинами увеличивает риск развития внутричерепной гипертензии. С осторожностью применяют при одновременном назначении с НПВС, так как препарат Тетрагидровит усиливает их действие. Необходимо избегать контакта растворов препарата с дезинфектантами и окислителями.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев со дня производства, после вскрытия флакона 14 суток.

Ферран®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг трехвалентное железо (в комплексе с низкомолекулярным декстраном), 0,005 мг витамин В₁₂, 0,2 мг витамин В₉

100 мл



КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В С ВЫСОКОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ МОЛОДНЯКА, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ПОВЫШЕНИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двукратное увеличение усвоения железа в организме животного за счет комбинированного состава;
- Способствует росту привесов в первые дни жизни¹;
- Не обладает токсическим эффектом за счет отсутствия фенола в составе, в отличие от других железосодержащих препаратов.



для перехода на страницу продукта отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ферран обладает высокой биологической активностью, при парентеральном введении восполняет в организме недостаток железа и витаминов группы В, вызванный экологическими причинами, потерей крови, погрешностями в кормлении или заболеваниями животных.

Клинические испытания доказывают, что применение препарата поросётам благоприятно сказывается на уровне гемоглобина и биохимических показателях крови животных и способствует дополнительному привесу. По результатам исследований данные показатели при применении препарата Ферран выше, чем при использовании других железосодержащих препаратов.



Клинические испытания препарата Ферран²


		Кол-во введенного железа на голову, мг	Срок исследования - 35 дней жизни									Прирост за 35 дн, %		
Препарат	Состав		Гемоглобин, г/л			Железо, мкмоль/л			Живая масса животных (кг)		Гемоглобин	Железо	Живая масса	
			4 дн	10 дн	35 дн	4 дн	10 дн	35 дн	1 дн	35 дн				
Ферран	Железо декстран (100 мг), витамины группы В	100	81,3	155,2	157,3	16,6	72	73,2	1,20±0,06	8,6±0,16	94%	341%	617%	
Другой железосодержащий препарат	Железо декстран (200 мг)	200	82,4	131,4	140,6	15,5	62,3	64,6	1,20±0,04	8,5±0,12	71%	316%	608%	

¹За счет сбалансированного сочетания железа и витаминов группы В


²Отчет по исследованию препарата Ферран в сравнении с аналогами для профилактики железодефицитной анемии поросят. Зав. кафедрой терапии и фармакологии Ставропольского ГАУ, профессор В.А. Оробец. Клинические исследования проводились на 80 поросятах породы СМ-1.



Динамика содержания железа в крови



Динамика содержания гемоглобина в крови



— Ферран (100 мг железа)
— Другой железосодержащий препарат (200 мг железа)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ферран применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота, жеребятam с лечебной и профилактической целью при анемиях различной этиологии.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Лекарственный препарат вводят животным внутримышечно в область бедра или шеи. При применении препарата Ферран в зимнее время года перед использованием препарат подогревают на водяной бане до 36-39°C.

Вид животного	Дозировка (мл на животное)	Вид животного	Дозировка (мл на животное)
С профилактической целью		С лечебной целью (животным старше 2-недельного возраста)	
Телята и жеребята на 3-4 дни жизни	4-6	Телята и жеребята	6-8
Ягнята на 5-6 дни жизни	1-1,5	Ягнята	2-3

При тяжелом течении заболевания лекарственное средство вводят повторно через 10-12 дней в тех же дозах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Нельзя применять совместно с антибиотиками группы тетрациклинов, а также пеницилламином.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки — не более 30 суток.

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

	<table><tr><td data-bbox="599 220 640 239">ГАН</td><td data-bbox="904 220 938 239">157</td></tr><tr><td data-bbox="599 242 677 261">Фулгард</td><td data-bbox="904 242 938 261">160</td></tr></table>	ГАН	157	Фулгард	160
ГАН	157				
Фулгард	160				



ГАН®

РАСТВОР

50 мг глутаровый альдегид, 50 мг глиоксаль,
100 мг алкилдиметилбензиламмония хлорид

1 л

5 л

20 л



ВЫГОДНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ВЕТНАДЗОРА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективен, сохраняет бактерицидное действие в течение 24 часов при обработке методом орошения и 48 часов при аэрозольной обработке¹;
- Широкий спектр бактерицидного, вирулицидного и фунгицидного действия;
- Активен в условиях органических загрязнений и в жесткой воде;
- Не разрушает металлы, пластмассу, резину и другие материалы.

ЗАЩИТНЫЙ
КОСТЮМ
В КОМПЛЕКТЕ!



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ГАН обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью и фунгицидным действием.

Рабочие растворы ГАН не обладают коррозионной активностью, не портят материалы обрабатываемых поверхностей, не вызывают коррозии металлов, не разрушают пластмассы, резину и другие материалы. Повышенная жесткость воды не снижает активности средства.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ГАН применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая:

- животноводческие, звероводческие помещения, находящиеся в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты, молочные блоки и кормокухни, санитарно-техническое оборудование, санитарные бойни убойных цехов и пунктов, открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), тару и спецодежду;
- производственные помещения, технологическое оборудование и территорию предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности, а также тару, спецодежду и предметы ухода за животными;
- транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птицы, а также сырья и продукции животного происхождения);
- ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.

¹ Испытания проводились на базе хозяйства Саратовской области в 2006 г.





При вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции перечисленных выше объектов при инфекциях, возбудители которых относятся к группе малоустойчивых (1 группа), устойчивых (2 группа) микроорганизмов и группе вирусов.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Перед проведением дезинфекции проводят механическую очистку и мойку помещений и оборудования.

Рабочие растворы готовят с учетом требуемой для дезинфекции концентрации, путем добавления необходимых количеств средства к водопроводной воде с температурой 8-25°C. При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 100%.

Соотношение ГАН и воды при приготовлении рабочих растворов указано в таблице:

Концентрация рабочего раствора, %	Объем рабочего раствора, л	Требуемое количество	
		ГАН, л	Воды, л
0,5	100	0,5	99,5
1,0	100	1,0	99
2,0	100	2,0	98
4,0	100	4,0	96

РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТ С УЧЕТОМ ЦЕЛИ И МЕТОДА ДЕЗИНФЕКЦИИ

Влажная дезинфекция (метод пенной генерации, орошения и протирания поверхностей)

Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ²
Профилактическая	3 часа	0,5	250 ³
Вынужденная (кроме ООИ ²)	24 часа	1	500 ³
Вынужденная при ООИ ²	6 часов	2	500
	1 час	4	300

Возможна локальная дезинфекция отдельных, свободных от животных, стойл, клеток, единиц оборудования, инвентаря и участков поверхностей при обеспечении интенсивной вентиляции и отсутствии людей и животных в непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

² Особо опасные инфекции

³ При обработке поверхностей из шероховатых материалов норма расхода рабочего раствора увеличивается до 600 мл/м² (300 мл/м² двукратно с интервалом 60 минут)

Аэрозольная дезинфекция

Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ³
Профилактическая и вынужденная (кроме ООИ ²)	24 часа	10	10

Подготовка дезковриков и дезбарьеров

Вид дезинфекции	Концентрация рабочего раствора, % для заправки дезковриков, дезбарьеров
Профилактическая и вынужденная	1

Замену дезинфицирующего раствора производят по мере необходимости, но не реже чем 2-3 раза в 7 дней.

Для применения рабочих растворов ГАН при отрицательных температурах (до -20°С) рекомендуется готовить рабочий раствор ГАН на основе 30% водного раствора этиленгликоля.



Технологические процессы комплексов и ферм могут способствовать накоплению в местах содержания животных разнообразной микрофлоры, которая является причиной вспышек инфекционных заболеваний.

Для обеспечения стабильного ветеринарного благополучия животноводства требуется проведение комплекса мер борьбы и профилактики инфекционных болезней.

- **Профилактическую** дезинфекцию проводят в благополучных хозяйствах для предупреждения инфекционных заболеваний. Цель такой дезинфекции - снижение общей микробной контаминации помещений для предотвращения накопления и распространения микроорганизмов в окружающей животных внешней среде.
- **Вынужденная** дезинфекция включает текущую и заключительную дезинфекцию и выполняется в хозяйствах, неблагополучных по инфекционным болезням животных, с целью локализации первичного очага инфекции, предотвращения распространения болезни внутри хозяйства и за его пределы.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия - не более 30 суток.

² Особо опасные инфекции



Фулгард®

РАСТВОР

250 мг глутаровый альдегид,
210 мг алкилдиметилбензиламмония хлорид,
30 мг дидецилдиметиламмония хлорид

1 л

5 л

20 л



**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ С ВЫГОДНОЙ
СТОИМОСТЬЮ ОБРАБОТКИ И МИНИМАЛЬНОЙ ЭКСПО-
ЗИЦИЕЙ**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективен против патогенов 1, 2, 3 и 4 групп устойчивости¹;
- Выгодная стоимость обработки;
- Экспозиция при профилактике - 20 минут;
- Не разрушает металлы, пластмассу, резину и другие материалы.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дезинфицирующее средство Фулгард обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью и фунгицидным действием (в том числе против спорообразующих форм, дрожжей и плесени), средство эффективно против патогенов I-IV групп устойчивости. Механизм действия заключается в нарушении окислительно-восстановительных процессов в микробной клетке путем вступления в реакцию с аминокислотами белков микроорганизмов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Фулгард применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая:

- животноводческие, звероводческие помещения, находящиеся в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты и окружающие их территории (включая инкубатории, яйцесклады, территории выгулов и дорог), молочные блоки и кормокухни, санитарно-техническое оборудование, санбойни, убойные цеха и пункты, открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), тару и спецодежду;
- производственные помещения, технологическое оборудование и территорию предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности, а также тару, спецодежду и предметы ухода за животными;
- транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных, а также сырьё и продукции животного происхождения);
- ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.

¹ По результатам ФБУН НИИД Роспотребнадзора, «Протокол микробиологических исследований № 02-111.Н/17, от 03.07.2017».



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Перед проведением дезинфекции проводят механическую очистку и мойку помещений и оборудования.

Рабочие растворы готовят с учетом требуемой для дезинфекции концентрации, путем добавления необходимых количеств средства к водопроводной воде с температурой 8-25°C. При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 100% вещество.

РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТ С УЧЕТОМ ЦЕЛИ И МЕТОДА ДЕЗИНФЕКЦИИ

Влажная дезинфекция (метод пенной генерации, орошения и протирания поверхностей)

Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ²
Профилактическая	20-30 минут	0,15	250-350
Вынужденная (кроме ООИ ²)	3 часа	0,3	200-400
Вынужденная при ООИ ²	3 часа	1	200-400

Возможна локальная дезинфекция отдельных, свободных от животных, стойл, клеток, единиц оборудования, инвентаря и участков поверхностей при обеспечении интенсивной вентиляции и отсутствии людей и животных в непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

Аэрозольная дезинфекция

Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ³
Профилактическая и вынужденная (кроме ООИ ²)	6 часов	30	2,5

Подготовка дезковриков и дезбарьеров

Вид дезинфекции	Концентрация рабочего раствора, % для заправки дезковриков, дезбарьеров
Профилактическая и вынужденная	0,6 (в зимнее время - до 1,3-2%)

Замену дезинфицирующего раствора производят по мере необходимости, но не реже 2 раз в 7 дней.

Для применения рабочих растворов Фулгард при отрицательных температурах (до -20°C) рекомендуется готовить рабочий раствор Фулгард на основе 30% водного раствора этиленгликоля.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения – 3 года со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов – не более 30 суток.

² Особо опасные инфекции

СЕПТО-СПРЕЙ



По рецепту

СОВРЕМЕННЫЙ АНТИСЕПТИК НА ОСНОВЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО ОРГАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЙОДА

- ▶ При нанесении отсутствует стресс у животных, так как не вызывает ожога кожи и слизистых оболочек благодаря мягкому действию водного раствора органического йода и, в том числе, отсутствию агрессивных растворителей, подобных спирту
- ▶ Более выраженное противомикробное действие благодаря комплексу повидон-йода
- ▶ Высвобождение активного йода происходит плавно, что способствует более продолжительному контакту антисептика с патогенной средой
- ▶ Защита от попадания в рану вредоносных микроорганизмов благодаря образованию тонкой защитной плёнки на наносимой поверхности
- ▶ Активен в отношении всех видов микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, простейших) благодаря свойствам повидон-йода
- ▶ Отсутствие резистентной микрофлоры
- ▶ Возможность нанесения на слизистые оболочки полости рта и др.

ДРУГИЕ ФАРМ-ГРУППЫ

	<table><tr><td>Гелерон</td><td>165</td></tr><tr><td>Гель двойного действия</td><td>166</td></tr><tr><td>Кальция борглюконат 20%</td><td>167</td></tr><tr><td>Кофеин-бензоат натрия 20%</td><td>169</td></tr><tr><td>Ксиланит</td><td>171</td></tr><tr><td>Септо-спрей</td><td>174</td></tr></table>	Гелерон	165	Гель двойного действия	166	Кальция борглюконат 20%	167	Кофеин-бензоат натрия 20%	169	Ксиланит	171	Септо-спрей	174
Гелерон	165												
Гель двойного действия	166												
Кальция борглюконат 20%	167												
Кофеин-бензоат натрия 20%	169												
Ксиланит	171												
Септо-спрей	174												

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	176
---------------------	-----



Гелерон®

ГЕЛЬ, НАРУЖНО

Фитокомплекс из эфирных масел растений: апельсин, бергамот, жасмин, иланг-иланг, розовое дерево, ромашка, пихта

250 мл

5 л



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 3 в 1: применение при родовспоможении, УЗИ, осеменении;
- Легкость проведения процедур;
- Особый состав обеспечивает улучшенное скольжение;
- Легко смывается.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Лубрикант Гелерон представляет собой гель на водной основе, обеспечивающий длительное скольжение и увлажнение, не обладает адгезивными свойствами. Благодаря нейтральному значению pH не раздражает кожу и слизистые оболочки. После нанесения на обрабатываемую поверхность не высыхает и сохраняет свои качества в течение 15-20 минут на открытом воздухе. Гель совместим с акушерскими перчатками из полиэтилена и латекса. Легко смывается водой.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Лубрикант Гелерон рекомендуется применять:

- для лучшего скольжения, уменьшения раздражения и болезненных ощущений при ректальном обследовании, а также при осеменении ректоцервикальным способом;
- для обработки рук ветеринарного специалиста перед манипуляциями (в перчатках и без перчаток);
- для обработки ветеринарного инструментария (зондов, катетеров, акушерских инструментов и т.п.);
- для УЗИ – исследований;
- для обработки сосков животных во время и после доения.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При использовании средства доза определяется ветеринарным специалистом в зависимости от вида манипуляции.

Лубрикант Гелерон применяют наружно и местно, нанося руками в необходимых количествах и распределяя по всей обрабатываемой поверхности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказания при использовании геля отсутствуют.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





Гель двойного действия

ГЕЛЬ, НАРУЖНО

Ментол, экстракт красного перца,
эфирные масла гвоздики и эвкалипта, экстракт прополиса

250 мл



**ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССОВ КРОВО-
ОБРАЩЕНИЯ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТОВ НАТУ-
РАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сверхкритический углекислый экстракт натурального перца красного жгучего бережно сохраняет все природные компоненты, создавая особый эффект разогрева;
- Охлаждающее действие эфирных масел останавливает развитие воспалительных процессов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Представляет собой гель на водной основе, обладающий охлаждающе-разогревающим действием. За счет специально подобранного фитокомплекса обладает успокаивающим действием, оказывает пролонгированное действие на микроциркуляцию и обменные процессы путем чередования тонизирования (охлаждающее действие ментола и масла эвкалипта) и релаксации (согревающий эффект экстракта красного перца), устраняет застойные явления. Специально разработанная основа геля облегчает негативные ощущения, способствует проникновению активных компонентов геля.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гель двойного действия назначается:

- для восстановления после интенсивных физических нагрузок в сочетании с приемами массажа;
- для усиления микроциркуляции крови и лимфы для снятия отечности, дискомфорта и для ускорения выведения молочной кислоты из мышц после физических нагрузок;
- для создания охлаждающего, а затем согревающего эффектов в коже и подлежащих тканях;
- для ускорения процессов восстановления тканей.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Гель двойного действия применяют наружно и местно, нанося тонким слоем на сухую чистую поверхность кожи в необходимых количествах, распределяя по всей обрабатываемой поверхности, массируя до полного впитывания. Рекомендуемая кратность применения – 2 раза в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не наносить на слизистые оболочки и поврежденную кожу.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



Кальция борглюконат 20%

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

200 мг кальция глюконат, 18,5 мг борная кислота,
13 мг натрия тетраборат

100 мл

250 мл



ПРЕПАРАТ С ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИМ, АНТИТОКСИЧЕСКИМ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отсутствует раздражающий ткани эффект;
- Возможность подкожного применения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Оказывает десенсибилизирующее, антитоксическое и противовоспалительное действие; повышает в крови уровень ионизированного кальция, необходимого для осуществления процесса передачи нервных импульсов, сокращения поперечнополосатых и гладких мышц, усиления сокращения сердечной мышцы, формирования костной ткани, свертывания крови.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат применяют с лечебной и профилактической целями при следующих болезнях животных:

- послеродовой парез, спазмофилия, эклампсия, шоковое состояние, рахит, тетания, остеомалация;
- задержание последа, предродовое и послеродовое залеживание;
- аллергические заболевания (крапивница, сывороточная болезнь);
- отравление солями магния, токсические поражения печени.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Борглюконат кальция, подогретый до температуры 35-37°C, вводят животным внутривенно (медленно) или подкожно из расчета 0,5 мл на 1 кг массы животного. При подкожных инъекциях дозу препарата вводят дробно в разные места. Препарат вводят животным однократно, а при необходимости повторно в тех же дозах через 24 часа.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





Максимальные разовые дозы (мл на животное):

Вид животного	мл на гол.	Кратность применения
Крупный рогатый скот	250-300	Однократно. При необходимости повторно в тех же дозах через 24 часа
Лошади	150-200	
Овцы и козы	50-100	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, гиперкальциемия, повышенная свертываемость крови, диарея, дегидратация, органическое поражение почек.

Недопустимо совместное применение с карбонатами, салицилатами, сульфатами, антибиотиками тетрациклинового ряда, сердечными гликозидами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 2 суток.

Кофеин-бензоат натрия 20%

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

75 мг кофеин, 120 мг бензоат натрия

20 мл

100 мл



ПРЕПАРАТ ВОЗБУЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМЫ У ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Первое средство при реанимации.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кофеин-бензоат натрия обладает возбуждающим действием на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы животных. Он усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, усиливает положительные условные рефлексы и повышает двигательную активность. Стимулирующее действие кофеина приводит к повышению физической работоспособности, уменьшению усталости и сонливости.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Кофеин-бензоат натрия 20% назначают лошадям, крупному рогатому скоту, овцам, козам. Применяют для возбуждения центральной нервной системы при отравлении ядами, переутомлении, мышечной слабости при различных заболеваниях.

Применяют с целью возбуждения сердечно-сосудистой системы при слабости сердечной деятельности, пониженной возбудимости и проводимости в сердце, шоковых состояниях. Применяют при хроническом миокардите, миодистрофиях, хронических миодегенерациях, в качестве сосудорасширяющего средства при спазмах сосудов головного мозга, почек, сердца.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Кофеин-бензоат натрия 20% применяют подкожно в следующих дозах (мл на одно животное):

Вид животного	Доза, мл
Лошади и крупный рогатый скот	5-10
Овцы, козы	0,5-2

Дозы и сроки применения зависят от массы животного и течения болезни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Выраженная гипертензия, возбужденное состояние.

Запрещается смешивать в одном шприце с препаратами, содержащими дубильные вещества, а также с препаратами, обладающими кислой реакцией.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.

Ксиланит®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

20 мг ксилазин

 ПО РЕЦЕПТУ

50 мл



ЭФФЕКТИВНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ СЕДАТИВНОЕ, МИОРЕЛАКСИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает беспокойство животных при проведении ветеринарных обработок;
- Безопасно обездвиживает животных для проведения легких оперативных вмешательств.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ксилазина гидрохлорид, входящий в состав лекарственного средства, является антагонистом центральных α_2 -адренорецепторов, оказывает успокаивающее, миорелаксационное и обезболивающее действие, стимулирует как центральные, так и периферические альфа-рецепторы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ксиланит предназначен для применения сельскохозяйственным животным с целью успокоения, обезболивания и миорелаксации при проведении клинического осмотра, рентгенологических исследований, для обездвиживания беспокойных и агрессивных животных, в том числе во время транспортировки; в качестве средства премедикации при оперативных вмешательствах, болезненных манипуляциях, а также для местной и общей анестезии.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ксиланит вводят внутримышечно или внутривенно (медленно, в течение 1-2 минут).



Крупному рогатому скоту Ксиланит вводят внутримышечно в зависимости от показаний в дозе 0,25-1,5 мл на 100 кг массы животного (0,05-0,3 мг ксилазина гидрохлорида на 1 кг массы животного). В зависимости от применяемой дозы Ксиланита у животного наблюдается седация и миорелаксация разной степени:

а) 0,25 мл/ 100 кг – **легкий седативный эффект** с понижением тонуса мускулатуры и сохранением положения тела в пространстве. Используют для успокоения животного.

б) 0,5 мл/ 100 кг – **умеренная седация**, с выраженным снижением мышечного тонуса (животное, как правило, сохраняет вертикальное положение) и некоторым анальгетическим эффектом. Используют для



проведения клинических исследований, малых хирургических вмешательств преимущественно в комбинации с местной анестезией.

в) 1,0 мл/ 100 кг массы животного – **выраженная седация** и снижение мышечного тонуса (животное лежит), высокая степень анестезии. Используют для длительных хирургических вмешательств с возможным дополнением местной или общей анестезией.

г) 1,5 мл/ 100 кг – **глубокая седация**, с полным снижением мышечного тонуса и высокой степенью анальгезии. Используется только взрослым животным после предварительной голодной диеты при очень болезненных и продолжительных операциях и при родовспоможении.



Мелкому рогатому скоту Ксиланит вводят внутримышечно в зависимости от показаний в дозе 0,05-0,25 мл на 10 кг массы животного (0,1-0,5 мг ксилазина гидрохлорида на 1 кг массы животного).



Лошадям Ксиланит вводят в дозе 7,5-15,0 мл/100 кг (1,5-3,0 мг ксилазина гидрохлорида на 1 кг массы животного) внутримышечно или 3,0-5,0 мл/100 кг (0,6-1,0 мг ксилазина гидрохлорида на 1 кг массы животного) внутривенно струйно медленно, в зависимости от показаний и типа высшей нервной деятельности животного.

Седативный эффект наступает обычно в течение 5 минут после введения и продолжается около 20 минут. Легко возбудимым животным лекарственное средство вводят в максимальной дозе; вводить препарат при спинном положении животного не рекомендуется.

При болезненных манипуляциях возможно сочетанное применение препарата Ксиланит с другими лекарственными средствами (барбитуратами, анальгетиками или местными анестетиками).

Анестезия с помощью барбитуратов должна проводиться не ранее, чем через 20 минут после введения Ксиланит, то есть после достижения глубокой седации. При соблюдении этих условий дозировка барбитуратов должна быть снижена в два-три раза.

Животных до наступления полного действия Ксиланит не следует беспокоить. Если необходимая глубина седации не достигнута, дополнительные инъекции для достижения желаемого эффекта не рекомендуются. Повторное введение Ксиланит в более высокой дозе возможно не ранее, чем через 24 часа, после полного восстановления физиологического состояния животного.

Животные после применения Ксиланит должны находиться под наблюдением до полного восстановления их физиологического состояния. При применении препарата Ксиланит в комбинации с каталептическими и анестезирующими препаратами их дозировка должна быть уменьшена в два или три раза от указанной в инструкции по применению. У некоторых животных после применения Ксиланит может наблюдаться кратковременное снижение кровяного давления, учащение пульса и дыхательных движений, указанные симптомы исчезают самопроизвольно и обычно не требуют дополнительного ветеринарного вмешательства. В случае выраженной дыхательной недостаточности животному

проводят массаж грудной клетки для восстановления нормального дыхания. У крупного рогатого скота высокие дозы Ксиланит могут вызвать гиперсаливацию. При проведении операций у крупного рогатого скота в боковом или спинном положении следует поддерживать грудную клетку и, при возможности, наклонить голову и шею для предупреждения аспирации слюны или рубцовой жидкости. Снижению саливации способствует применение атропина сульфата. При передозировке и остановке дыхания животному рекомендуется душ холодной водой и искусственное дыхание. Специфическими антидотами ксилазина гидрохлорида являются блокаторы альфа-адренорецепторов (например, антипамезол), которые применяют животным в соответствии с инструкциями.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Ксиланит запрещается применять самкам в последнюю треть беременности в связи с окситоциноподобным эффектом на матку (кроме случаев родовспоможения), животным при механическом повреждении желудочно-кишечного тракта (закупорка пищевода, заворот желудка, грыжа), с нарушением проводимости сердечной мышцы в анамнезе. Животным при болезнях легких лекарственное средство следует применять с осторожностью.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток



4 суток

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.



Септо-спрей®

РАСТВОР, НАРУЖНО

30 мг повидон-йод

100 мл



СОВРЕМЕННЫЙ АНТИСЕПТИК ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ОБЕЗ-ЗАРАЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПОВИДОН-ЙОДА¹, ОБЛАДАЮЩИЙ БЕЗ-БОЛЕЗНЕННЫМ, НО ПРИ ЭТОМ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ ПРОТИВО-МИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- При нанесении отсутствует стресс у животных, так как не вызывает ожога кожи и слизистых оболочек благодаря мягкому действию водного раствора органического йода и, в том числе, отсутствию агрессивных растворителей, подобных спирту;
- Более выраженное противомикробное действие благодаря комплексу повидон-йода. Высвобождение активного йода происходит плавно, что способствует более продолжительному контакту антисептика с патогенной средой;
- Защита от попадания в рану вредоносных микроорганизмов благодаря образованию тонкой защитной плёнки на наносимой поверхности;
- Активен в отношении всех видов микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, простейших) благодаря свойствам повидон-йода;
- Отсутствие резистентной микрофлоры;
- Возможность нанесения на слизистые оболочки полости рта и др.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Септо-спрей является антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим средством.

Йод активен в отношении всех видов микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, простейших), резистентность к нему отсутствует.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Септо-спрей применяют для местного лечения асептических и инфицированных ран, заболеваний кожи и слизистых оболочек, ожогов 1 и 2 степени, экзем и дерматитов, а также для обработки операционного и инъекционного поля.



¹ Органический комплекс йода

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Септо-спрей применяют наружно, нанося его на пораженные участки путем распыления с расстояния 10-20 см от поверхности до ее визуального покрытия лекарственным средством. При лечении асептических и инфицированных ран, ожогов 1 и 2 степени, экзем и дерматитов Септо-спрей наносят 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней. При необходимости перед нанесением препарата проводят туалет раны.

Лечение слизистых оболочек полости рта и глотки проводят нанесением лекарственного средства путем нажатия на насадку-спреер на пораженные участки 2-3 раза в сутки в течение 5-10 дней. Перед распылением рекомендуется промыть слизистые оболочки теплой кипяченой водой. Нельзя поить и кормить животное в течение 30 минут после обработки Септо-спреем.

Обработку операционного и инъекционного поля проводят путем распыления с расстояния 10-20 см до визуального покрытия подготовленного участка кожи. Обработку проводят дважды, дав обработанной поверхности подсохнуть.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Гипертиреоз, индивидуальная повышенная чувствительность животного к йоду (в том числе в анамнезе) и другим компонентам препарата.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - 60 суток.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Температура, частота дыхания, частота пульса у здоровых животных

Вид животного	Температура тела (в градусах)	Число ударов сердца в минуту	Частота дыхания в минуту
КРС	37,5-39,5	50-80	12-25
МРС	38,5-40,0	70-80	16-30
Лошадь	37,5-38,5	24-42	8-16
Верблюд	36,0-38,6	32-52	5-12
Олень	37,6-38,6	36-48	8-16

Продолжительность беременности здоровых животных, количество потомства и масса новорожденного

Вид животного	Продолжительность беременности, дней	Количество потомства, голов	Живая масса новорожденного, кг
КРС: молочные породы	279-281 (280)	1 (иногда 2)	20-35
мясные породы	284-289 (285)	1 (иногда 2)	25-50
Овцы	144-156 (150)	1 (часто 2)	3-4
Козы	146-157 (150)	2	2,5-3
Лошади	320-355 (336)	1	35-60

Половая цикличность у здоровых самок животных

Вид животного	Наступление течки после родов, дней	Продолжительность течки, дней	Период относительного покоя, дней	Прекращение течки в связи с возрастом, лет
Корова	20-50	16-32 часа	18-24	20-22
Овца	15-35	1-2	15-19	8
Коза	16-30	1-2	14-20	8
Кобыла	8-9	2-11	21-23	22-27

Продолжительность родов и отделения последа

Вид животного	Продолжительность раскрытия шейки матки	Средняя продолжительность изгнания плода	Средняя продолжительность отделения последа после родов
Корова	до 12 ч.	от 20 мин. до 6 ч., в среднем 3 часа	до 3-12 ч.
Коза, овца	около суток	от 15 мин. до суток	до 3-12 ч.
Кобыла	от нескольких часов до 1-2 дней	30 мин., иногда 5-10 мин	Вместе с плодом или через 5-30 мин., реже через 2 ч.

Нормы водопотребления для сельскохозяйственных животных, л на голову в сутки

Вид животного	Расход воды на поение	Вид животного	Расход воды на поение
Коровы	65	Лошади взрослые	50
Нетели	40	Молодняк до 1,5 лет	35
Молодняк старше 6 мес.	25	Овцы и козы	8
Молодняк до 6 мес.	10	Ягнята и козлята	3

НИТА-ФАРМ – КЛЮЧЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ РОССИИ

В тесном взаимодействии с ветеринарными
врачами-практиками мы глубоко изучаем
потребности рынка и лучшие мировые
инновации

30+
ЛЕТ НА РЫНКЕ

Наша цель – не просто достигнуть высочайшего
качества, но и превзойти ожидания наших
клиентов, предоставляя им лучшие продукты,
которые делают мир лучше каждый день



**МЫ – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ
НОВЫХ ПРОДУКТОВ
В РОССИИ**

22

ПАТЕНТОВАННЫХ
ПРОДУКТА

20 НОВИНОК
за 2025 год

ВСЕ О НОВИНКАХ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

САЙТ



WWW.NITA-FARM.RU

В КОНТАКТЕ



@nitafarm

ТЕЛЕГРАМ



@nita_farm

MAX



@nitafarm