



ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СКОТОВОДСТВА



70 продуктов



НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Вемелкам 2% НОВИНКА	11
Кетопрофен 10%	13
Флулекс	15



АНТИОКСИДИЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Зуратрол НОВИНКА	21
-------------------------------	----



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Азитронит 	33
Амоксигард	35
Амоксициллин 150	39
Дитрим	46
Дитрим порошок	48
Доксилокс	52
Лексофлон 	61
Неокальф НОВИНКА	70
Нитокс 200	72
Нитокс Форте	74
Номидеф НОВИНКА	79
Пневмотил	81
Тилозин 50 и 200	92
Тулатрин	96
Флорокс	99
Цефтонит	103
Цефтонит Форте	106
Энронит	109



ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Альвет	117
Альвет-суспензия	119
Ивермек	121
Ивермек-ОН 	126
Клозатрем	132
Левамизол 75	134
Мерадок	136
Неозидин	139
Неозидин М	141
Риказол	143
Цифлунит	145
Цифлунит-ОН	147
Цифлунит Флок 	149



АКУШЕРСКО- ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Йодопен	153
Максинон	155
Мастенит	157
Мастигард	159
Мастисан	161
Мастомицин	162
Миоцид	164
Митрек	166
Номидеф LC НОВИНКА	168
Сенсиверин НОВИНКА	170
Сепранол	172
Септогель	175
Утеротон	177
Утеротон Форте НОВИНКА	179



ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Регостенол	183
Ферголин	186



ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Бутофан	193
Диастатин	199
Е-селен	202
Е-селен OR	204
Кабуфол НОВИНКА	206
Комплекс витаминов	
А, D ₃ , Е в масле	208
Нитамины	212
Стролитин	216
Тетравит	220
Тетрагидровит	222
Ферран	224



СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ГАН	229
Фулгард	232



— ДРУГИЕ ФАРМ-ГРУППЫ

Гелерон	237
Гель двойного действия	238
Кальция борглюконат 20%	239
Кофеин-бензоат натрия 20%	241
Ксиланит	243
Септо-спрей	246

ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СВИНОВОДСТВА



62 продукта



НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Вемелкам 2% НОВИНКА	11
Кетопрофен 10%	13
Флулекс	15



АНТИКОКЦИДИЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Зуратрол НОВИНКА	21
-------------------------------	----



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Азитронит 	33
Амоксигард	35
Амоксигард WS	37
Амоксициллин 150	39
Амоксициллин Feed	41
Гатилон НОВИНКА	43
Дитрим	46
Дитрим порошок	48
Доксилокс	52
Доксилокс OR	54
Доксилокс WS	56
Колибак 6 и 12	58
Лексофлон 	61
Лексофлон OR 	65
Нитокс 200	72
Нитокс Форте	74
Нозифор 	77
Номицеф НОВИНКА	79
Пневмотил	81
Пневмотил Feed	83
Тиалонг	85
Тиалонг 45% WS	87
Тиалонг 80% Feed	90
Тилозин 50 и 200	92
Тинивазол НОВИНКА	94
Тулатрин	96
Флорокс	99
Флорокс OR	101
Цефтонит	103
Цефтонит Форте	106
Энронит	109
Энронит OR	111



ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Альвет	117
Ивермек	121
Ивермек-ON 	126
Левамизол 75	134
Мерадок	136
Цифлунит-ON	147



АКУШЕРСКО- ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

Йодопен	153
Утеротон	177



ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Фертоксел НОВИНКА	189
--------------------------------	-----



ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Бутофан	193
Диастатин	199
Е-селен	202
Е-селен OR	204
Комплекс витаминов	
А, D ₃ , Е в масле	208
Нитамины	212
Стролитин	216
Тетравит	220
Тетрагидровит	222
Ферран	224



СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ГАН	229
Фулгард	232



ДРУГИЕ ФАРМ-ГРУППЫ

Гелерон	237
Гель двойного действия	238
Кальция борглюконат 20%	239
Кофеин-бензоат натрия 20%	241
Септо-спрей	246

ПОРТФЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА



34 продукта



АНТИКОКЦИДИЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Амбигранум-М НОВИНКА	23
Амбигранум-С НОВИНКА	24
Деквикокс	25
Кокцимакс	26
Мадефорд	27
Мелазит 40%	28
Никарзин	29
Эймицид	30



ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Бутофан OR	195
Е-селен OR	204
Комплекс витаминов	
А, D ₃ , Е в масле	208
Минтов	210
Нитамин OR Актив	214
Стролитин	216
Тетрагидровит	222



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Амоксиgard WS	37
Гатилон НОВИНКА	43
Дитрим OR	50
Доксилокс OR	54
Доксилокс WS	56
Колибак 6 и 12	58
Лексофлон OR	65
Нозифор	77
Пневмотил	81
Тиалонг 45% WS	87
Тинивазол НОВИНКА	94
Флорокс OR	101
Энронит OR	111



СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

ГАН	229
Фулгارد	232

Полезная информация 248



ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Альвет	117
Ивермек OR	123
Ивермек-ON	126
Цифлунит-ON	147

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА - АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

D

D-клопростенол

Регостенол 183

L

L-карнитин

Стролитин 216

A

Азитромицин

Азитронит 33

Алкилдиметилбензиламмония хлорид

ГАН 229

Фулгард 232

Альбендазол

Альвет 117

Альвет-суспензия 119

Альтреногест

Фертоксел 189

Амоксициллин

Амоксигард 35

Амоксигард WS 37

Амоксициллин 150 39

Амоксициллин Feed 41

B

Бензоат натрия

Кофеин-бензоат натрия 20% 241

Борная кислота

Кальция борглюконат 20% 239

Бутафосфан

Бутофан 193

Бутофан OR 195

Кабуфол 206

V

Висмут субнитрат

Миоцид 164

Витамин B₁₂

Бутофан 193

Бутофан OR 195

Ферран 224

Витамин F

Тетравит 220

Витамин C

Нитамины 212

Нитамины OR Актив 214

Тетрагидровит 222

Витамин D₃

Комплекс витаминов A, D₃, E в масле 208

Нитамины 212

Нитамины OR Актив 214

Тетравит 220

Тетрагидровит 222

Витамин E

Е-селен 202

Е-селен OR 204

Ивермек 121

Ивермек OR 123

Комплекс витаминов A, D₃, E в масле 208

Нитамины 212

Нитамины OR Актив 214

Тетравит 220

Тетрагидровит 222

G

Гатифлоксацин

Гатилон 43

Гонадорелина ацетат

Ферголин 186

Глиоксаль

ГАН 229

Глутаровый альдегид

ГАН 229

Фулгард 232

Гентамицин

Мастомицин 162

D

Д-пантенол (декспантенол)

Ивермек-гель 128

Ивермек-спрей 130

Максинон 155

Денаверин гидрохлорид

Сенсиверин 170

Диклазурил

Кокцимакс 26

Декоквинат

Деквикокс 25

Дидецилдиметиламмония хлорид

Фулгард 232

Декстран железа

Ферран 224

Доксициклин

Доксилоск 52

Доксилоск OR 54

Доксилоск WS 56

Диминазена диацетурат

Неозидин М 141

Диминазен

Неозидин 139

Неозидин М 141

Дорамектин

Мерадок 136

И

Ивермектин

Ивермек 121

Ивермек OR 123

Ивермек-ON 126

Ивермек-гель 128

Ивермек-спрей 130

К

Комплекс эфирных масел

Минтов 210

Кремния диоксид

Диастатин 197

Колистина сульфат

Колибак 6 и 12 58

Неокальф 70

Клоксациллин

Мастенит 157

Кетопрофен

Кетопрофен 10% 13

Ксилазин

Ксиланит 243

Кофеин

Кофеин-бензоат натрия 20% 241

Кальция глюконат

Кальция борглюнат 20% 239

Кабуфол 206

Клиндамицин

Мастомицин 162

Колистин

Колибак 6 и 12 58

Энронит 109

Энронит OR 111

Клавулановая кислота

Амоксигард 35

Амоксигард WS 37

Клозантел

Клозатрем 132

Л

Лимонная кислота

Диастатин 199

Левифлоксацин

Лексофлон 61

Лексофлон OR 65

Максинон 155

Мастигард 159

Левамизол

Левамизол 75 134

Лидокаин

(лидокаина гидрохлорид)

Ивермек-гель 128

Ивермек-спрей 130

Мастомицин 162

М

Магний (магния сульфат)

Стролитин 216

Мадурамицин

Мадефорд 27

Мелоксикам

Вемелкам 2% 11

Ментол

Гель двойного действия 238

Минтов 210

Молочная кислота

Диастатин 199

Монензин (монензин натрия)

Амбигранум-М 23

Мелазит 40% 28

Мяты перечной масло эфирное

Минтов	210
--------------	-----

H

Натрий лимоннокислый

Диастатин	199
-----------------	-----

Нозигептид

Мастигард	159
Нозифор	77

Никарбазин

Амбигранум-М.....	23
Амбигранум-С.....	24
Никарзин	28

Натрия тетраборат

Кальция борглюнат 20%	239
-----------------------------	-----

Нитазоксанид

Неокальф	70
----------------	----

O

Окситетрациклин

Нитокс 200	72
Нитокс Форте	74

Окситоцин

Утеротон Форте	179
----------------------	-----

П

Полыни горькой масло эфирное

Минтов	210
--------------	-----

Прополиса экстракт

Гель двойного действия	238
------------------------------	-----

Пропранолол

Сепранол	172
Утеротон	177
Утеротон Форте	179

Пенициллин (бензилпенициллин)

Мастисан	161
----------------	-----

Повидон-йод

Йодопен.....	153
Септогель.....	175
Септо-спрей	246

Пантенол

Йвермек-спрей	130
---------------------	-----

P

Рикобендазол

Риказол	143
---------------	-----

C

Салиномицин

Амбигранум-С	24
Эймицид	30

Состав фитокомплекса

Гелерон	237
Гель двойного действия	238

Сорбитол

Стролитин	216
-----------------	-----

Селенит натрия

Е-селен	202
Е-селен OR	204

Стрептомицин

Мастисан	161
----------------	-----

Сульфадимезин

Дитрим	46
Дитрим порошок	48
Дитрим OR	54
Мастисан	161

T

Туйон

Гель двойного действия	238
------------------------------	-----

Танин

Диастатин	199
-----------------	-----

Тилвалозин

Тинивазол	94
-----------------	----

Тилозин

Тилозин 50 и 200	92
------------------------	----

Тилмикозин

Пневмотил	81
Пневмотил Feed	83

Триметоприм

Дитрим	46
Дитрим порошок	48
Дитрим OR	50

Тиамулин

Тиалонг	85
Тиалонг 45% WS	87
Тиалонг 80% Feed	90

Толтразурил

Зуратрол	21
----------------	----

Тулатромицин

Тулатрин	96
----------------	----

Ф

Фолиевая кислота

Ферран	224
--------------	-----

Флорфеникол

Флорокс	99
Флорокс OR	101

Флуниксин (флуниксин меглумин)

Нитокс Форте	74
Флунекс	15

Феназон

Неозидин	139
Неозидин М	141

Х

Хлорид калия

Диастатин	199
-----------------	-----

Хлорид натрия

Диастатин	199
-----------------	-----

Хлоргексидин

Ивермек-спрей	130
Сепранол	172

Ц

Цефапирин

Митрек	166
--------------	-----

Цианокобаламин

Бутофан	193
Бутофан OR	195

Цифлутрин

Цифлунит	145
Цифлунит-ОН	147
Цифлунит Флок	149

Цефкином

Номицеф	79
Номицеф LC	168

Цефтиофур

Цефтонит	103
Цефтонит Форте	106

Ш

Шалфея масло эфирное

Минтов	210
--------------	-----

Э

Эвкалиптол

Гель двойного действия	238
------------------------------	-----

Эфирные масла эвкалипта

Гель двойного действия	238
Минтов	210

Эфирные масла гвоздики

Гель двойного действия	238
------------------------------	-----

Экстракт красного перца

Гель двойного действия	238
------------------------------	-----

Энрофлоксацин

Энронит	109
Энронит OR	111

**НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА**

	 КРС	 Лошади	 МРС	 Свиньи	 Собаки	 Кошки	 С/х птица	 Другие	Стр.
Вемелкам 2% НОВИНКА	•	•		•					11
Кетопрофен 10%	•			•					13
Флунекс	•	•		•					15



Вемелкам® 2% **НОВИНКА**

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

20 мг мелоксикам

100 мл



СОВРЕМЕННЫЙ СЕЛЕКТИВНЫЙ НПВС (МЕЛОКСИКАМ) С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО КОНТРОЛЯ БОЛИ И ВОСПАЛЕНИЯ У ВСЕХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Качество ключевого российского производителя проверенное временем;
- Пролонгированное действие до 48 часов;
- Высокая эффективность терапии при заболеваниях конечностей.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мелоксикам, входящий в состав препарата, угнетает синтез простагландинов, оказывая противовоспалительное, антиэкссудативное, жаропонижающее и анальгетическое действия.

Механизм действия заключается в избирательном подавлении ферментативной активности циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), в результате блокируется синтез воспалительных простагландинов, вызывающих воспаление, боль и отек; незначительно действует на циклооксигеназу-1 (ЦОГ-1), сводя к минимуму развитие побочных эффектов (в т. ч. кровотечения, образование язв и нарушение функции почек). Мелоксикам уменьшает инфильтрацию лейкоцитов в месте воспаления, угнетает агрегацию тромбоцитов, а также блокирует у животных продукцию тромбксана В2, вызываемую эндотоксином *E. coli*.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Вемелкам 2% применяют крупному рогатому скоту, лошадям и свиньям в качестве противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего средства при акушерско-гинекологических (в том числе маститах, эндометритах, синдроме ММА), желудочно-кишечных (в том числе при коликах), респираторных инфекциях, острых и хронических заболеваниях опорно-двигательного аппарата и мягких тканей, а также при устранении болевого синдрома различной этиологии.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка
КРС	Подкожно или внутривенно	1 мл на 40 кг м. ж. (0,5 мг мелоксикама на 1 кг м. ж.)
Лошади	Внутривенно	1 мл на 33 кг м. ж. (0,6 мг мелоксикама на 1 кг м. ж.)
Свины	Внутримышечно	1 мл на 50 кг м. ж. (0,4 мг мелоксикама на 1 кг м. ж.)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность.

Запрещается применение телятам, не достигшим недельного возраста, жеребят, не достигшим 6-недельного возраста, жеребьим и лактирующим кобылам, животным с поражениями печени и сердечно-сосудистой системы, нарушениями функции почек, при проявлении геморрагического синдрома.

Запрещается одновременное применение лекарственного препарата с глюкокортикостероидами, другими нестероидными противовоспалительными препаратами, а также антикоагулянтами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



15 суток - КРС,
5 суток - ЛОШАДИ, СВИНЫ



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.



Кетопрофен 10%

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг кетопрофен

100 мл



ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МОЛОКО И С МИНИМАЛЬНЫМИ СРОКАМИ ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЯСНУЮ ПРОДУКЦИЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без ограничений по молоку;
- Разрешен беременным и новорожденным¹;
- Особенно эффективен в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата².

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кетопрофен, входящий в состав препарата, является производным пропионовой кислоты, обладает выраженным противовоспалительным, анальгезирующим и жаропонижающим действием, подавляет агрегацию тромбоцитов.

Кетопрофен 10% быстро исчезает из плазмы крови, сохраняя терапевтическую концентрацию в очаге воспаления.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Кетопрофен 10% назначают крупному рогатому скоту и свиньям в качестве противовоспалительного, анальгезирующего и жаропонижающего средства в комплексной терапии острых и хронических заболеваний, сопровождающихся воспалительными процессами, болевыми синдромами и гипертермией различной этиологии, в сочетании с антибактериальными препаратами для комплексного лечения (акушерско-гинекологические, желудочно-кишечные, респираторные и заболевания опорно-двигательного аппарата).

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	В/в или в/м	3 мл на 100 кг м. ж. (эквивалентно 3 мг кетопрофена на 1 кг м. ж.)	Ежедневно, 1 раз в сутки в течение 1-3 дней
Свиньи	В/м		

Продолжительность курса лечения зависит от состояния животного и определяется лечащим врачом.



МАХ
ПЕРИОД
ПОЛУВЫ-
ВЕДЕНИЯ



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

¹ Не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия

² Хорошо проникает в синовиальную жидкость и синовиальную оболочку суставов





ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Кетопрофен 10% не следует применять одновременно с другими нестероидными противовоспалительными препаратами, диуретиками, глюкокортикоидами и антикоагулянтами и смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



7 суток - КРС
6 суток - СВИНЬИ



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.

Флунекс

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

83 мг флуниксин меглумин

100 мл



НЕСТЕРОИДНОЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО, ПОВЫШАЮЩЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ, - СОКРАЩАЕТ СРОКИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ И СОХРАНЯЕТ ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА У СВИНЕЙ И КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ЗА СЧЕТ СНЯТИЯ ВОСПАЛЕНИЯ И БОЛЕВОГО СИНДРОМА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Мощное обезболивающее и противовоспалительное действие;
- Быстрое восстановление продуктивных качеств;
- Пролонгированное действие - 24 часа;
- Действует на 16 часов дольше кетопрофена.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Флуниксин, входящий в состав препарата, угнетает синтез медиаторов воспаления. Препарат кумулируется в очаге воспаления, обеспечивая терапевтический эффект в течение 24 часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Флунекс назначают лошадям, крупному рогатому скоту и свиньям в качестве противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего средства в комплексной терапии острых воспалительных процессов при акушерско-гинекологических, желудочно-кишечных, респираторных заболеваниях, при болевых синдромах и гипертермии и др.

ФЛУНЕКС БЫСТРО СНИМАЕТ СИМПТОМЫ ГАСТРОЭНТЕРИТА

ВРЕМЯ СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СИМПТОМОВ **ГАСТРОЭНТЕРИТА** У ПОРОСЯТ



Использование препарата Флунекс позволяет снизить интенсивность симптомов уже через 7 часов, что **на 17 часов меньше**, чем при монотерапии. Это обеспечивает быстрое улучшение состояния животного и сохранение привесов.

* при соблюдении инструкции по применению не оказывает негативного воздействия на ЖКТ

ОДИН ИЗ САМЫХ
БЕЗОПАСНЫХ
НПВС*



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код




видео о продукте
Флунекс






СОКРАЩАЕТ СРОК ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ НА 1,5 ДНЯ

ПЕРИОД ЛЕЧЕНИЯ ТРАХЕОБРОНХИТА ТЕЛЯТ




КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ МАСТИТА

ПОЛНОЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ



КУРС ЛЕЧЕНИЯ ММА — 2 ДНЯ

СРОК ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ СВИНЕЙ



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	Респираторные заболевания Острые маститы, прочие заболевания	В/м, в/в	2 мл/45 кг	1 раз в сутки, не более 5 дней
Свиньи	ММА-синдром, респираторные заболевания	В/м	2 мл/45 кг	Однократно
Лошади	Заболевания опорно-двигательного аппарата	В/в	1 мл/45 кг	1 раз в сутки, не более 5 дней
	Купирование болевого синдрома при коликах			Однократно, при необходимости повторить через 24 часа
	Эндотоксемия, септический шок, прочие патологии, связанные с нарушением кровообращения в ЖКТ		0,2 мл/45 кг	Каждые 6-8 часов, не более 5 введений

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

В связи с возможной болевой реакцией не следует вводить в одно место крупным животным в объеме, превышающем 5 мл, мелким - 2,5 мл.

Не рекомендуется применение препарата беременным самкам, молодняку моложе 1,5-месячного возраста, а также пороссятам массой менее 6 кг.

Флунекс не следует применять одновременно с другими противовоспалительными средствами и нефротоксическими препаратами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



8 суток - КРС при в/в введении
35 суток - КРС при в/м введении
8 суток - ЛОШАДИ
24 дня - СВИНЬИ



60 часов

СРОК ГОДНОСТИ

4 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.

АМБИГРАНУМ-М

Монензин натрия 8%, никарбазин 8%

НИКАРЗИН

Никарбазин 25%

АМБИГРАНУМ-С

Салиномицин 8%, никарбазин 8%

МАДЕФОРД

Мадурамицин 1%

ДЕКВИКОКС

Декоквинат 6%

МЕЛАЗИТ 40%

Монензин 40%

КОКЦИМАКС


Диклазурил 0,5%

ЭЙМИЦИД

Салиномицин 12%

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РЕШЕНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КОКЦИДИОЗА

МАХ – ЭФФЕКТ



АНТИКОКЦИДИЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ





Зуратрол®

НОВИНКА

СУСПЕНЗИЯ, ПЕРОРАЛЬНО

50 мг толтразурил

500 мл

1 л



ПРОВЕРЕННЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ТОЛТРАЗУРИЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЭЙМЕРИОЗА У МОЛОДНЯКА КРС И СВИНЕЙ С ОДНОКРАТНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ И ШИРОКИМ СПЕКТРОМ АНТИКОКЦИДИЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Толтразурил, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антикокцидийного действия, эффективен в отношении:

- *Isospora suis*
- *Eimeria arloingi*
- *Eimeria scabra*
- *Eimeria guevarai*
- *Eimeria bovis*
- *Eimeria zuernii*
- *Eimeria alabamensis*



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Зуратрол назначают поросятам и молодняку крупного рогатого скота с лечебной и лечебно-профилактической целью при кокцидиозе.

Перед применением препарат тщательно взболтать в течение 30 секунд.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Телята	Перорально индивидуально однократно с помощью дозирующего устройства	С 2-недельного возраста в дозе 3 мл суспензии на 10 кг м. т. ж.	1 раз в сутки
Поросята		На 3-5-й день жизни в дозе 0,4 мл на 1 кг м. т. ж., но не менее 0,5 мл и не более 2 мл на животное	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Животным с развитым рубцовым пищеварением препарат применяют при необходимости под контролем ветеринарного врача на основании оценки соотношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

Запрещается применение Зуратрол дойным коровам ввиду его выделения с молоком.





ОГРАНИЧЕНИЯ



70 суток - ПОРОСЯТА,
63 дня - ТЕЛЯТА

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.

Амбигранум®-М НОВИНКА ПО РЕЦЕПТУ

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

80 мг монензин натрия, 80 мг никарбазин

20 кг



КОМБИНИРОВАННЫЙ КОКЦИДИОСТАТИК НА ОСНОВЕ МОНЕНЗИНА И НИКАРБАЗИНА В СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ ГРАНУЛАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В КОРМЕ И ВЫСОКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая безопасность и эффективность;
- Российское производство по GMP гарантирует стабильность поставок.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат активен в отношении всех видов кокцидий, паразитирующих у птиц, включая:

- *Eimeria tenella*
- *E. acervulina*
- *E. mivati*
- *E. necatrix*
- *E. brunetti*
- *E. maxima*

а также:

- *Eimeria adenoides*
- *Eimeria meleagriditis*
- *Eimeria gallopavonis*



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Цыплята-бройлеры	Профилактика кокцидиоза	В смеси с кормом	500-625 г/1 т корма (40-50 г монензина и 40-50 г никарбазина/1 т корма)	С первого дня жизни в течение периода выращивания, исключая из рациона за 5 дней до убой
Ремонтный молодняк кур, индейки				С первого дня жизни до 16-недельного возраста

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не применяется курам-несушкам, ремонтному молодняку кур и индеек старше 16 недель, ввиду его накопления в яйцах.

Запрещается применение препарата в течение 7 суток до и в течение 7 суток после применения тиамулина, а также с другими кокцидиостатиками. Лекарственный препарат совместим с витаминными и кормовыми добавками, применяемыми в птицеводстве.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – 4 месяца.





Амбигранум®-С

НОВИНКА

 ПО РЕЦЕПТУ

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

80 мг никарбазин, 80 мг салиномицин

20 кг



КОМБИНИРОВАННЫЙ КОКЦИДИОСТАТИК НА ОСНОВЕ САЛИНОМИЦИНА И НИКАРБАЗИНА В СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫХ ГРАНУЛАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В КОРМЕ И ВЫСОКИЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая безопасность и эффективность;
- Российское производство по GMP гарантирует стабильность поставок.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат обладает широким спектром антикокцидийного действия, активен в отношении:

- *E. acervulina*
- *E. maxima*
- *E. mivati*
- *E. praecox*
- *E. brunetti*
- *E. mitis*
- *E. necatrix*
- *E. tenella*

и других видов кокцидий, паразитирующих у птиц.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Цыплята-бройлеры	Профилактика кокцидиоза	В смеси с кормом	500-625 г/1 т корма (40-50 г салиномицина и 40-50 г никарбазина/1 кг корма)	С первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 5 дней до убоя
Ремонтный молодняк кур				С первого дня жизни, исключая из рациона не менее чем за 14 суток до начала яйцекладки

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не применяется курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки, ввиду его накопления в яйцах.

Запрещается применение препарата в течение 7 суток до и в течение 7 суток после применения тиамулина, а также с другими кокцидиостатиками.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – 4 месяца.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



Деквикокс®

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

60 мг декоквинат

 ПО РЕЦЕПТУ

20 кг



КОРМОВОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КОКЦИДИОЗА НА ОСНОВЕ ДЕКОКВИНАТА

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Декоквинат обладает широким спектром антикокцидийного действия, эффективен в отношении:

- *Eimeria* spp.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Цыплята-бройлеры	Профилактика кокцидиоза	в смеси с кормом	333 г/1 т корма (20 мг декоквината/1 кг корма)	С первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 5 дней до убоя
Ремонтный молодняк кур				С первого дня жизни, исключая из рациона не менее чем за 14 суток до начала яйцекладки



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата Деквикокс курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки, ввиду его накопления в яйцах.

Не допускается использование препарата одновременно с другими антикокцидийными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 3 месяцев.





Кокцимакс®

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

5 мг диклазурил

 ПО РЕЦЕПТУ

20 кг



КОРМОВОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КОКЦИДИОЗА НА ОСНОВЕ ДИКЛАЗУРИЛА

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Диклазурил обладает широким спектром антикокцидийного действия, эффективен в отношении всех внутриклеточных стадий цикла развития кокцидий, паразитирующих у сельскохозяйственной птицы, включая:

- *E. necatrix*
- *E. tenella*
- *E. acervulina*
- *E. brunetti*
- *E. maxima*
- *E. mivati*
- *E. adenoides*
- *E. meleagridis*



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Цыплята-бройлеры	Профилактика кокцидиоза	в смеси с кормом	200 г/1 т корма (1 мг диклазурила/1 кг корма)	С первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 5 дней до убоя
Ремонтный молодняк кур				С первого дня жизни, исключая из рациона не менее чем за 14 суток до начала яйцекладки

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата Кокцимакс курам-несушкам, ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки, ввиду его накопления в яйцах, а также животным других видов.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 6 месяцев.



Мадефорд®

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

10 мг мадурамицин аммония

 ПО РЕЦЕПТУ

20 кг



КОРМОВОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КОКЦИДИОЗА НА ОСНОВЕ МАДУРАМИЦИНА

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мадурамицин, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антикокцидийного действия, эффективен в отношении всех видов кокцидий (эймерий), паразитирующих у птиц, в том числе:

- **E. necatrix**
- **E. brunetti**
- **E. mivati**
- **E. praecox**
- **E. tenella**
- **E. maxima**
- **E. acervulina**
- **E. mitis**



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Цыплята-бройлеры	Профилактика кокцидиоза	в смеси с кормом	500 г/1 т корма (5 мг мадурамицина/1 кг корма)	С первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 5 дней до убоя
Ремонтный молодняк кур				С первого дня жизни, исключая из рациона не менее чем за 14 суток до начала яйцекладки

В составе комбикорма лекарственный препарат стабилен в течение 3 месяцев.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не применяется курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки.

Не допускается использование Мадефорд одновременно с другими антикокцидийными средствами.

Запрещается применение препарата совместно с тиамулином, а также за 7 дней до начала и 7 дней после окончания его применения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 3 месяцев.





Мелазит® 40%

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

400 мг монензин



20 кг



КОРМОВОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КОКЦИДИОЗА НА ОСНОВЕ МОНЕНЗИНА

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Монензин обладает широким спектром антикокцидийного действия, активен в отношении всех видов кокцидий (эймерий), паразитирующих у птиц, в том числе:

- *E. necatrix*
- *E. maxima*
- *E. praecox*
- *E. dispersa*
- *E. tenella*
- *E. mivati*
- *E. adenoides*
- *E. gallopavonis*
- *E. brunetti*
- *E. acervulina*
- *E. meleagrimitis*



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Цыплята-бройлеры	Профилактика кокцидиоза	в смеси с кормом	250 г/1 т корма (100 мг монензина натрия/1 кг корма)	С первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 5 дней до убоя
Ремонтный молодняк кур				С первого дня жизни, исключая из рациона не менее чем за 14 суток до начала яйцекладки

В составе комбикорма лекарственный препарат стабилен в течение 3 месяцев.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не применяется курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки.

Не допускается использование Мелазит 40% одновременно с другими антикокцидийными средствами. Запрещается применение препарата совместно с тиамулином, а также за 7 дней до начала и 7 дней после окончания его применения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 4 месяцев.



Никарзин®

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

250 мг никарбазин

 ПО РЕЦЕПТУ

20 кг



КОРМОВОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КОКЦИДИОЗА НА ОСНОВЕ НИКАРБАЗИНА

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Никарбазин активен в отношении всех видов кокцидий, паразитирующих у птиц, в том числе:

- **E. acervulina**
- **E. tenella**
- **E. maxima**
- **E. mitis**
- **E. necatrix**
- **E. brunetti**
- **E. mivati**
- **E. praecox**



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Цыплята-бройлеры	Профилактика кокцидиоза	в смеси с кормом	500 г/1 т корма (125 мг никарбазина/1 кг корма)	С первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 15 суток до убоя
Ремонтный молодняк кур				С первого дня жизни, исключая из рациона не менее чем за 14 суток до начала яйцекладки

В челночных программах профилактики кокцидиоза Никарзин целесообразно применять первые 3 недели выращивания цыплят-бройлеров перед использованием ионофорного кокцидиостатика.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не применяется курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки.

Не применять лекарственный препарат птицепоголовью при повышении температуры воздуха в помещении для содержания птиц выше зоогигиенических норм для соответствующих кроссов и возрастных групп птиц.

ОГРАНИЧЕНИЯ



15 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 4 месяцев.





Эймицид®

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

120 мг салиномицин

 ПО РЕЦЕПТУ

20 кг



КОРМОВОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
КОКЦИДИОЗА НА ОСНОВЕ САЛИНОМИЦИНА

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Салиномицин обладает широким спектром антикокцидийного действия, активен в отношении:

- *E. necatrix*
- *E. acervulina*
- *E. brunetti*
- *E. mivati*
- *E. mitis*
- *E. tenella*
- *E. maxima*
- *E. praecox*



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Цыплята-бройлеры	Профилактика кокцидиоза	в смеси с кормом	500 г/1 т корма (60 мг салиномицина натрия/1 кг корма)	С первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключая из рациона за 5 суток до убоя
Ремонтный молодняк кур				С первого дня жизни, исключая из рациона не менее чем за 14 суток до начала яйцекладки

В составе комбикорма лекарственный препарат стабилен в течение 3 месяцев.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не применяется курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки.

Не допускается применение лекарственного препарата Эймицид одновременно с другими антикокцидийными средствами, а также с сульфаниламидами, эритромицином, олеандомицином. Запрещается применять препарат совместно с тиамулином, а также за 7 суток до начала и 7 суток после окончания его применения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 3 месяцев.





АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

									
	КРС	Лошади	МРС	Свины	Собаки	Кошки	С/х птица	Другие	Стр.
Азитронит 	•		•	•					33
Амоксигард	•			•	•	•			35
Амоксигард WS				•			•		37
Амоксициллин 150	•		•	•	•	•			39
Амоксициллин Feed				•					41
Гатилон НОВИНКА				•			•		43
Дитрим	•	•		•	•				46
Дитрим порошок	•	•	•	•	•				48
Дитрим OR							•		50
Доксилоск	•		•	•					52
Доксилоск OR				•			•		54
Доксилоск WS				•			•		56
Колибак 6, 12				•			•		58
Лексофлон 	•			•					61
Лексофлон OR 				•			•		65
Неокальф НОВИНКА	•								70
Нитокс 200	•		•	•					72
Нитокс Форте	•			•					74
Нозифор 				•			•		77
Номицеф НОВИНКА	•			•					79
Пневмотил	•			•			•		81
Пневмотил Feed				•					83
Тиалонг				•					85
Тиалонг 45% WS				•			•		87
Тиалонг 80% Feed				•					90
Тилозин 50, 200	•		•	•	•	•			92
Тинивазол НОВИНКА				•			•		94
Тулатрин	•			•					96
Флорокс	•			•					99
Флорокс OR				•			•		101
Цефтонит	•			•					103
Цефтонит Форте	•								106
Энронит	•		•	•					109
Энронит OR				•			•		111



Азитронит® ХИТ

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг азитромицина дигидрат

ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

100 мл



ПЕРВЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ АНТИБИОТИК НА ОСНОВЕ АЗИТРОМИЦИНА¹ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И МЕТАФИЛАКТИКИ РЕСПИРАТОРНЫХ, ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ И ДРУГИХ ИНФЕКЦИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Антибиотик нового поколения;
- Целенаправленное действие²;
- Защищает до 7 дней после последней инъекции³;
- Улучшает состояние животного в первые 10-12 часов⁴.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Азитромицин, входящий в состав препарата Азитронит, относится к антибиотикам группы макролидов. Механизм действия азитромицина связан с торможением биосинтеза белка рибосомами бактерий. Азитромицин хорошо всасывается и быстро распределяется в тканях организма, достигая высоких концентраций, во много раз превышающих концентрацию в плазме крови.

САМЫЙ ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ!

Азитронит обладает широким спектром действия, подавляя больше чем 30 патогенов, что более чем в 2 раза шире спектра действия других современных макролидных препаратов.

Сравнение спектра действия азитромицина с другими известными макролидами

Микроорганизмы	Антибиотик			
	Азитромицин (Азитронит)	Гамитромицин	Тилдипрозин	Тулатромицин
Streptococcus pneumoniae ⁵				
Streptococcus pyogenes				
Staphylococcus aureus ⁶				
Enterococcus faecalis ⁷				
Actinobacillus spp.				
Haemophilus parasuis				
Haemophilus somnus				
Moraxella spp.				
Pasteurella spp.				
Clostridium spp.				
Bordetella spp.				
Mycoplasma spp.				
Chlamydia spp.				
Escherichia coli ⁸				
Salmonella spp.				
Listeria spp.				
Erysipelothrix isidiosa				
Campylobacter spp.				
Legionella				
Fusobacterium spp.				
Borrelia spp.				

Доказано воздействие более чем на 30 патогенов



- Серебряная медаль Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 2018г.

¹ Первый препарат на основе азитромицина в ветеринарной фармацевтике в РФ



для перехода на страницу продукта отсканируйте QR-код



видео о продукте Азитронит



видео о продуктах Азитронит и Флулекс





ВЫШЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КОРОЧЕ СРОКИ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Эффективность препарата Азитронит подтверждена испытаниями, в общей сложности, более чем на 700 головах сельскохозяйственных животных при различных заболеваниях.

Эффективность лечения респираторных заболеваний⁹

Диагноз	Вид животного	Действующее вещество, содержание, мг/мл	Улучшение состояния, часы	Срок выздоровления, дни
Острый бронхит	Телята	Азитромицин, 100	12-16	2,9±0,1
		Флорфеникол, 300	20-24	5,1±0,1
		Энрофлоксацин, 100	40-48	5,8±0,2

Эффективность лечения гастроэнтерита¹⁰

Диагноз	Вид животного	Заболевших голов, шт.	Выздоровевших голов (применили Азитронит, шт.)	Процент выздоровевших животных
Гастроэнтерит	Поросята	40	40	100%

Азитронит демонстрирует 100% эффективность, быстрое улучшение состояния и короткие сроки выздоровления

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Азитронит применяют крупному рогатому скоту, овцам и свиньям для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, пищеварительной и мочеполовой системы, а также инфекций кожи и мягких тканей, вызываемых микроорганизмами, чувствительными к азитромицину, для терапии некробактериоза, рожи свиней, спирохетоза и микоплазменных инфекций.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Дозировка	Способ и кратность введения	Длительность курса
КРС, овцы, свиньи	1 мл на 20 кг	Внутримышечно, 1 раз в 24 часа	2 дня, при необходимости инъекцию повторить

ОГРАНИЧЕНИЯ



40 суток - КРС, СВИНЬИ

35 суток - ОВЦЫ

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 30 суток.

² Проникает в клетки иммунной системы и с ними мигрирует в очаг воспаления

³ Проявляет антибиотическое действие за счёт высокой способности накапливаться в воспалённых тканях

⁴ Доказано на практике в ходе испытаний (благодаря своим уникальным свойствам, в т.ч. противовоспалительному и иммуномодулирующему действию)

⁵ Пенициллин-чувствительный

⁶ Метициллин-чувствительный

⁷ ATCC 29212

⁸ ATCC 25922

⁹ Эффективность препарата в описанном эксперименте изучалась на 105 головах телят чёрно-пёстрой породы, в возрасте от 2 до 5 месяцев, весом от 60 до 100 кг. Группы подбирались по принципу аналогов и являлись сопоставимыми, применение препаратов осуществлялось согласно инструкции.

¹⁰ Испытания проводились на 40 головах свиней белой породы, в возрасте от 1,5 до 2 месяцев, весом от 10 до 18 кг с диагнозом гастроэнтерит.

Амоксигард®

СУСПЕНЗИЯ, ИНЪЕКЦИОННО

140 мг амоксициллина тригидрат,
35 мг клавулановая кислота

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



НАДЁЖНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ НА ОСНОВЕ АМОКСИЦИЛЛИНА И КЛАВУЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К БЕТА-ЛАКТАМНЫМ АНТИБИОТИКАМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность терапии;
- Короткие сроки ограничения по молоку;
- «Новая жизнь» одного из самых востребованных антибиотиков.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксигард относится к антибактериальным препаратам фармакотерапевтической группы пенициллины в комбинациях.

Комбинация амоксициллина и клавулановой кислоты, входящих в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром бактерицидной активности против большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы продуцирующие β-лактамазу:

- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Corynebacterium spp.*
- *Clostridium spp.*
- *Bacillus spp.*
- *Bacillus anthracis*
- *Actinomyces spp.*
- *Actinomyces bovis*
- *Peptostreptococcus spp.*
- *Escherichia coli*
- *Salmonella spp.*
- *Bordetella spp.*
- *Bordetella bronchiseptica*
- *Campylobacter spp.*
- *Klebsiella spp.*
- *Proteus spp.*
- *Pasteurella spp.*
- *Fusobacterium spp.*
- *Fusobacterium necrophorum*
- *Bacteroides spp.*
- *Haemophilus spp.*
- *Moraxella spp.*
- *Actinobacillus spp.*
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Actinobacillus lignieresii*
- *Erysipelothrix spp.*
- *Erysipelothrix rhusiopathiae*
- *Listeria spp.*
- *Leptospira spp.*





ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Амоксигард применяют животным с лечебной целью при болезнях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к комбинации амоксициллина и клавулановой кислоты:

- крупному рогатому скоту - при респираторных, гинекологических (метриты и маститы), хирургических заболеваниях, в том числе инфекциях кожи и мягких тканей (абсцессы, флегмоны, фурункулез);
- свиньям - при колибактериозе, респираторных и послеродовых инфекционных заболеваниях.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Дозировка	Способ и кратность введения	Длительность курса
КРС, свиньи	1 мл на 20 кг	Внутримышечно, 1 раз в 24 ч	От 3 до 5 дней

Перед каждым использованием флакон с препаратом Амоксигард тщательно встряхивают до получения однородной суспензии.

Место инъекции после введения лекарственного препарата рекомендуется помассировать. Для введения лекарственного препарата используют только сухие шприцы и иглы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не следует применять Амоксигард одновременно с тиамфениколом, хлорамфениколом, антибиотиками группы пенициллина, цефалоспорины и фторхинолонами, а также смешивать в одном шприце с другими лекарственными препаратами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



42 суток - КРС
31 сутки - СВИНЬИ



108 часов

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

Амоксигард® WS

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

500 мг амоксициллина тригидрат,
125 мг клавулановая кислота

 ПО РЕЦЕПТУ

1 кг



КОМБИНИРОВАННЫЙ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПРЕПАРАТ НА
ОСНОВЕ АМОКСИЦИЛЛИНА И КЛАВУЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ, ПРЕ-
ОДОЛЕВАЮЩИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К БЕТА-ЛАКТАМАМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищенный комплекс клавулановой кислоты и амоксициллина;
- Наноструктура, сохраняющая активную форму действующих веществ;
- Расширенный спектр действия за счет синергизма компонентов.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комбинация амоксициллина и клавулановой кислоты, входящая в состав препарата, обладает широким спектром действия против большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы, продуцирующие В-лактамазу:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| • Escherichia coli | • Haemophilus spp. |
| • Salmonella spp. | • Streptococcus spp. |
| • Pasteurella spp. | • Klebsiella spp. |
| • Clostridium spp. | • Bacillus anthracis |
| • Staphylococcus spp. | • Campylobacter spp. |
| • Erysipelothrix rhusiopathiae | • Actinomyces (Corynebacterium) |
| • Bordetella bronchiseptica | pyogenes |

Клавулановая кислота инактивирует пенициллиназу пенициллинрезистентных микроорганизмов и, тем самым, восстанавливает чувствительность бактерий к бактерицидному действию амоксициллина.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Амоксигард WS назначают с лечебной и лечебно-профилактической целью свиньям и сельскохозяйственной птице при болезнях бактериальной этиологии, в том числе при колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, бронхопневмонии, некротическом энтерите, кампилобактериозе, стафилококкозе, гемофилезе, стрептококкозе, актинобациллярной плевропневмонии, атрофическом рините, мочеполовых инфекциях, инфекциях кожи и мягких тканей, вызываемых чувствительными к компонентам лекарственного препарата возбудителями.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Амоксигард WS применяют с лечебной целью перорально в течение 3-5 дней:

Вид	Способ применения	Дозировка	Курс лечения	Примечание
Птица	Перорально с водой для поения	4 г/100 кг массы птицы	3-5 дней	Полное растворение препарата происходит при разведении 20 г Амоксигард WS не менее чем в 7 л воды. В период лечения лечебный раствор должен быть единственным источником питья
Свиньи	Перорально с питьевой водой, молоком или кормом	0,8-2 г/100 кг массы животного	два раза в сутки 3-5 дней	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата Амоксигард WS курам-несушкам, яйца которых будут использоваться в пищевых целях, и ремонтному молодняку кур менее чем за 14 дней до начала яйцекладки, в связи с накоплением действующих веществ препарата в яйцах.

Не следует применять Амоксигард WS одновременно с другими препаратами группы пенициллина, хлорамфениколом, макролидами, сульфаниламидами и тетрациклинами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



7 суток - ПТИЦА,
3 суток - СВИНЬИ

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 7 суток.

Амоксициллин 150

СУСПЕНЗИЯ, ИНЪЕКЦИОННО

150 мг амоксициллина тригидрат

 ПО РЕЦЕПТУ

50 мл

100 мл

250 мл



ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ АМОКСИЦИЛЛИН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У КРС, МРС И СВИНЕЙ, С БОЛЕЕ ВЫГОДНОЙ СТОИМОСТЬЮ КУРСА ПО СРАВНЕНИЮ С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр антимикробного действия;
- Современная технология производства;
- Мгновенно ресуспензируется при встряхивании;
- Сниженная вязкость.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Амоксициллин 150 относится к антибактериальным препаратам группы полусинтетических пенициллинов.

Амоксициллина тригидрат, входящий в состав препарата, - полусинтетический антибиотик пенициллинового ряда, обладает широким спектром антимикробного действия, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:

- *Actinobacillus spp.*
- *Actinomyces spp.*
- *Bacillus spp.*
- *Bacillus anthracis*
- *Clostridium spp.*
- *Corynebacterium spp.*
- *Erysipelothrix rhusiopathiae*
- *Escherichia coli*
- *Haemophilus spp.*
- *Leptospira spp.*
- *Listeria spp.*
- *Listeria monocytogenes*
- *Pasteurella spp.*
- *Proteus spp.*
- *Proteus mirabilis*
- *Salmonella spp.*
- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Амоксициллин 150 применяют для лечения крупного рогатого скота, мелкого рогатого скота, свиней при болезнях бактериальной этиологии желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, мочеполовой системы, суставов, мягких тканей и кожи, некробактериозе, пупочных инфекциях, атрофическом рините, синдроме метрит-мастит-агалактия и других первичных и вторичных инфекциях, возбудители которых чувствительны к амоксициллину.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
КРС, МРС, свиньи	Внутримышечно или подкожно	1 мл/10 кг м. ж.	Однократно. При необходимости инъекцию повторяют через 48 часов

Перед каждым применением суспензию следует тщательно взболтать. В холодное время года лекарственный препарат перед введением необходимо подогреть до комнатной температуры (20-25 °С).

Максимальный объем введения лекарственного препарата Амоксициллин 150 в одно место не должен превышать для крупного рогатого скота - 20 мл, свиней - 10 мл, овец, коз, телят - 5 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Амоксициллин 150 не следует смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



28 суток



4 суток

СРОК ГОДНОСТИ

4 года со дня производства при соблюдении условий хранения, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

Амоксициллин Feed

 ПО РЕЦЕПТУ

ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

200 мг амоксициллина тригидрат

20 кг



КОРМОВОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ АМОКСИЦИЛЛИН НА МИНЕРАЛЬНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ СВИНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Производство из высококачественной субстанции;
- Выгодная концентрация амоксициллина;
- Удобные дозировки.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ) СВОЙСТВА

Амоксициллина тригидрат, входящий в состав лекарственного препарата, оказывает антимикробное действие в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая:

- *Actinomyces* spp.
- *Bacillus anthracis*
- *Clostridium* spp.
- *Corynebacterium* spp.
- *Erysipelothrix rhusiopathiae*
- *Listeria monocytogenes*
- *Staphylococcus* spp.
- *Escherichia coli*
- *Haemophilus* spp.
- *Pasteurella* spp.
- *Salmonella* spp.
- *Streptococcus* spp.
- *Actinobacillus* spp.
- *Proteus mirabilis*
- *Leptospira* spp.
- *Klebsiella* spp.
- *Bordetella* spp.
- *Mannheimia haemolytica*
- *Moraxella* spp.
- *Fusobacterium* spp.
- *Arcanobacterium* spp.
- *Campylobacter* spp.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Амоксициллин Feed применяют свиньям при бактериальных заболеваниях органов дыхания, мочеполовой системы, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, инфекций кожи и мягких тканей и других заболеваниях, вызванных чувствительными к амоксициллину микроорганизмами.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Амоксициллин Feed применяют подсосным пороссятам, пороссятам после отъема от свиноматки и в период доращивания, а также взрослым свиньям в смеси с кормом индивидуально или групповым способом в следующих дозах:

Показания	Способ применения	Дозировка	Курс применения
Лечение инфекций кожи и мягких тканей	Перорально	5-10 г препарата на 100 кг массы животного (10-20 мг амоксициллина тригидрата на 1 кг массы животного)	7-10 дней
Лечение заболеваний мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта			5-7 дней
Лечение заболеваний органов дыхания и стрептококковых инфекций		или 1-2 кг препарата на 1 т корма	10-14 дней

В целях предотвращения распространения заболеваний допускается назначение препарата в терапевтической дозе группе животных, контактирующей с больным животным и не имеющей клинических признаков заболевания.

Для обеспечения равномерного распределения препарата в корме используют ступенчатое смешивание. Рассчитанную дозу препарата Амоксициллин Feed смешивают с небольшим количеством корма (5-10% от общего объема) и затем, при тщательном перемешивании, вносят в конечный объем корма.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применять Амоксициллин Feed животным при повышенной индивидуальной чувствительности к пенициллиновым антибиотикам (в т. ч. в анамнезе), при тяжелых заболеваниях печени и почек.

Амоксициллин Feed разрешен для применения лактирующим самкам. В период беременности препарат применяют при необходимости под контролем ветеринарного врача на основании оценки отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

Лекарственный препарат Амоксициллин Feed запрещается применять одновременно с антибактериальными препаратами группы тетрациклинов, линкозамидами и макролидами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



8 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 3 месяца, в смеси с кормом - 3 месяца.

Гатилон®

НОВИНКА

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

100 мг гатифлоксацин

 ПО РЕЦЕПТУ

1 л

5 л



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая чувствительность полевых штаммов возбудителей АПП, бронхита и микоплазменных инфекций;
- Преодолевает резистентность к предыдущим поколениям фторхинолонов;
- Целенаправленно накапливается и длительно сохраняется в тканях дыхательной системы, что обеспечивает пролонгированный эффект;
- Эффективен при ротации с флорфениколами;
- Не снижает водопотребление животных.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ (БИОЛОГИЧЕСКИЕ) СВОЙСТВА

Гатифлоксацин, входящий в состав препарата, оказывает бактерицидное действие на аэробные грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, анаэробные и другие микроорганизмы:

- *Arcanobacterium* spp.
- *Bacillus* spp.
- *Corynebacterium* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Listeria* spp.
- *Listeria monocytogenes*
- *Staphylococcus* spp.
- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus* spp.
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus dysgalactiae*
- *Streptococcus suis*
- *Streptococcus uberis*
- *Acinetobacter* spp.
- *Actinobacillus* spp.
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Aeromonas* spp.
- *Borrelia* spp. (спирохеты)
- *Bordetella* spp.
- *Brachyspira* spp.
- *Brachyspira hyodysenteriae*
- *Brachyspira pilosicoli*.
- *Campylobacter* spp.
- *Citrobacter* spp.
- *Enterobacter* spp.
- *Escherichia coli*
- *Haemophilus* spp.
- *Haemophilus ducreyi*
- *Haemophilus influenzae*
- *Haemophilus parainfluenzae*
- *Klebsiella* spp.
- *Leptospira* spp.
- *Moraxella* spp.
- *Moraxella catarrhalis* β +/ β -
- *Morganella* spp.
- *Morganella morganii*
- *Neisseria* spp.
- *Pasteurella* spp.





- *Proteus* spp.
- *Proteus mirabilis*
- *Proteus vulgaris*
- *Providencia* spp.
- *Pseudomonas* spp.
- *Salmonella* spp.
- *Serratia* spp.
- *Bacteroides* spp.
- *Bacteroides fragilis*
- *Clostridium* spp.
- *Clostridium perfringens*
- *Fusobacterium* spp.
- *Peptostreptococcus* spp.
- *Chlamydia* spp.
- *Chlamydia pneumoniae*
- *Chlamydia psittaci*
- *Mycobacterium* spp.
- *Mycoplasma* spp.
- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Rickettsia* spp.
- *Ureaplasma* spp.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гатилон применяют свиньям, цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур для лечения бактериальных инфекций.

Свиньям – для лечения бактериальных заболеваний:

- органов дыхания (в т. ч. актинобациллярной плевропневмонии, энзоотической пневмонии, стрептококковой пневмонии);
- желудочно-кишечного тракта (в т. ч. сальмонеллеза, колибактериозе);
- мочеполовой системы;
- инфекций кожи и мягких тканей;
- при спирохетозе, стрептококкозе, псевдомонозе и микоплазменных инфекциях;
- других заболеваний, вызываемых чувствительными к гатифлоксацину возбудителями.

Цыплятам-бройлерам и ремонтному молодняку кур:

- при микоплазмозе;
- сальмонеллеза;
- колибактериозе;
- дизентерии;
- некротическом энтерите;
- псевдомонозе;
- кампилобактериозе;
- стафилококкозе;
- пастереллеза;
- других заболеваниях, вызванных чувствительными к гатифлоксацину возбудителями.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Свиньи Птица	Перорально индивидуально или групповым способом с водой для поения	0,1 мл препарата на 1 кг массы тела животного (10 мг гатифлоксацина на 1 кг массы тела животного)	Ежедневно в течение 2-3 дней. При сложных и сочетанных инфекциях возможно продление курса до 5 дней

В период лечения животные должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Гатилон не допускается одновременно применять с препаратами, содержащими цинк, магний, алюминий, железо, из-за возможного снижения адсорбции гатифлоксацина в желудочно-кишечном тракте животного.

Рекомендуемый промежуток времени между приемом гатифлоксацина и вышеперечисленными лекарственными средствами должен составлять не менее четырех часов.

Запрещается одновременное применение лекарственного препарата с глюкокортикоидами из-за повышения риска развития тендинита и/или разрыва сухожилий, с нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами из-за повышения риска побочных эффектов со стороны центральной нервной системы, а также с эритромицином из-за повышения риска нарушений ритма сердца.

При одновременном применении с антагонистами витамина К, например – варфарином, повышаются риски кровотечения. Учитывая это, необходимо осуществлять контроль показателей коагуляции.

ОГРАНИЧЕНИЯ



16 суток - ПТИЦА

14 суток - СВИНЬИ

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 30 суток.



Дитрим®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

200 мг сульфадимезин, 40 мг триметоприм

 ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл

100 мл



КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ, ЗАНИМАЮЩИЙ ЛИДИРУЮЩУЮ ПОЗИЦИЮ В РОССИИ И СНГ СРЕДИ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ТРИМЕТОПРИМА И СУЛЬФАДИМЕЗИНА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синергизм компонентов предотвращает развитие резистентности;
- Удвоенная сила противомикробного действия¹;
- Подходит для ротации с большинством современных антибиотиков.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дитрим активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. Спектр действия препарата охватывает:

- *E.coli*
- *Salmonella spp.*
- *Proteus spp.*
- *Bacillus anthracis*
- *Pasteurella spp.*
- *Haemophilus spp.*
- *Vibrio spp.*
- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Shigella spp.*
- *Corynebacterium spp.*
- *Klebsiella spp.*
- *Bordetella spp.*
- *Campylobacter spp.*
- *Enterobacter spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Дитрим назначают КРС, свиньям, лошадям и собакам для лечения бактериальных инфекций, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, возбудители которых чувствительны к сульфадимезину и триметоприму.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
КРС, свиньи	Внутримышечно в область шеи	1 мл/10 кг м. ж. один раз в сутки	3-7 суток. При тяжёлом течении болезни первые 2-3 дня препарат вводят дважды в сутки с интервалом 12 часов в той же дозе
Лошади	Внутривенно		

В связи с возможной болевой реакцией не следует вводить в одно место КРС, свиньям и лошадям более 10 мл препарата, поросётам и собакам – более 5 мл.

При применении в рекомендуемых дозах побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



¹ Применение двух действующих веществ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применять одновременно с препаратами п-аминобензойной кислоты (новокаином, прокаином, анестезином, бензокаином), а также смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

Запрещается применение препарата Дитрим животным в период беременности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



28 суток



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.



Дитрим® порошок

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

100 мг сульфадимезин, 20 мг триметоприм

 ПО РЕЦЕПТУ

500 г



КОМПЛЕКСНЫЙ АНТИМИКРОБНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ЖКТ И МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ У МОЛОДНЯКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Короткие сроки ограничения по мясу;
- Компоненты препарата обладают синергидным действием, предотвращая развитие устойчивости у микроорганизмов;
- Возможность задачи с водой и кормом;
- Широкий спектр антимикробной активности.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Входящие в состав лекарственного препарата сульфадимезин и триметоприм, обладая синергидным действием, усиливают действие друг друга путем последовательного воздействия на метаболизм п-аминобензойной и фолиевой кислот в микробной клетке, что обеспечивает широкий спектр антимикробной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая:

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • E.coli | • Staphylococcus spp. |
| • Clostridium spp. | • Streptococcus spp. |
| • Salmonella spp. | • Shigella spp. |
| • Proteus spp. | • Corynebacterium spp. |
| • Bacillus anthracis | • Klebsiella spp. |
| • Pasteurella spp. | • Fusobacterium spp. |
| • Haemophilus spp. | • Bordetella spp. |
| • Vibrio spp. | • Brucella spp. |

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Дитрим порошок назначают телятам, ягнятам, поросятам, жеребятam и собакам для лечения бактериальных инфекций органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, возбудители которых чувствительны к сульфадимезину и триметоприму.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Дозировка	Курс лечения
В смеси с кормом или суспендируя в небольшом количестве воды, молока или его заменителя. Индивидуально	1-ый день лечения – 5 г/10 кг м. ж. один раз в сутки; в последующие дни лечения – 2,5 г/10 кг м. ж.	3-5 дней. В тяжёлых случаях заболевания до 7 суток

Побочных явлений и осложнений при применении препарата Дитрим порошок, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к активным компонентам препарата и появлении побочных явлений (отказ от корма, рвота) использование препарата прекращают.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение беременным и лактирующим самкам.

Запрещается одновременное применение препарата Дитрим порошок с препаратами фолиевой кислоты, новокаина, анестезина и других производных пара-аминобензойной кислоты ввиду их антагонистического взаимодействия.

ОГРАНИЧЕНИЯ



7 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 60 суток.



Дитрим® OR

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

200 мг сульфадимезин, 40 мг триметоприм

 ПО РЕЦЕПТУ

1 л

5 л



КОМПЛЕКСНЫЙ ПЕРОРАЛЬНЫЙ РАСТВОР НА ОСНОВЕ СУЛЬФАДИМЕЗИНА И ТРИМЕТОПРИМА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПТИЦ ПРИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ И РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Компоненты препарата обладают синергидным действием, предотвращая развитие устойчивости у микроорганизмов;
- Широкий спектр антимикробной активности;
- Эффективен при кокцидиозе птиц;
- Подходит для ротации с препаратами на основе левофлоксацина.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дитрим OR относится к фармакотерапевтической группе - сульфаниламиды в комбинациях.

Входящие в состав препарата Дитрим OR сульфадимезин и триметоприм обладают синергидным действием, что обеспечивает широкий спектр бактериостатической активности в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| • <i>Escherichia coli</i> | • <i>Corynebacterium spp.</i> |
| • <i>Clostridium spp.</i> | • <i>Klebsiella spp.</i> |
| • <i>Salmonella spp.</i> | • <i>Fusobacterium spp.</i> |
| • <i>Proteus spp.</i> | • <i>Bordetella spp.</i> |
| • <i>Bacillus spp.</i> | • <i>Meningococcus spp.</i> |
| • <i>Pasteurella spp.</i> | • <i>Listeria spp.</i> |
| • <i>Neisseria spp.</i> | • <i>Nocardia spp.</i> |
| • <i>Neisseria gonorrhoeae</i> | • <i>Enterobacter spp.</i> |
| • <i>Neisseria meningitides</i> | • <i>Actinomyces spp.</i> |
| • <i>Haemophilus spp.</i> | • <i>Yersinia spp.</i> |
| • <i>Vibrio spp.</i> | • <i>Brucella spp.</i> |
| • <i>Staphylococcus spp.</i> | • <i>Coccidia</i> |
| • <i>Streptococcus spp.</i> | • <i>Toxoplasma gondii</i> |
| • <i>Shigella spp.</i> | |

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Дитрим OR назначают птице для лечения бактериальных инфекций органов дыхания и желудочно-кишечного тракта, возбудители которых чувствительны к сульфадимезину и триметоприму (в т.ч. пастереллеза, колибактериоза, сальмонеллеза, стафилококкоза и кокцидиоза).




ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Дитрим OR применяется перорально индивидуально или групповым способом с водой для поения птицы в следующих дозах:

ВИД ПТИЦЫ	ПРОБЛЕМАТИКА	ДОЗИРОВКА	КУРС ПРИМЕНЕНИЯ
Бройлер, ремонтный молодняк	Заболевания бактериальной этиологии	0,5-1 мл на 1 л воды или 1-2 мл на 16 кг массы птицы	3-5 дней
	Кокцидиоз	2 мл на 1 л воды	

В целях предотвращения распространения заболеваний допускается назначение препарата в терапевтической дозе группе птиц, контактирующей с больной птицей и не имеющей клинических признаков заболевания.

СПОСОБЫ ЗАДАЧИ ПРЕПАРАТА



Разведение препарата любым из способов должно соответствовать соотношению 1:50 и выше. Применение других соотношений может приводить к выпадению действующего вещества в осадок.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению лекарственного препарата является индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, тяжёлые функциональные нарушения печени и почек.

Запрещается применение препарата курам, яйца которых предназначены для применения в пищу, и ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки.

Запрещается одновременное применение лекарственного препарата Дитрим OR с бактерицидными антибиотиками (пенициллины, цефалоспорины), с витаминами группы В (никотинамид, фолиевая кислота, холин) и производными парааминобензойной кислоты, ввиду их антагонистического взаимодействия.

ОГРАНИЧЕНИЯ



7 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – не более 60 суток.



Доксилокс®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

200 мг доксициклин



ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



АНТИБИОТИК НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ТЕТРАЦИКЛИНОВ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И МЕТАФИЛАКТИКИ ПОСЛЕРОДОВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальный эффект с одной инъекции;
- Удобная дозировка свиньям 1 мл/20 кг;
- Высокая эффективность в борьбе с возбудителями хламидиоза и микоплазмоза.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доксициклин, входящий в состав препарата, относится к полусинтетическим антибиотикам третьего поколения тетрациклиновой группы. Механизм бактериостатического действия доксициклина связан с угнетением энзимов, что приводит к нарушению синтеза белка микробной клетки. Активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:

- *Escherichia coli*
- *Haemophilus spp.*
- *Pasteurella spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Leptospira spp.*
- *Chlamydia spp.*
- *Clostridium perfringens*
- *Listeria monocytogenes*
- *Corynebacterium pyogenes*
- *Rickettsia spp.*
- *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Доксилокс назначают крупному и мелкому рогатому скоту, свиньям с лечебной целью при инфекциях, вызванных чувствительными к доксициклину микроорганизмами, в том числе колибактериозе, сальмонеллезе, пастереллезе, энзоотической пневмонии свиней, хламидиозе, стафилококкозе, гемофилёзе и других заболеваниях бактериальной и микоплазменной этиологии.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
КРС, МРС	Внутримышечно	1 мл/10 кг м. ж.	Однократно. При необходимости инъекцию лекарственного препарата можно повторить через 48 часов
Свиньи		0,5 мл/10 кг м. ж.	



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



В связи с возможной болевой реакцией при введении лекарственного препарата в объеме, превышающем для поросят и ягнят 2,5 мл, взрослых свиней, овец и телят 5 мл, для крупного рогатого скота 10 мл, инъекции следует проводить дробно в несколько мест.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается применение лекарственного средства одновременно с антибиотиками групп пенициллинов и цефалоспоринов, а также препаратами кальция из-за возможного снижения его активности.

Запрещается применять в период беременности и лактационный период.

ОГРАНИЧЕНИЯ



21 сутки

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.



Доксилокс® OR

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

100 мг доксициклина гиклат

 ПО РЕЦЕПТУ

1 л

5 л



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ДОКСИЦИКЛИНА В ФОРМЕ ПЕРОРАЛЬНОГО РАСТВОРА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СВИНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая стабильность в жесткой воде;
- Антибиотик тетрациклинового ряда последнего поколения;
- Точность дозирования.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доксициклин, входящий в состав препарата, относится к полусинтетическим антибиотикам третьего поколения тетрациклиновой группы. Механизм бактериостатического действия доксициклина связан с угнетением энзимов, что приводит к нарушению синтеза белка микробной клетки. Активен против грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:

- *Escherichia coli*
- *Haemophilus spp.*
- *Pasteurella spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Clostridium spp.*
- *Chlamydia spp.*
- *Listeria spp.*
- *Leptospira spp.*
- *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Доксилокс OR назначают свиньям и птице с лечебной и лечебно-профилактической целью при колибактериозе, пастереллёзе, сальмонеллёзе, стафилококкозе, микоплазмозе, хронических респираторных заболеваниях бактериальной этиологии и других инфекциях, возбудители которых чувствительны к доксициклину.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Птица	Перорально	0,5-1 мл/1 л питьевой воды	3-5 дней
Свиньи		1 мл/10 кг м. ж.	5 дней

Препарат Доксилокс OR применяют индивидуально или групповым способом. При групповом способе применения свиньи и птица в период лечения должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Лечебный раствор препарата Доксилокс OR, рассчитанный



на потребление в течение суток, готовят ежедневно. При применении не использовать ржавые поилки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не применять с кортикостероидами и эстрогенами, а также миорелаксантами. Запрещается применение препарата Доксилос OR животным с печеночной недостаточностью, беременным и лактирующим самкам.

Препарат нельзя применять курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки.

ОГРАНИЧЕНИЯ



10 суток - СВИНЬИ,
6 суток - ПТИЦА

Не допускается применение в пищу яиц от птиц, которым проводилось лечение доксициклином.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.



Доксилокс® WS

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

500 мг доксициклина гиклат

 ПО РЕЦЕПТУ

1 кг



ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ДОКСИЦИКЛИН В ФОРМЕ ПОРОШКА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И МЕТАФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПТИЦ И СВИ-
НЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Представитель тетрациклинов последнего поколения;
- Выгодная стоимость курса;
- Удобный способ задачи поголовью.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доксициклин, входящий в состав препарата, является полусинтетическим антибиотиком тетрациклинового ряда и обладает широким спектром антибактериального действия в отношении многих микроорганизмов, в том числе:

- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
(в т. ч. *Streptococcus pneumoniae*)
- *Bacillus anthracis*
- *Listeria monocytogenes*
- *Clostridium spp.*
- *Neisseria gonorrhoeae*
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Escherichia coli*
- *Shigella spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Enterobacter spp.*
- *Klebsiella spp.*
- *Bordetella spp.*
- *Haemophilus spp.*
- *Pasteurella multocida*
- *Rickettsia spp.*
- *Treponema spp.*
- *Mycoplasma spp.*
- *Chlamydia spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Доксилокс WS назначают свиньям и сельскохозяйственной птице при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, в т.ч. пастереллезе, колибактериозе, сальмонеллезе, энзоотической пневмонии, микоплазмозе и других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к доксициклину.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Птица	Перорально	0,4 г/10 кг массы птицы	3-5 дней
Свиньи		0,2 г/10 кг массы животного	5 дней

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применять Доксилос WS лактирующим и беременным свиноматкам. Возможно применение молодняку под наблюдением ветеринарного врача, оценивая соотношение возможной пользы к возможному риску.

Доксилос WS нельзя применять одновременно с миорелаксантами, бактерицидными антибиотиками пенициллиновой и цефалоспориновой групп, антацидами, каолином, а также смешивать с минеральными добавками и лекарственными препаратами, содержащими соли кальция, магния, железа и алюминия ввиду возможного снижения антибактериальной активности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



8 суток - ПТИЦА,
12 суток - СВИНЬИ

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – 3 месяца.



Колибак® 6 и 12

 ПО РЕЦЕПТУ

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

6 000 000 МЕ колистина сульфат,
12 000 000 МЕ колистина сульфат

1 кг



ВОДОРАСТВОРИМЫЙ КОЛИСТИН В УДОБНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ ПТИЦ И СВИНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность при лечении колибактериоза, сальмонеллеза;
- Короткие сроки ограничения на убой;
- Хорошая растворимость в воде.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Колистина сульфат, входящий в состав лекарственных препаратов Колибак 6 и Колибак 12, оказывает антимикробное действие в отношении ряда грамотрицательных микроорганизмов, включая:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| • <i>E. coli</i> | • <i>Salmonella spp.</i> |
| • <i>Pseudomonas aeruginosa</i> | • <i>Shigella spp.</i> |
| • <i>Klebsiella spp.</i> | • <i>Pasteurella spp.</i> |
| • <i>Proteus spp.</i> | • <i>Enterobacter spp.</i> |
| • <i>Aerobacter aerogenes</i> | • <i>Haemophilus spp.</i> |



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТЕ ПОРОСЯТ¹




• Эффективность на 7% выше, чем у препарата-аналога (при этом при применении **Колибак 6 и 12** улучшение состояния и полное выздоровление поголовья наступают в среднем на 1 день быстрее, чем у препарата-аналога)




¹ На основе отчета об исследовании эффективности в условиях хозяйств

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ПРИ КОЛИБАКТЕРИОЗЕ ПОРОСЯТ, ОСЛОЖНЕННОМ САЛЬМОНЕЛЛЕЗОМ¹



· Эффективность Колибак® 6 и 12 на 7% выше, чем у препарата-аналога

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ КУР²



· Эффективность Колибак 6 и 12 на 2% выше, чем у препарата-аналога

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Колибак 6 и Колибак 12 применяют свиньям и сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта, возбудители которых чувствительны к колистину.

¹ На основе отчета об исследовании эффективности в условиях хозяйств

² На основе отчета об исследовании эффективности в условиях хозяйств



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Колибак 6

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Птица	Перорально	100-150 г/1000 л воды (125 мг/10 кг м.т. птиц)	3-5 дней
Свинья		120-160 мг/10 кг м.т.ж.	

Колибак 12

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Птица	Перорально	50-75 г/1000 л воды (62,5 мг/10 кг м.т. птиц)	3-5 дней
Свинья		60-80 мг/10 кг м.т.ж.	

В целях предотвращения распространения заболеваний допускается назначение препарата в терапевтической дозе группе животных, контактирующей с больным животным и не имеющей клинических признаков заболевания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Колибак 6 и Колибак 12 не следует применять одновременно с ампициллином, цефалоспориновыми и аминогликозидными антибиотиками, с миорелаксантами, так как колистин усиливает их действие, что увеличивает риск паралича дыхательной мускулатуры. Запрещается применять препараты совместно с препаратами кальция и магния.

ОГРАНИЧЕНИЯ



2 суток - СВИНЬИ,
6 суток - ПТИЦА

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – не более 20 суток.

Лексофлон®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

150 мг левофлоксацин

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



АНТИБИОТИК ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СВИНЕЙ И КРС С КОРОТКИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО МОЛОКУ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность применения стельным коровам;
- Альтернатива для ротации с цефалоспоридами;
- Преодолевает резистентность к энрофлоксацину.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левофлоксацин, входящий в состав препарата – антибиотик широкого спектра действия группы фторхинолонов, оказывающий бактерицидное действие на:

- *Enterococcus spp.*
- *Listeria monocytogenes*
- *Staphylococcus spp.*
- (в том числе *Staphylococcus aureus*)
- *Streptococcus spp.*
- *Acinetobacter spp.*
- *Campylobacter spp.*
- *Enterobacter spp.*
- *Escherichia coli*
- *Haemophilus ducreyi*
- *Haemophilus influenzae*
- *Haemophilus parainfluenzae*
- *Klebsiella spp.*
- *Moraxella catarrhalis* β +/ β -
- *Morganella morganii*
- *Pasteurella spp.*
- *Proteus mirabilis*
- *Proteus vulgaris*
- *Providencia spp.*
- *Pseudomonas spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Serratia spp.*
- *Bacteroides fragilis*
- *Clostridium perfringens*
- *Fusobacterium spp.*
- *Peptostreptococcus*
- *Chlamydia pneumoniae*
- *Chlamydia psittaci*
- *Mycobacterium spp.*
- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Rickettsia spp.*

Концентрация левофлоксацина в крови находится выше МИК спустя более чем 20 часов, что обеспечивает высокую эффективность лечения



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Лексофлон



- Бронзовая медаль Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 2018г.






Лексофлон высокоэффективен при лечении острого эндометрита коров



- Срок выздоровления короче на 1 день



- Эффективность выше на 10%

Эффективность Лексофлон при катаральной бронхопневмонии телят



- Эффективность составляет 88%


Лексофлон обеспечивает более быстрое выздоровление при бронхите телят




- Срок выздоровления короче на 2 дня



Эффективность лечения Лексофлон на 20% превосходит терапию эндометрита энрофлоксацином у свиноматок



- Срок выздоровления короче на 2 дня




- Эффективность выше на 20%



Лексофлон высокоэффективен при катаральной бронхопневмонии поросят



Лексофлон обеспечивает быстрое выздоровление и высокую эффективность при гастроэнтерите поросят



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Лексофлон применяют крупному рогатому скоту и свиньям для лечения бактериальных заболеваний органов дыхания, пищеварительной системы, акушерско-гинекологических заболеваний – метритов и маститов, послеродовых инфекций у свиноматок (метрит, мастит, агалактия), хирургических заболеваний и инфекций мягких тканей (таких как абсцессы, флегмоны), вызываемых чувствительными к левофлоксацину возбудителями, в том числе колибактериоза, пастереллеза, сальмонеллеза, стафилококкоза и микоплазменных инфекций.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
КРС	Внутримышечно	1 мл/30 кг м. т. ж.	Ежедневно в течение 3-5 дней
Свинья			



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается одновременное применение лекарственного препарата с глюкокортикоидами из-за повышения риска развития тендинита и/или разрыва сухожилий, с тетрациклинами и макролидами из-за повышения токсического эффекта левофлоксацина, а также свиньям совместно с нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами. Не рекомендуется применение левофлоксацина одновременно с этанолом.

Самкам в период беременности и вскармливания потомства препарат применяют при необходимости под контролем ветеринарного врача на основании оценки отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



9 суток



4 дня

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия - 28 суток.

Лексофлон® ОР

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

150 мг левофлоксацин

 ПО РЕЦЕПТУ

1 л

5 л



ПЕРВЫЙ ЛЕВОФЛОКСАЦИН В ВЕТЕРИНАРИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Преодолевает резистентность к энрофлоксацину и предыдущим поколениям фторхинолонов;
- Устойчив к развитию резистентности¹;
- Эффективен при смешанных инфекциях;
- Обеспечивает быстрое восстановление продуктивности.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левофлоксацин, входящий в состав препарата – антибиотик широкого спектра действия группы фторхинолонов, оказывающий бактерицидное действие на аэробные грамположительные микроорганизмы, аэробные грамотрицательные микроорганизмы, анаэробные и другие микроорганизмы.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

Аэробные грамположительные микроорганизмы

Enterococcus spp.	Staphylococcus spp.
Listeria monocytogenes	Streptococcus spp.

Аэробные грамотрицательные микроорганизмы

Acinetobacter spp.	Morganella morganii
Campylobacter spp.	Pasteurella spp.
Enterobacter spp.	Proteus mirabilis
Escherichia coli	Proteus vulgaris
Haemophilus ducreyi	Providencia spp.
Haemophilus influenzae	Pseudomonas spp.
Haemophilus parainfluenzae	Salmonella spp.
Klebsiella spp.	Serratia spp.
Moraxella catarrhalis β +/ β -	

Анаэробные микроорганизмы

Bacteroides fragilis	Fusobacterium spp.
Clostridium perfringens	Peptostreptococcus

Другие микроорганизмы

Chlamydia pneumoniae	Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia psittaci	Rickettsia spp.
Mycobacterium spp.	



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



- Лучший продукт Международной выставки «AgroFarm» 2016г.


- Бронзовая медаль Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 2018г.

¹В сравнении с препаратами на основе энрофлоксацина



**ЛЕКСОФЛОН OR – РЕШЕНИЕ ВАЖНЕЙШЕЙ ПРОБЛЕМЫ**

95% птицефабрик
используют фторхинолоны
(в т.ч. энрофлоксацин)



из использующих
фторхинолоны
28% отмечают развитие
резистентности


Лексофлон OR - препарат нового поколения, способный преодолевать резистентность микроорганизмов к фторхинолонам предыдущих поколений, в том числе к энрофлоксацину

ПРЕОДОЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ (практика in vivo)

Оценка терапевтической эффективности препарата Лексофлон OR в сравнении с зарубежным препаратом на основе энрофлоксацина.

Для проведения эксперимента в 14-дневном возрасте птицу заражали энтеропатогенными штаммами *Escherichia coli*, резистентными к энрофлоксацину. Аналогичный эксперимент проводился на птице, зараженной другими культурами: *Salmonella* spp., *Pseudomonas* spp. и др.

Сохранность птиц на конец эксперимента



Штаммы, используемые для заражения в эксперименте, **проявляли резистентность к энрофлоксацину**, этим объясняются одинаковые результаты в группах «Без лечения» и «Лечение зарубежным препаратом на основе 10% энрофлоксацина».

Даже в этих условиях терапевтическая **эффективность Лексофлон OR** составляет **93,3%**.

ЛЕЧЕНИЕ респираторных и желудочно-кишечных заболеваний поросят

Колиэнтерит (*Escherichia coli*)



- Терапевтическая эффективность выше на 20%


Смешанная кишечная инфекция (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Proteus* spp.)



- Терапевтическая эффективность выше на 20%


Escherichia coli и *Salmonella* spp. - основные бактериальные патогены для молодняка свиней, проявляющие устойчивость к энрофлоксацину. Таким образом, применение Лексофлон ОР дает возможность эффективно бороться с бактериальной инфекцией, преодолевая резистентность к предыдущим поколениям фторхинолонов.

Колиэнтерит (*Escherichia coli*)



- Срок выздоровления на 2 суток короче

Смешанная кишечная инфекция (*Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Proteus* spp.)



- Срок выздоровления на 2 суток короче

ЛЕЧЕНИЕ респираторных заболеваний поросят




- Лексофлон OR обеспечивает сохранность на 99,2%²

² Испытания проводились на поросятах в возрасте 36-100 дней

**ПРЕОДОЛЕНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ (практика in vitro)**

Наибольшее количество чувствительных штаммов культур микроорганизмов³ выявлено к препарату Лексофлон OR



Лексофлон OR - более эффективное уничтожение патогенов при меньших концентрациях в сравнении с препаратами на основе энрофлоксацина



1	E. coli 6179 - O20
2	E. coli 294 - O157
3	E. coli 211
4	E. coli 990 - O86
5	E. coli 1414
6	E. coli 814
7	E. coli 726 - O78
8	Salmonella spp. 1
9	Salmonella spp. 2

10	Salmonella spp. 3
11	Enterobacter agglomerans
12	Enterobacter cloacae
13	Staphylococcus spp. K437
14	Staphylococcus spp. K185
15	Staphylococcus spp. 11
16	Staphylococcus spp. 48
17	Staphylococcus aureus P6538

Минимальная подавляющая концентрация **Лексофлон OR** ниже (более эффективное уничтожение патогенов), чем у препаратов на основе энрофлоксацина

³ Escherichia coli, Salmonella spp., Enterobacter agglomerans, Staphylococcus spp., Staphylococcus aureus

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Лексофлон ОР применяют птице при колибактериозе, дизентерии, некротическом энтерите, псевдомонозе, кампилобактериозе, стафилококкозе, пастереллезе.

Лексофлон ОР применяют свиньям для лечения бактериальных заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы, инфекций кожи и мягких тканей, вызываемых чувствительными возбудителями, а также спирохетоза и микоплазменных инфекций.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Свинья, птица	Перорально, индивидуально или групповым способом с водой для поения	1 мл/20 кг м. ж. (7,5 мг левофлоксацина/ 1 кг массы животного)	Ежедневно в течение 3-5 дней

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Лекарственный препарат не применяется супоросным и лактирующим свиноматкам, а также новорожденным пороссятам, курам-несушкам и ремонтному молодняку кур менее чем за 10 суток до начала яйцекладки, в связи с накоплением левофлоксацина в яйце.

Запрещается одновременное применение лекарственного препарата с глюкокортикоидами из-за повышения риска развития тендинита и/или разрыва сухожилий, а также нестероидными противовоспалительными лекарственными средствами, тетрациклинами и макролидами из-за повышения токсического эффекта левофлоксацина.

ОГРАНИЧЕНИЯ



7 суток - ПТИЦА,
9 суток - СВИНЬИ



10 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия - не более 30 суток.



Неокальф®

НОВИНКА

СУСПЕНЗИЯ, ПЕРОРАЛЬНО

54 мг нитазоксанид, 600 000 МЕ колистина сульфат



ПО РЕЦЕПТУ

500 мл

НОВЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ НИТАЗОКСАНИДА И КОЛИСТИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЯТ ПРИ ДИАРЕЕ, ВЫЗВАННОЙ КРИПТОСПОРИДИЯМИ, КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКОЙ, САЛЬМОНЕЛЛОЙ, А ТАКЖЕ КЛОСТРИДИЯМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективен против всех актуальных возбудителей диареи телят в неонатальный период;
- Активен против клостридий, в отличие от других препаратов, применяемых против криптоспоридий;
- Отсутствует резистентность к нитазоксаниду;
- Удобен в применении: индивидуальный дозатор;
- Безопасен с первых дней жизни.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нитазоксанид, входящий в состав препарата, прототип тиазолидов, является антипротозойным и антигельминтным средством для перорального введения. Проявляет антибактериальную активность в отношении *Clostridium* spp. Активен в отношении:

- | | | |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| • <i>Cryptosporidium</i> spp. | • <i>Clostridium</i> spp. | • Strongylidae |
| • <i>Ancylostomatidae</i> | • <i>Haemonchus</i> | • <i>Trichomonas vaginalis</i> |
| • <i>Entamoeba histolytica</i> | • <i>Nematodirus</i> | • <i>Trichostrongylus</i> |
| • <i>Giardia</i> spp. | • <i>Ostertagia</i> | |

Колистина сульфат, входящий в состав препарата, относится к группе полипептиды и активен в отношении ряда грамотрицательных микроорганизмов:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| • <i>E. coli</i> | • <i>Haemophilus</i> spp. | • <i>Pseudomonas aeruginosa</i> |
| • <i>Salmonella</i> spp. | • <i>Klebsiella</i> spp. | • <i>Shigella</i> spp. |
| • <i>Aerobacter aerogenes</i> | • <i>Pasteurella</i> spp. | |
| • <i>Enterobacter</i> spp. | • <i>Proteus</i> spp. | |

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Неокальф применяют телятам, в том числе в неонатальный период, с лечебной целью при криптоспориidioзе, клостридиозе, сальмонеллёзе, колибактериозе, а также при других болезнях ЖКТ, возбудители которых чувствительны к нитазоксаниду и колистину.

Перед применением препарат тщательно взболтать в течение 30 секунд.




ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Телята	для лечения криптоспориديоза	однократно перорально индивидуально с помощью дозатора или с индивидуальной порцией молока, молозива, ЗЦМ, воды	1-2 мл на 10 кг массы тела животного	3-5 дней
	для лечения смешанных инфекций		2 мл на 10 кг массы тела животного	

При задаче телятам препарата Неокальф в смеси с молоком, молозивом, ЗЦМ или водой необходимо тщательно перемешать смесь непосредственно перед задачей.

1 НАЖАТИЕ ДОЗАТОРА = 5 МЛ



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, а также тяжелые поражения печени и почек.

При передозировке лекарственного препарата может наблюдаться беспокойство, дезориентация, потеря аппетита, тошнота, диарея.

Следует соблюдать осторожность при одновременном применении Неокальф с препаратами, действующие вещества которых имеют высокую степень связывания с белками по причине конкуренции в этом случае с нитазоксанидом (например, варфарин). Рекомендуемый интервал между применением вышеперечисленных лекарственных средств и препаратом Неокальф должен составлять не менее двух часов.

ОГРАНИЧЕНИЯ



13 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.



Нитокс® 200 **ХИТ**

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

200 мг окситетрациклин

 ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл

100 мл



САМЫЙ ПРИМЕНЯЕМЫЙ¹ ПРЕПАРАТ ПРОЛОНГИРОВАННОГО
ОКСИТЕТРАЦИКЛИНА НА ОСНОВЕ МАГНИЕВОГО КОМПЛЕКСА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованная технология производства, позволяющая добиться высокого качества;
- Курс лечения - 1 инъекция;
- Доверие профессионалов в области ветеринарии;
- Выгодная стоимость лечения.




для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нитокс 200 относится к антибактериальным лекарственным препаратам. Окситетрациклин, входящий в состав препарата, действует бактериостатически на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе:

- | | |
|--------------------|------------------|
| • стрептококки | • сальмонеллы |
| • стафилококки | • псевдомонады |
| • коринебактерии | • актинобактерии |
| • клостридии | • эшерихии |
| • эризипелотрикссы | • хламидии |
| • пастереллы | • риккетсии |
| • фузобактерии | • спирохеты |

Введение одной дозы обеспечивает эффективную концентрацию в плазме крови в течение 3-4 дней, что в большинстве случаев достаточно для проведения курса лечения



¹ По данным исследований консалтинговой компании CONCOL



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нитокс 200 применяют крупному, мелкому рогатому скоту и свиньям для лечения инфекционных заболеваний, вызванных чувствительными к окситетрациклину возбудителями, в том числе: респираторные заболевания бактериальной этиологии, пастереллез, атрофический ринит, энзоотический аборт, мастит, синдром ММА, кератоконъюнктивит, копытная гниль, гнойный артрит, пупочный сепсис, абсцесс, перитонит, раневые и послеродовые инфекции, анаплазмоз, а также вторичные инфекции при вирусных заболеваниях.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Дозировка и способ введения	Длительность курса
КРС, МРС, свиньи	1 мл на 10 кг, глубоко внутримышечно	Однократно, при необходимости повторить через 72 ч.

Максимальная доза для введения в одну точку тела: крупному рогатому скоту – 20 мл, мелким животным – 5-10 мл. Если объем вводимого раствора более указанного, его следует вводить животным в несколько мест.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Лекарственный препарат нельзя применять одновременно с кортикостероидами и эстрогенами. В связи с выраженным снижением антибактериального эффекта окситетрациклина препарат не рекомендуется применять одновременно с антибиотиками пенициллинового и цефалоспоринового ряда.

ОГРАНИЧЕНИЯ



28 суток



7 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия флакона – не более 28 суток.



Нитокс® Форте

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

300 мг окситетрациклин, 20 мг флуниксин меглумин

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



СУПЕРПРОЛОНГИРОВАННЫЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ ОКСИТЕТРАЦИКЛИН, УСИЛЕННЫЙ НПВС, ДЛЯ КРС И СВИНЕЙ С ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ 5 ДНЕЙ С ОДНОЙ ИНЪЕКЦИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сверхдолгое действие 5 дней обеспечивает удобство лечения;
- Быстрый лечебный эффект в течение первого часа;
- Восстановление продуктивных качеств в течение 12 часов;
- НПВС в составе препарата повышает эффективность антибиотикотерапии.


ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нитокс Форте относится к группе комбинированных антибактериальных препаратов. Окситетрациклин, антибиотик из группы тетрациклинов, входящий в состав препарата, действует бактериостатически на большинство грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе:

- | | |
|--------------------|------------------|
| • стрептококки | • сальмонеллы |
| • стафилококки | • псевдомонады |
| • коринебактерии | • актинобактерии |
| • клостридии | • эшерихии |
| • эризипелотрикссы | • хламидии |
| • пастереллы | • риккетсии |
| • фузобактерии | • спирохеты |

При внутримышечном введении окситетрациклин быстро всасывается из места инъекции и достигает максимальных концентраций в органах и тканях через 30-50 минут после введения.

Особая форма препарата обеспечивает его **длительное действие** в течение **5 дней** и антибактериальную активность против широкого спектра возбудителей.



Флуниксин оказывает вспомогательное действие, увеличивающее эффективность терапии окситетрациклином.


Концентрация флуниксина резко нарастает и достигает своего максимума в течение первого часа после инъекции, после чего обеспечивает противовоспалительное и жаропонижающее действие в течение 12 часов, продолжительностью до 24 часов.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код




ПОЛНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ С ОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



Проведенные клинические испытания Нитокс Форте при лечении острого трахеобронхита телят, осложненного гастроэнтеритом, показали высокие результаты. После однократного применения Нитокс Форте **выздоровление** наблюдалось в течение **3 дней** после одной инъекции. **В течение первых суток** отмечалось **исчезновение клинических симптомов** и улучшение аппетита. Препараты сравнения применялись двукратно, при этом выздоровление наступало на сутки дольше.

ПРИМЕНЕНИЕ НИТОКС ФОРТЕ СВИНОМАТКАМ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СПОСОБСТВУЕТ СОХРАННОСТИ ПОРОСЯТ

При применении схемы **Нитокс Форте и Утеротон** сохранность поросят на **5%** превосходит монотерапию.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нитокс Форте применяют крупному рогатому скоту и свиньям для лечения острых и хронических заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, пастереллеза, перитонита, гнойного артрита, операционных, раневых инфекций, кератоконъюнктивитов, копытной гнили, анаплазмоза, синдрома ММА свиноматок и других первичных и вторичных инфекций бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к тетрациклинам.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Дозировка и способ введения	Длительность курса
КРС, свиньи	1 мл на 10 кг м. ж., глубоко внутримышечно	1 введение (однократное)

В случае необходимости и при хроническом течении болезни допускается повторное введение через 5 суток.

Максимальная доза для введения в одно место для взрослых животных - 10 мл, для молодняка - 5 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказаниями к применению является повышенная индивидуальная чувствительность животного к антибиотикам тетрациклинового ряда и/или нестероидным противовоспалительным средствам. Запрещается внутривенное или внутриартериальное введение Нитокс Форте, его применение при сердечной, печеночной или почечной недостаточности и животным, больным микозами, а также дойным коровам, молоко которых используется в пищевых целях.

ОГРАНИЧЕНИЯ



35 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки - не более 28 суток.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Не следует использовать автоматические инъекторы и многоразовые шприцы с комплектующими из поливинилхлорида для применения Нитокс Форте, так как компоненты препарата могут на них воздействовать.

Промывание многоразовых шприцев и инъекторов этиловым спиртом 95% сразу после их использования снижает вероятность негативного воздействия компонентов препарата на комплектующие. Для этого шприц или инъектор необходимо полностью заполнить спиртом и оставить на 5-10 минут, затем удалить спирт из инструмента.

Нозифор®

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

10 мг нозигептид

 ПО РЕЦЕПТУ

10 кг

20 кг



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоактивен против клостридий, стрептококков и стафилококков;
- Эффективен против резистентных штаммов микроорганизмов;
- Кормовой термостабильный препарат.



ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нозифор относится к антибактериальным препаратам группы полипептидов. Нозигептид, входящий в состав лекарственного препарата, оказывает антимикробное действие в отношении грамположительных микроорганизмов, включая:

- **Clostridium perfringens**
- **Streptococcus spp.**
- **Staphylococcus spp.**

В настоящее время штаммов микроорганизмов, резистентных к нозигептиду, не выделено.

Механизм действия препарата заключается в нарушении синтеза белка в клетках чувствительных микроорганизмов, что в конечном итоге приводит к их гибели.

После перорального применения препарата нозигептид не всасывается в желудочно-кишечном тракте, не накапливается в органах и тканях, выводится из организма в неизменном виде.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ОСОБЕННОСТЬ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ НОЗИГЕПТИДА

Нозифор (нозигептид) имеет уникальный механизм действия на бактериальную клетку.

Препарат взаимодействует с компонентами микроорганизма в местах, расположенных далеко от «традиционного» участка ингибирования синтеза белка другими антибактериальными средствами, поэтому перекрестной устойчивости у Нозифор с другими препаратами не наблюдается¹.



- Гран-при выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария 2022»

¹ Harms J.M., Wilson D.N., Schluenzen F., Connell S.R., Stachelhaus T., Zaborowska Z., Spahn C.M., Fucini P. Translational regulation via L11: molecular switches on the ribosome turned on and off by thiostrepton and micrococcin // Mol Cell. 2008. T. 30. № 1. — С. 26-38.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания к применению	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Птица	При отсутствии клинических признаков заболеваний желудочно-кишечного тракта, но при обнаружении в помете чувствительных к нозигептиду микроорганизмов	в смеси с кормом	250 г/тону корма	10-14 дней
	При видимых клинических признаках заболеваний желудочно-кишечного тракта		500 г/тону корма	
Свиньи	При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, вызванных чувствительными к нозигептиду микроорганизмами			

В целях предотвращения распространения заболеваний допускается назначение препарата в терапевтической дозе группе животных, контактирующей с больным животным и не имеющей клинических признаков заболевания.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОПУЛЯРНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОТНОШЕНИИ КЛОСТРИДИЙ

Тестовые действующие вещества	Минимальная подавляющая концентрация (МПК), мкг/мл	
	стандартный штамм <i>C. perfringens</i> CVCC52	полевой штамм <i>C. perfringens</i> JAGC002
Нозигептид	0,05	0,005
Энрамицин	0,6	0,05
Вирджиниамицин	1	2
Авиламицин	10	5
Цинк Бацитрацин	10	>20

- Нозифор (нозигептид) наиболее активен из распространённых кормовых препаратов в отношении клостридий, согласно наименьшей МПК

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применять **Нозифор** животным при повышенной индивидуальной чувствительности к полипептидным антибиотикам, при тяжелых заболеваниях печени и почек. Препарат не применяется беременным и лактирующим самкам, а также курам-несушкам.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – не более 60 суток.

Номицеф®

НОВИНКА

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

25 мг цефкином

ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ИНЪЕКЦИОННЫЙ ЦЕФКИНОМ ОТ КЛЮЧЕВОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - КАЧЕСТВО МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Короткие сроки ограничения на молоко и мясо;
- Широкий спектр действия, эффективный при ротации антибиотиков;
- Доступность современных решений.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефкинома сульфат - цефалоспорин четвертого поколения, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе:

- *Escherichia coli*
- *Citrobacter spp.*
- *Klebsiella spp.*
- *Mannheimia haemolytica*
- *Pasteurella multocida*
- *Proteus spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Serratia marcescens*
- *Histophilus somni*
- *Arcanobacterium pyogenes*
- *Bacillus spp.*
- *Corynebacterium spp.*
- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Bacteroides spp.*
- *Clostridium spp.*
- *Fusobacterium spp.*
- *Prevotella spp.*
- *Actinobacillus spp.*
- *Erysipelothrix rhusiopathiae*,

включая штаммы, продуцирующие β -лактамазу.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Номицеф назначают крупному рогатому скоту для лечения респираторных заболеваний; пальцевого дерматита, инфекционного бульбарного некроза и острого межпальцевого некробактериоза (копытной гнили); острого мастита; эшерихиоза (колибактериоза) телят.

Свиньям препарат назначают для лечения бактериальных инфекций легких и респираторного тракта, синдрома ММА (мастит-метрит-агалактия), менингита, артрита и дерматита (в том числе эпидермита).





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Номицеф вводят животным внутримышечно один раз в сутки в течение 2-5 дней, в дозах, указанных в таблице.

Вид животного	Показания	Дозировка	Курс применения
КРС	Респираторные заболевания, пальцевый дерматит, инфекционный бульбарный некроз и острый межпальцевый некробактериоз (копытная гниль)	1 мг цефкином/1 кг массы животного (1 мл препарата/ 25 кг массы животного)	3-5 дней
	Острый мастит		2 дня
	Эшерихиоз телят (колибактериоз)	2 мг цефкином/1 кг массы животного (2 мл препарата/ 25 кг массы животного)	3-5 дней
Свиньи	Бактериальные инфекции легких и респираторного тракта		3 дня
	Синдром ММА (мастит-метрит-агалактия)	2 мг цефкином/1 кг массы животного (2 мл препарата/ 25 кг массы животного)	2 дня
	Менингит, артрит, дерматит (в том числе эпидермит)		5 дней

Рекомендуется вторую и последующие инъекции делать в различные места. Перед каждым использованием, флакон с препаратом следует тщательно встряхнуть.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата, а также к другим β -лактамным антибиотикам.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток - КРС,
3 суток - СВИНЬИ



1 сутки

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

Пневмотил®

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

250 мг тилмикозина фосфат

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл

1 л



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Направленное действие и длительная защита благодаря концентрации в клетках иммунной системы;
- Преодолевают резистентность к предыдущим поколениям макролидов;
- Высокоэффективен против микоплазм;
- Сбалансирован для разведения в воде;
- Высокая стабильность в жесткой воде.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилмикозина фосфат, входящий в состав препарата, относится к антибиотикам группы макролидов, активен в отношении большинства грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов, в том числе:

- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Pasteurella spp.*
- *Clostridium spp.*
- *Arcanobacterium spp.*
(*Corynebacterium*)
- *Brachyspira hyodysenteriae*
- *Chlamydia spp.*
- *Spirochaeta spp.*
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Mannheimia haemolytica*
- *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Пневмотил назначают с лечебной целью свиньям при респираторных болезнях, вызванных *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*; сельскохозяйственной птице при инфекциях, вызванных *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida*, телятам при респираторных болезнях, вызванных *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma dispar*, а также при смешанных инфекциях, вторичных инфекциях при вирусных болезнях и других заболеваниях животных, возбудители которых чувствительны к тилмикозину.






ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс применения
Птица	групповым способом, с водой для поения	3 мл/10 л воды или 0,06-0,08 мл/1 кг массы птицы	3-5 дней подряд
Свиньи	индивидуально или групповым способом, с водой для поения	8 мл/10 л воды или 0,6-0,8 мл/10 кг м. ж.	
Телята	индивидуально с водой для поения или заменителем молока	0,5 мл/10 кг м. ж. два раза в день	

Лечебный раствор препарата Пневмотил в период лечения цыплят и поросят должен являться единственным источником питьевой воды.

Лечебный раствор готовят ежедневно (срок хранения не более 24 часов).

Схема фагоцитоза лейкоцитами, обогащёнными **тилмикозином**.



Уникальные фармакокинетические свойства препарата Пневмотил позволяют применять его при различных респираторных заболеваниях.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается применение препарата Пневмотил с антибиотиками аминогликозидного ряда, ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений (диарея, анорексия, парезы, нефротоксические эффекты).

В целях предотвращения адсорбции и снижения антибактериальной активности лекарственное средство не следует применять одновременно с препаратами и кормовыми добавками, содержащими бентонит.

Не допускается применение препарата Пневмотил взрослым жвачным с развитым рубцовым пищеварением, животным с выраженными нарушениями функции печени и (или) почек. Запрещается применение препарата Пневмотил курам-несушкам, ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста в связи с накоплением тилмикозина фосфата в яйцах.

ОГРАНИЧЕНИЯ



16 суток - СВИНЬИ, ПТИЦА,
35 суток - ТЕЛЯТА

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 3-х месяцев.

Пневмотил® Feed

ГРАНУЛЫ, ПЕРОРАЛЬНО

200 мг тилмикозина фосфат

ПО РЕЦЕПТУ

10 кг



ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИЙ АНТИБИОТИК В ФОРМЕ ГРАНУЛ С ПОКРЫТИЕМ, МАСКИРУЮЩИМ ВКУС, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СВИНЕЙ, НЕ СНИЖАЮЩИЙ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОРМА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Накапливается в очагах воспаления, повышая эффективность лечения;
- Термостабильная форма продукта;
- Равномерность распределения препарата в корме;
- Стабильность гранул к механическому воздействию обеспечивает низкий индекс пылеобразования.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилмикозин, входящий в состав лекарственного препарата, активен в отношении многих грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе:

- *Streptococcus spp.*
- *Staphylococcus spp.*
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Pasteurella multocida*
- *Mycoplasma spp.*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Пневмотил Feed применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью молодняку и взрослым свиньям при респираторных инфекциях, вызываемых *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyorheumoniae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Arcanobacterium pyogenes* и другими микроорганизмами, чувствительными к тилмикозину.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс применения
Поросята и взрослые свиньи	в смеси с кормом	1-2 кг на 1 т корма (0,075-0,1г/1 кг м. ж.)	7-10 дней в зависимости от тяжести заболевания

Для обеспечения равномерного распределения суточную дозу Пневмотил Feed смешивают с небольшим количеством корма (20-50 кг) и затем, при тщательном перемешивании, вносят в конечный объем корма.

Лекарственный препарат стабилен в смеси с кормом в течение 3 месяцев при температуре хранения не выше 25°C.





ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к тилмикозину.

Препарат не рекомендуется применять одновременно с другими макролидными антибиотиками и бактерицидными препаратами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



14 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки - не более 3-х месяцев.

Тиалонг®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг тиамулина гидроген фумарат

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МИКОПЛАЗМОЗОВ И БРОНХОПНЕВМОНИИ У СВИНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое проникновение в ткани;
- Избирательно накапливается в легких и тканях;
- Высокая эффективность против микоплазм и спирохет;
- Длительная и гарантированная защита за счет липофильности препарата.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тиамулин, входящий в состав лекарственного препарата, обладает бактериостатической активностью, подавляя синтез белка микробной клетки на рибосомальном уровне, и проявляет высокую активность в отношении микоплазм, а также:

- | | |
|------------------------------|--|
| • <i>M. hyopneumoniae</i> | • <i>Corynebacterium pyogenes</i> |
| • <i>M. hyorhinis</i> | • <i>Clostridium</i> spp. |
| • <i>M. hyosynoviae</i> | • <i>Lawsonia intracellularis</i> |
| • <i>B. hyodysenteriae</i> | • <i>Bacteroides</i> spp. |
| • <i>B. pilosicoli</i> | • <i>Fusobacterium</i> spp. |
| • <i>Staphylococcus</i> spp. | • <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> |
| • <i>Streptococcus</i> spp. | • <i>Pasteurella multocida</i> |

Не действует на бактерии семейства Enterobacteriaceae, в т.ч. *Salmonella* spp. и *Escherichia coli*.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Тиалонг назначают свиньям с лечебной целью при дизентерии, энзоотической пневмонии, плевропневмонии и инфекционных артритах.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат Тиалонг вводят свиньям внутримышечно один раз в сутки в следующих дозах:

Показания	Дозировка, курс
Дизентерия, вызванная <i>B.hydysenteriae</i> , в том числе осложненная <i>Bacteroides</i> spp. или <i>Fusobacterium</i> spp.	8 мг тиамулина основания на 1 кг м. ж., что соответствует 1 мл препарата на 12,5 кг м. ж., в течение 1-2 дней
Энзоотическая пневмония, вызванная <i>M.hyopneumoniae</i> , в том числе осложненная <i>Pasteurella multocida</i> или <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> , и инфекционные артриты, вызванные <i>M.hyosynoviae</i>	12,3 мг тиамулина основания на 1 кг м. ж., что соответствует 1,5 мл препарата на 12,5 кг м. ж., в течение 3 дней
Плевропневмония, вызванная <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i>	12,3 мг тиамулина основания на 1 кг м. ж., что соответствует 1,5 мл препарата на 12,5 кг м. ж., в течение 2-3 дней

В связи с возможной болевой реакцией при введении препарата в объеме, превышающем для взрослых свиней 5 мл и для поросят - 2,5 мл, инъекции следует проводить в несколько мест.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается применение препарата Тиалонг совместно с полиэфирными ионофорами, в т.ч. монензином, наразином и салиномицином, а также на протяжении 7 дней до и 7 дней после применения указанных лекарственных средств ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений, которые могут привести к значительному замедлению роста и гибели животных.

ОГРАНИЧЕНИЯ



16 дней

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

Тиалонг® 45% WS

ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

450 мг тиамулина гидроген фумарат

 ПО РЕЦЕПТУ

1 кг



ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОРОШОК НА ОСНОВЕ ТИАМУЛИНА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И МЕТАФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОГО-
ЛОВЬЯ ПТИЦ И СВИНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрая задача с водой;
- Высокая эффективность при спирохетозе, клостридиозе, микоплазмозе и илеите.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тиамулин, входящий в состав препарата - антибиотик широкого спектра действия группы плевромугилинов, активен в отношении:

- *Mycoplasma hyopneumoniae*
- *M. hyorhinis*
- *M. hyosynoviae*
- *M. synoviae*
- *M. gallisepticum*
- *M. meleagridis*
- *M. iowae*
- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus* spp.
- *Clostridium perfringens*
- *Corynebacterium* spp.
- *Erysipelothrix* spp.
- *Listeria* spp.
- *Pasteurella multocida*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Actinobacillus* spp.
- *Fusobacterium necrophorum*
- *Bacteroides* spp.
- *Campylobacter* spp.
- *Lawsonia intracellularis*
- *Brachyspira hyodysenteriae*
- *Br. innocens*
- *Br. pilosicoli*
- *Br. suis*
- *Br. intermedia*
- *Arcanobacterium* spp.
- *Haemophilus* spp.
- *Ornithobacterium rhinotracheale*
- *Leptospira* spp.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тиалонг 45% WS назначают:

- свиньям при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии (энзоотической пневмонии, актинобациллярной плевропневмонии, пролиферативной энтеропатии (илеите), колите (вызванном *Br. Pilonicoli*), дизентерии), при микоплазменных артритах, для предупреждения вторичных бактериальных заболеваний при вирусных инфекциях, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к тиамулину.
- птице при микоплазменных инфекциях, вызванных *M. gallisepticum* и *M. synoviae*, для предупреждения вторичных бактериальных заболеваний при вирусных инфекциях, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к тиамулину.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





Допускается назначение препарата в целях предотвращения распространения заболеваний животных и птицы, контактирующих с больным животным и птицей и не имеющих клинических признаков заболевания.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тиалонг 45% WS применяют свиньям и птице с водой для поения индивидуально или групповым способом.

Лечебный раствор готовят ежедневно, он должен быть единственным источником питьевой воды для птиц и свиней. Лечебный раствор препарата стабилен в течение 24 часов.



Для лечения бактериальных инфекций свиней препарат применяют по схеме, представленной в таблице 1.

Перед применением рассчитывают суточную норму потребления воды свиньями и готовят раствор препарата Тиалонг 45% WS необходимой концентрации по тиамулину гидроген фумарату. Для приготовления 0,006% раствора тиамулина 1 г препарата Тиалонг 45% WS растворяют в 7,5 л воды; для 0,012% раствора – 1 г растворяют в 3,75 л воды; для 0,018% раствора – 1 г растворяют в 2,5 л воды.

Таблица 1

Показания	Дозировка	Курс применения
Дизентерия, в том числе осложненная <i>Fusobacterium</i> spp. и <i>Bacteroides</i> spp.	0,016 - 0,02 г/кг (7,3-9 мг тиамулина гидроген фумарата/кг) массы животного. Потребление животными суточной дозы обеспечивается выпаиванием 0,006 % раствора тиамулина гидроген фумарата.	3-5 дней
Пролиферативная энтеропатия (илеит), вызванная <i>Lawsonia intracellularis</i> и колит, вызванный <i>Br. pilosicoli</i>		5 дней
Энзоотическая пневмония, вызванная <i>M. hyophneumoniae</i> , в том числе осложненная <i>P. multocida</i> и <i>A. pleuropneumoniae</i>	0,033-0,045 г/кг (15-20 мг тиамулина гидроген фумарата/кг) массы животного. Потребление животными суточной дозы обеспечивается выпаиванием 0,012-0,018% раствора тиамулина гидроген фумарата.	5-10 дней
Плевропневмония, вызванная <i>A. pleuropneumoniae</i>	0,045 г/кг (20 мг тиамулина гидроген фумарата/кг) массы животного. Потребление животными суточной дозы обеспечивается выпаиванием 0,018% раствора тиамулина гидроген фумарата.	5-7 дней

В целях предотвращения распространения заболеваний животных, контактирующих с больным животным, но не имеющих клинических признаков заболевания, допускается назначение препарата в терапевтических дозах не более 10 дней.



При микоплазменных инфекциях кур, вызванных *M. gallisepticum* и *M. synoviae*, Тиалонг 45% WS применяют по схеме, представленной в Таблице 2.

Перед применением рассчитывают суточную норму потребления воды птицей и готовят раствор Тиалонг 45% WS необходимой концентрации.

Для приготовления 0,025% раствора тиамулина 1,1 г препарата Тиалонг 45% WS растворяют в 2 л воды; для 0,0125% раствора – 1,1 г растворяют в 4 л воды.

Таблица 2

Возрастная группа	Дозировка	Курс применения
-------------------	-----------	-----------------

С лечебной целью препарат применяют:

Бройлеры, ремонтный молодняк кур и родительское поголовье	0,067-0,11 г/кг (30-50 мг тиамулина гидроген фумарата/кг) массы птицы*	3-5 дней
---	--	----------

В целях предотвращения распространения заболеваний птиц, контактирующих с больной птицей, но не имеющих клинических признаков заболевания**:

Цыплята	0,28-0,33 г/кг (125-150 мг тиамулина гидроген фумарата/кг) массы птицы	с первых дней жизни в течение 3-х дней
Бройлеры с 4-й недели жизни	0,067-0,11 г/кг (30-50 мг тиамулина гидроген фумарата/кг) массы птицы	1-3 дня каждую 3-4 неделю жизни
Ремонтный молодняк	0,067-0,10 г/кг (30-45 мг тиамулина гидроген фумарата/кг) массы птицы	1-3 дня каждую 4-6 неделю жизни
Родительское поголовье	0,056 г/кг (25 мг тиамулина гидроген фумарата/кг) массы птицы	1 раз в месяц по 3 дня подряд

* Потребление птицей суточной дозы обеспечивается выпаиванием 0,025% раствора тиамулина гидроген фумарата.

** Потребление птицей суточной дозы обеспечивается выпаиванием 0,0125-0,025% раствора тиамулина гидроген фумарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки, ввиду накопления тиамулина в яйцах. Самкам в период беременности и вскармливания потомства препарат применяют при необходимости под контролем ветеринарного врача на основании оценки отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

Запрещается одновременное применение лекарственного препарата совместно с монензином, салиномицином, наразином и другими ионофорными кокцидиостатиками, антибиотиками аминогликозидного ряда, а также на протяжении 7 дней до и 7 дней после применения указанных лекарственных препаратов, ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений (диарея, анорексия, парезы, нефротоксические эффекты и др.).

ОГРАНИЧЕНИЯ



7 суток - СВИНЬИ,
6 суток - ПТИЦА

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия - 4 месяца.



Тиалонг® 80% Feed

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

800 мг тиамулина гидроген фумарат

 ПО РЕЦЕПТУ

10 кг



КОРМОВОЙ ТЕРМОСТАБИЛЬНЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ТИАМУЛИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И МЕТАФИЛАКТИКИ ДИЗЕНТЕРИИ И РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ В СВИНОВОДСТВЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность при спирохетозе, клостридиозе, микоплазмозе и илеите;
- Доступное лечение.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тиамулин, входящий в состав препарата - антибиотик широкого спектра действия группы плевромугилинов, активен в отношении:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • <i>Mycoplasma</i> spp. | • <i>Fusobacterium</i> spp. |
| • <i>Mycoplasma gallisepticum</i> | • <i>Fusobacterium necroforum</i> |
| • <i>M. hyopneumoniae</i> | • <i>Haemophilus</i> spp. |
| • <i>M. hyorhinis</i> | • <i>Klebsiella pneumoniae</i> |
| • <i>M. hyosynoviae</i> | • <i>Lawsonia intracellularis</i> |
| • <i>M. iowae</i> | • <i>Leptospira</i> spp. |
| • <i>M. meleagridis</i> | • <i>Listeria</i> spp. |
| • <i>M. synoviae</i> | • <i>Pasteurella</i> spp. |
| • <i>Actinobacillus</i> spp. | • <i>Pasteurella multocida</i> |
| • <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> | • <i>Staphylococcus</i> spp. |
| • <i>Arcanobacterium</i> spp. | • <i>Staphylococcus aureus</i> |
| • <i>Bacteroides</i> spp. | • <i>Streptococcus</i> spp. |
| • <i>Campylobacter</i> spp. | • <i>Brachyspira hyodysenteriae</i> |
| • <i>Clostridium</i> spp. | • <i>Br. innocens</i> |
| • <i>Clostridium perfringens</i> | • <i>Br. intermedia</i> |
| • <i>Corynebacterium</i> spp. | • <i>Br. pilosicoli</i> |
| • <i>Erysipelothrix</i> spp. | • <i>Br. suis</i> |

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тиалонг 80% Feed назначают свиньям при респираторных и желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии (энзоотической пневмонии, актинобациллярной плевропневмонии, пролиферативной энтеропатии (илеите), колите, вызванном *Br. Pilosicoli* (кишечном спирохетозе), дизентерии), при микоплазменных артритах, для предупреждения вторичных бактериальных заболеваний при вирусных инфекциях, а также при других заболеваниях, возбудители которых чувствительны к тиамулину.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тиалонг 80% Feed применяют свиньям с кормом индивидуально или групповым способом:

Показания	Дозировка	Курс применения
При актинобациллярной плевропневмонии	250 г препарата на 1 т корма из расчета 10 мг тиамулина гидроген фумарата на 1 кг массы животного	10 дней
При энзоотической пневмонии	125 г препарата на 1 т корма из расчета 5 мг тиамулина гидроген фумарата на 1 кг массы животного	10 дней
	200 г препарата на 1 т корма из расчета 8 мг тиамулина гидроген фумарата на 1 кг массы животного	5 дней
При дизентерии, в том числе осложненной <i>Fusobacterium spp.</i> и <i>Bacteroides spp.</i> , колит, вызванный <i>Br. pilosicoli</i>	125 г препарата на 1 т корма из расчета 5 мг тиамулина гидроген фумарата на 1 кг массы животного	7 дней
	200 г препарата на 1 т корма из расчета 8 мг тиамулина гидроген фумарата на 1 кг массы животного	3 дня
При пролиферативной энтеропатии	125 г препарата на 1 т корма из расчета 5 мг тиамулина гидроген фумарата на 1 кг массы животного	14 дней
	187 г препарата на 1 т корма из расчета 7,5 мг тиамулина гидроген фумарата на 1 кг массы животного	10 дней

В целях предотвращения распространения заболеваний животных, контактирующих с больным животным, но не имеющих клинических признаков заболевания, допускается назначение препарата в терапевтических дозах не более 14 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается одновременное применение лекарственного препарата совместно с монензином, салиномицином, наразином и другими ионофорными кокцидиостатиками, антибиотиками аминогликозидного ряда, а также на протяжении 7 дней до и 7 дней после применения указанных лекарственных препаратов, ввиду возможного возникновения у животных побочных явлений и осложнений (диарея, анорексия, парезы, нефротоксические эффекты и др.).

ОГРАНИЧЕНИЯ



6 суток

СРОК ГОДНОСТИ

4 года со дня производства, после вскрытия упаковки - 4 месяца.



Тилозин 50 и 200 ХИТ

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

50 МГ И 200 МГ ТИЛОЗИН СООТВЕТСТВЕННО

20 мл

50 мл

50 мл

100 мл

100 мл

 ПО РЕЦЕПТУ

ТРАДИЦИОННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ С ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ТИЛОЗИНА В ВИДЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ ПРИ БОЛЕЗНЯХ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ, ЛИДЕР ПРОДАЖ СРЕДИ ИНЪЕКЦИОННЫХ МАКРОЛИДНЫХ АНТИБИОТИКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Тилозин основание обладает большей стабильностью и эффективностью в отличие от тилозина тартрата;
- Один из наиболее безопасных антибиотиков;
- Обладает хорошей переносимостью;
- Экономически выгодная стоимость курса лечения;
- Короткие сроки ограничения по мясу и молоку.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилозин 50 и Тилозин 200 относятся к антибактериальным препаратам группы макролидов. Тилозин оказывает бактериостатическое действие, подавляя белковый синтез в бактериальных клетках. Тилозин активен против грамположительных и некоторых грамотрицательных бактерий, в том числе:

- **E.coli.**
- **Bacillus anthracis**
- **Pasteurella spp.**
- **Haemophilus spp.**
- **Leptospira spp.**
- **Staphylococcus spp.**
- **Streptococcus spp.**
- **Erysipelothrix spp.**
- **Corynebacterium spp.**
- **Mycoplasma spp.**
- **Chlamydia spp.**
- **Treponema spp.**
- **Brachyspira**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тилозин 50 и Тилозин 200 применяют для лечения:

- Бронхопневмонии крупного и мелкого рогатого скота, свиней, собак и кошек;
- Маститов крупного рогатого скота;
- Энзоотической пневмонии, артрита, дизентерии, атрофического ринита свиней;
- Инфекционной агалактии овец и коз;
- Вторичных инфекций при вирусных заболеваниях.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тилозин 50 и Тилозин 200 вводятся только внутримышечно 1 раз в сутки 5-7 дней подряд. При повторном применении необходимо менять место инъекции. Рекомендуемые дозы из расчёта на 1 кг массы животного.

Вид животного	Тилозин 50	Тилозин 200
Крупный рогатый скот, телята	0,1-0,2 мл	0,025-0,05 мл
Свиньи	0,2 мл	0,05 мл
Овцы, козы	0,2-0,24 мл	0,05-0,06 мл
Собаки, кошки	0,1-0,2 мл	0,025-0,05 мл

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не рекомендуется одновременное применение с тиамулином, клиндамицином, левомицетином, пенициллинами (особенно с ампициллином и оксациллином), цефалоспоринами и линкомицином в связи с выраженным снижением антибактериального эффекта тилозина.

ОГРАНИЧЕНИЯ



8 суток



4 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки - не более 28 суток.



Тинивазол® **НОВИНКА**

МИКРОГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

330 мг тилвалозина тартрат

1 кг



МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ТИЛВАЛОЗИН — СОВРЕМЕННЫЙ МАКРОЛИД С ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ДЕЙСТВИЯ, ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ МИКОПЛАЗМ, СПИРОХЕТ И ЛАВСОНИЙ, С МИНИМАЛЬНЫМИ СРОКАМИ ОГРАНИЧЕНИЙ В УДОБНОЙ ДОЗИРОВКЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая проникаемость во внутриклеточное пространство;
- Удобная задача с водой или кормом;
- Термостабильный гранулят;
- Преодолевает резистентность к другим макролидам.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тилвалозина тартрат, входящий в состав препарата, активен в отношении грамположительных и некоторых грамотрицательных микроорганизмов и микоплазм:

- *Staphylococcus aureus*
- *Enterococcus spp.*
- *Clostridium pefringens*
- *Brachyspira hyodysenteriae*
- *Brachyspira pilosicoli*
- *Lawsonia intracellularis*
- *Ornithobacterium rhinotracheale*
- *Mycoplasma gallicepticum*
- *Mycoplasma synoviae*
- *Mycoplasma meleagridis*
- *Mycoplasma hyopneumoniae*
- *Mycoplasma hyosynoviae*
- *Mycoplasma hyorhinis*

Действует бактериостатически, блокируя белковый синтез микробной клетки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тинивазол применяют бройлерам и ремонтному молодняку кур при микоплазмозе и орнитобактериозе и других первичных и вторичных заболеваниях дыхательной системы и ЖКТ бактериальной этиологии, возбудители которой чувствительны к тилвалозину; свиньям — при энзоотической пневмонии, пролиферативной энтеропатии, дизентерии и других первичных и вторичных заболеваниях дыхательной системы и ЖКТ бактериальной этиологии, возбудители которой чувствительны к тилвалозину.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка
Цыплята-бройлеры, ремонтный молодняк кур	Индивидуально или групповым способом с водой для поения или с кормом	45-75 мг/1 кг массы тела птицы в сутки (15-25 мг тилвалозина тартрата/1 кг массы тела птицы в сутки)
Свиньи		7,5-15 мг/1 кг массы тела животного в сутки (2,5-5 мг тилвалозина тартрата/1 кг массы тела животного в сутки)

В период лечения животные должны получать только корм, содержащий лекарственный препарат (в случае задачи через корм), или только воду, содержащую лекарственный препарат (в случае задачи через воду).

Для обеспечения равномерного распределения лекарственного препарата в корме используют двухступенчатое смешивание: рассчитанное количество препарата смешивают с небольшим количеством (до 10% от суточного потребления) комбикорма, а затем при тщательном перемешивании вносят в оставшийся объём комбикорма.

Лечебный раствор готовят ежедневно в объеме, рассчитанном на потребление животными в течение суток.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается одновременно применять с другими макролидами, а также с бактерицидными препаратами в связи с возможным взаимным снижением противомикробной активности.

Препарат не применяется курам-несушкам, а также ремонтному молодняку кур менее чем за 2 недели до начала яйцекладки, в связи с накоплением тилвалозина в яйцах.

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам лекарственного препарата, выраженная печеночная и/или почечная недостаточность.

Супоросным и лактирующим свиноматкам, препарат применяется при необходимости под контролем ветеринарного врача на основании оценки отношения ожидаемой пользы к возможному риску его применения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



3 суток - СВИНЬИ, ПТИЦА

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки хранению не подлежит.



Тулатрин®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг тулатромицин

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ СВЕРХПРОЛОНГИРОВАННЫЙ МАКРОЛИД НА ОСНОВЕ ТУЛАТРОМИЦИНА ДЛЯ КОНТРОЛЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У КРС И СВИНЕЙ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимум эффективности при метафилактике;
- Одна инъекция - весь курс применения;
- Период защиты до 15 дней;
- Высокая концентрация в легких.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тулатрин – антибактериальный лекарственный препарат, относится к группе макролидов.

Тулатромицин – действующее вещество препарата – обладает широким спектром действия в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе и в отношении:

- | | |
|---|---|
| • <i>Pasteurella</i> spp. | • <i>Moraxella</i> spp. |
| • <i>Mannheimia</i> (<i>Pasteurella</i>) <i>haemolytica</i> | • <i>Moraxella</i> <i>bovis</i> |
| • <i>Pasteurella</i> <i>multocida</i> | • <i>Neisseria</i> spp. |
| • <i>Haemophilus</i> spp. | • <i>Streptococcus</i> spp. |
| • <i>Haemophilus</i> <i>somnus</i> | • <i>Staphylococcus</i> spp. |
| • <i>Haemophilus</i> <i>parasuis</i> | • <i>Staphylococcus</i> <i>aureus</i> |
| • <i>Mycoplasma</i> spp. | • <i>Bordetella</i> spp. |
| • <i>Mycoplasma</i> <i>bovis</i> | • <i>Bordetella</i> <i>bronchiseptica</i> |
| • <i>Mycoplasma</i> <i>hyopneumoniae</i> | • <i>Enterococcus</i> spp. |
| • <i>Mycoplasma</i> <i>bovigenitalium</i> | • <i>Enterococcus</i> <i>faecalis</i> |
| • <i>Actinobacillus</i> spp. | • <i>Enterobacter</i> spp. |
| • <i>Actinobacillus</i> <i>pleuropneumoniae</i> | • <i>Enterobacter</i> <i>agglomerans</i> |

Механизм бактериостатического действия тулатромицина основан на подавлении белкового синтеза на рибосомальном уровне.

Тулатромицин быстро всасывается из места инъекции, достигая пика концентрации в плазме крови через 30 минут после введения, и медленно выводится из организма. Препарат накапливается в нейтрофилах и альвеолярных макрофагах, в результате чего достигается повышенная концентрация тулатромицина в легких.




для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



ЗАЩИТА ОТ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ КРС

После однократной инъекции Тулатрин способен обеспечивать высокую терапевтическую концентрацию в легочной ткани более чем 15 дней. При этом его концентрация в средостенных лимфоузлах у крупного рогатого скота даже на 19-й день после инъекции находится на уровне, превышающем минимальную ингибирующую концентрацию для основных респираторных патогенов в несколько раз.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тулатрин назначают:

- крупному рогатому скоту для лечения бактериальных инфекций, вызываемых *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus* и *Mycoplasma bovis*, *Mycoplasma bovis genitalium*, *Enterococcus faecalis*, *Enterobacter agglomerans*, *Staphylococcus aureus*, инфекционного кератоконъюнктивита, вызываемого *Moraxella bovis*, *Neisseria* spp., и других заболеваний, возбудители которых чувствительны к тулатромицину;
- свиньям при бактериальных инфекциях, вызываемых *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus parasuis*, *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Bordetella bronchiseptica*, *Streptococcus* spp., и других заболеваний, возбудители которых чувствительны к тулатромицину;
- в целях предотвращения распространения заболеваний допускается назначение препарата в терапевтической дозе группе животных, контактирующей с больным животным и не имеющей клинических признаков заболевания.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс применения
КРС	Подкожно	1мл/40 кг м.т.ж.	Однократно
Свинья	Внутримышечно		



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применять Тулатрин животным при повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата, а также дойным коровам, молоко которых используют в пищевых целях.

Препарат запрещается применять стельным коровам и телкам менее чем за 2 месяца до ожидаемого срока отела, если молоко планируется использовать в пищевых целях. Возможность применения препарата самкам в период беременности и вскармливания приплода определяет лечащий ветеринарный врач на основании оценки отношения пользы к возможному риску применения препарата.

В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

Тулатрин не рекомендуется применять одновременно с другими макролидами и линкозамидами, а также смешивать в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



49 суток - КРС*,

33 суток - СВИНЬИ

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

* При условии зачистки (выбраковки) места инъекции (диаметр 15 см, глубина 2,5 см). При отсутствии возможности определения точной локализации места инъекции, убой крупного рогатого скота разрешается не ранее 55 суток после применения препарата.

Флорокс

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

300 мг флорфеникол

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ОДИН ИЗ САМЫХ ДОСТУПНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ФЛОРФЕНИКОЛА НА РЫНКЕ РФ И СТРАН СНГ, ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ТЕЛЯТ И ПОРОСЯТ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Флорфеникол разработан специально для ветеринарии;
- Снижение потерь молодняка и сохранение привесов за счет быстрого действия препарата;
- Повышенная биодоступность.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флорфеникол, входящий в состав препарата, обладает бактериостатическим действием и активен в отношении бактерий, которые вырабатывают ацетилтрансферазу, и являются устойчивыми к хлорамфениколу. Флорфеникол обладает широким спектром антибактериального действия, в том числе в отношении:

- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
(в т. ч. *Streptococcus pneumoniae*)
- *Escherichia coli*
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Pasteurella spp.*
(в т. ч. *Pasteurella multocida*)
- *Bordetella bronchiseptica*
- *Haemophilus spp.*
(в т. ч. *Haemophilus parasuis*,
Haemophilus somnus)
- *Fusobacterium necrophorum*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Moraxella bovis*
а также микоплазм:
- *M. hyopneumoniae*
- *M. hyorhinis*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Флорокс назначают свиньям и крупному рогатому скоту для лечения заболеваний бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к флорфениколу.

- Свиньи: болезни органов дыхания, в том числе плевропневмония, вызванная *Actinobacillus pleuropneumoniae* и/или *Haemophilus parasuis*, *Pasteurella multocida*, *M. hyopneumoniae*, *M. hyorhinis* и атрофический ринит.
- Крупный рогатый скот: болезни органов дыхания, вызванные *Pasteurella multocida*, *Klebsiella pneumoniae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus somnus*, некробактериоз, инфекционный кератоконъюнктивит, вызванный *Moraxella bovis*.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка	Курс лечения
КРС	Внутримышечно	1 мл/15 кг м. ж. (флорфеникола 20 мг/кг м. ж.)	Двукратно с интервалом 48 часов
	Подкожно	2 мл/15 кг м. ж. (флорфеникола 40 мг/кг м. ж.)	Однократно
Свиньи	Внутримышечно в область шеи	1 мл/20 кг м. ж. (флорфеникола 15 мг/кг м. ж.)	Двукратно с интервалом 48 часов

Максимальный объём введения препарата Флорокс в одно место животному не должен превышать 10 мл.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата беременным и лактирующим самкам.
Не допускается одновременное применение препарата Флорокс с тиамфениколом и хлорамфениколом, а также смешивание его в одном шприце с другими лекарственными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



34 суток - КРС (в/м),
42 суток - КРС (п/к),
14 суток - СВИНЬИ

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки - не более 30 суток.

Флорокс ОР

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

100 мг флорфеникол

 ПО РЕЦЕПТУ

1 л

5 л



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ РАСТВОР НА ОСНОВЕ ФЛОРФЕНИКОЛА С ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ В ЛЕЧЕНИИ РЕСПИРАТОРНЫХ И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПТИЦ И СВИНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не забивает поилки¹;
- Начинает действовать через 10 минут;
- Высокоэффективен при сальмонеллезе, колибактериозе, пастереллезе птиц и при плевропневмонии свиней².



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Флорфеникол обладает широким спектром антибактериального действия, в том числе в отношении:

- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Escherichia coli*
- *Proteus spp.*
- *Enterobacter spp.*
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Pasteurella spp.*
- *Shigella spp.*
- *Bordetella bronchiseptica*
- *Haemophilus spp.*
- *Fusobacterium necrophorum*
- *Bacteroides melaninogenicus*
- *Klebsiella pneumoniae*
- *Ornithobacterium rhinotracheale*
- *Micrococcus spp.*
- *Mycoplasma spp.*
- *Moraxella spp.*

Биодоступность флорфеникола после перорального введения составляет у свиней 88%, у птиц – 55%. Максимальная концентрация антибиотика в сыворотке крови достигается через 1 час и поддерживается в организме на терапевтическом уровне в течение 24 часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Флорокс ОР применяют свиньям:

- при заболеваниях органов дыхания бактериальной этиологии, в т.ч. плевропневмонии, вызванной *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*;
- при атрофическом рините, вызванном *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*;
- при микоплазменных инфекциях, вызванных *M. hyopneumoniae*, *M. hyorhini*;
- при других заболеваниях бактериальной этиологии, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу.

¹Выпойка препарата без предварительного приготовления маточного раствора (концентрат) через дозирующее устройство. Добавлять препарат в воду необходимо при перемешивании.

²Исследования терапевтической эффективности препарата Флорокс ОР проводили в ООО МНИЦ «ОЗОС» на поросятах, цыплятах и молодняке различных возрастных категорий, 2017 г





Флорокс ОР применяют птице:

- при пастереллезе, стафилококкозе, сальмонеллезе, микоплазмозе, гемофилезе, болезнях органов дыхания, вызванных в т.ч. *Ornithobacterium rhinotracheale*;
- для лечения вторичных бактериальных инфекций при вирусных заболеваниях, в т.ч. колибактериоза;
- при других инфекционных болезнях, вызванных микроорганизмами, чувствительными к флорфениколу.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка	Курс лечения
Свиньи	Перорально	5 мл/100 кг м. ж.	7 дней
Птица	Перорально	0,2 мл/1 кг м. ж.	3 дня. При сальмонеллезе - 5 дней
• цыплята в возрасте до 4-х недель		100 мл/100 л воды	
• другие возрастные категории птицы		200 мл/100 л воды	

Для задачи препарата предварительно необходимо приготовить маточный раствор. При приготовлении маточного раствора необходимо препарат добавить в воду во время перемешивания в рекомендованной концентрации.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается применение препарата курам-несушкам и ремонтному молодняку менее чем за 14 суток до начала яйцекладки в связи с накоплением флорфеникола в яйцах.

Запрещается применение препарата хрякам-производителям, супоросным и лактирующим свиноматкам.

ОГРАНИЧЕНИЯ



15 суток - СВИНЬИ,
6 суток - ПТИЦА

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

Цефтонит® ХИТ

СУСПЕНЗИЯ, ИНЪЕКЦИОННО

50 мг цефтиофура

ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО МОЛОКУ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КРС И СВИНЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подтвержденная эффективность лечения маститов¹;
- Отсутствуют ограничения по молоку;
- Быстрое терапевтическое действие через 1-2 часа;
- Удобная дозировка: одна инъекция – одно место введения;
- Возможно применение препарата фактически до убоя, за счет коротких сроков ограничений по использованию мяса.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефтиофура, входящий в состав препарата Цефтонит, - цефалоспориновый антибиотик третьего поколения, широкого спектра действия, оказывающий бактерицидное действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии, включая штаммы, продуцирующие β -лактамазу, и некоторые анаэробные бактерии:

- *Actinobacillus* spp.
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Actinomyces* spp.
- *Actinomyces pyogenes*
- *Bacillus* spp.
- *Citrobacter* spp.
- *Enterobacter* spp.
- *Escherichia* spp.
- *Escherichia coli*
- *Fusobacterium* spp.
- *Fusobacterium necrophorum*
- *Haemophilus* spp.
- *Haemophilus parasuis*
- *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*)
- *Klebsiella* spp.
- *Pasteurella* spp.
- *Pasteurella* (*Mannheimia*) *haemolytica*
- *Pasteurella multocida*
- *Porphyromonas* spp.
- *Porphyromonas assacharolytica* (*Bacteroides melaninogenicus*)
- *Porphyromonas levii*,
- *Proteus* spp.
- *Salmonella* spp.
- *Salmonella choleraesuis*
- *Salmonella typhimurium*
- *Staphylococcus* spp.
- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus* spp.
- *Streptococcus suis*
- *Streptococcus zooepidemicus*
- *Streptococcus equi*
- *Streptococcus uberis*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus dysgalactiae*
- *Streptococcus bovis*

¹ Эффективность подтверждена клиническими испытаниями





ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Цефтонит применяют с лечебной целью: крупному рогатому скоту при бактериальных инфекциях органов дыхания, вызываемых *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, некробактериоза, ассоциированно с *Fusobacterium necrophorum* и *Porphyromonas assacharolytica* (*Bacteroides melaninogenicus*), и острого эндометрита, свиньям - при инфекциях органов дыхания, вызываемых *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* и *Streptococcus suis*, а также других заболеваний, возбудители которых чувствительны к цефтиофуру.


ФЛУНЕКС В КОМПЛЕКСЕ С ЦЕФТОНИТ ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МАСТИТОВ

Совместное применение при маститах у коров препаратов Цефтонит и Флулекс в сниженной дозировке (1 мл/45 кг массы животного) позволяет сократить сроки выздоровления при гнойно-катаральном мастите на 12 часов, по сравнению с терапией одним препаратом Цефтонит².

Результаты лечения коров при субклиническом мастите (n = 15, P = 0,95)



Результаты лечения коров при клиническом мастите (n = 15, P = 0,95)



² Исследования проводились на базе хозяйства Марковского района Саратовской области. Для проведения эксперимента использовали коров дойного стада черно-пестрой породы средней массой 450-550 кг в возрасте от 2-х до 5 лет с диагнозом клинический и субклинический мастит. По принципу аналогов с учетом диагноза были сформированы 4 группы по 10 голов в каждой.

³ Количество соматических клеток в 1 см³ не более 170 000

После парентерального введения цефтиофура быстро метаболизируется в десфуриилцефтиофура и создает в организме терапевтические концентрации на протяжении не менее 20 ч. Максимальная концентрация антибиотика в организме животных достигается через 0,5-2 часа после введения препарата Цефтонит. Выводится десфуриилцефтиофура из организма преимущественно через почки.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения	Курс лечения, дней
КРС	Заболевания дыхательных путей	п/к	1 мл/50 кг	1 раз в сутки	3-5
	Некробактериоз				3
	Эндометрит				5
Свиньи	Заболевания дыхательных путей	в/м	1 мл/16 кг		3

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность животных к цефтиофуру и другим бета-лактамам антибиотикам. Цефтонит не следует применять одновременно с тетрациклинами, левомицетином, аминогликозидами, фуросемидом, этакридиновой кислотой.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток - СВИНЬИ,
8 суток - КРС



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.



Цефтонит® Форте

СУСПЕНЗИЯ, ИНЪЕКЦИОННО

200 мг цефтиофур (пролонгированная форма)

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Работает 7 дней;
- Без ограничений по молоку;
- Курс лечения - 1 инъекция;
- Эффективен при полиартритах и полисерозитах;
- Применяется поросятам-сосунам.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефтонит Форте обладает широким спектром действия в отношении многих грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая некоторые анаэробные бактерии и штаммы, продуцирующие β -лактамазу, в том числе:

- *Actinobacillus* spp.
- *Actinobacillus pleuropneumoniae*
- *Actinomyces* spp.
- *Actinomyces pyogenes*
- *Bacillus* spp.
- *Citrobacter* spp.
- *Enterobacter* spp.
- *Escherichia* spp.
- *Escherichia coli*
- *Fusobacterium* spp.
- *Fusobacterium necrophorum*
- *Haemophilus* spp.
- *Haemophilus parasuis*
- *Histophilus somni*
(*Haemophilus somnus*)
- *Klebsiella* spp.
- *Pasteurella* spp.
- *Pasteurella* (*Mannheimia*)
haemolytica
- *Pasteurella multocida*
- *Porphyromonas* spp.
- *Porphyromonas asaccharolytica*
(*Bacteroides melaninogenicus*)
- *Porphyromonas levii*
- *Proteus* spp.
- *Salmonella* spp.
- *Salmonella choleraesuis*
- *Salmonella typhimurium*
- *Staphylococcus* spp.
- *Staphylococcus aureus*
- *Streptococcus* spp.
- *Streptococcus suis*
- *Streptococcus zooepidemicus*
- *Streptococcus equi*
- *Streptococcus uberis*
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus dysgalactiae*
- *Streptococcus bovis*




для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Цефтонит Форте



ЦЕФТОНИТ ФОРТЕ: 1 ИНЪЕКЦИЯ - 7 ДНЕЙ ДЕЙСТВИЯ



Цефтонит Форте быстро резорбируется из места инъекции, достигает максимальной концентрации в плазме крови уже через 12 часов и благодаря особой пролонгированной форме цефтиофура сохраняется на терапевтическом уровне не менее 7 дней.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ С ОДНОЙ ИНЪЕКЦИИ

Цефтонит Форте обладает высокой терапевтической эффективностью в лечении различных актуальных заболеваний КРС, в том числе при маститах, что доказано испытаниями.

Вид животного	Голов	Заболевание	Инъекций	Срок выздоровления	Терапевтическая эффективность
Коровы	25	Эндометриты	1	72 ч	100 %
	30	Субклинический, острый, скрытый и клинический маститы			
Телята	50	Респираторные заболевания (трахеобронхит)			

Цефтонит Форте демонстрирует максимальную эффективность при минимальных трудозатратах

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Крупному рогатому скоту Цефтонит Форте назначают для лечения респираторных инфекций бактериальной этиологии, вызываемых *Pasteurella (Mannheimia) haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, для лечения некробактериоза, вызываемого *Fusobacterium necrophorum* и *Porphyromonas levii*, *Bacteroides* spp., *Prevotella* spp., а также для лечения острого эндометрита, вызываемого *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* и *Fusobacterium necrophorum*, а также других заболеваний, возбудители которых чувствительны к цефтиофуру.

Свиньям Цефтонит Форте назначают для лечения респираторных и мочеполовых заболеваний бактериальной этиологии, а также гнойного артрита, омфалита и синдрома ММА свиноматок, вызываемых *E. coli*, *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., и других заболеваний, возбудители которых чувствительны к цефтиофуру.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Перед применением Цефтонит Форте флакон встряхивают до получения однородной суспензии.
2. В холодное время года препарат рекомендуется нагревать до комнатной температуры (18-23 °C).
3. Иглу вводят подкожно у основания уха, вперёд по направлению на противоположный глаз животного.
4. КРС вводят однократно в дозе 1 мл на 30 кг массы животного, не более 30 мл лекарственного препарата в одно место; свиньям вводят однократно внутримышечно в дозе 1 мл на 40 кг массы животного, но не более 5 мл в одно место инъекции.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению препарата Цефтонит Форте является индивидуальная повышенная чувствительность животных к β -лактамным антибиотикам. При совместном применении с аминогликозидами и/или петлевыми диуретиками, особенно при имеющемся нарушении функции почек, возможно повышение риска нефротоксичности. Недопустимо совместное применение с тетрациклинами и амфениколами, так как возможно значительное падение, вплоть до полной утраты, их противомикробной активности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



20 суток - КРС,
71 сутки - СВИНЬИ



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

Энронит®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

50 мг энрофлоксацин, 500 000 МЕ колистин

 ПО РЕЦЕПТУ

50 мл

100 мл



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективнее монопрепаратов на основе энрофлоксацина с сопоставимой стоимостью курса лечения;
- Медленное привыкание микроорганизмов в сравнении с препаратами, содержащими только энрофлоксацин в качестве действующего вещества, позволяет применять препарат в течение длительного времени;
- Высокая эффективность в борьбе с колибактериозом;
- Компоненты препарата обладают синергетическим эффектом.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Входящие в состав препарата Энронит энрофлоксацин и колистина сульфат обладают синергидным действием, обеспечивают широкий спектр антимикробной активности лекарственного средства в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

Механизм действия энрофлоксацина, соединения группы фторхинолонов, основан на ингибировании активности фермента гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки, что приводит к нарушению синтеза белков и подавлению роста и развития грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| • <i>Escherichia coli</i> | • <i>Pseudomonas aeruginosa</i> |
| • <i>Haemophilus spp.</i> | • <i>Mycoplasma spp.</i> |
| • <i>Pasteurella spp.</i> | • <i>Enterobacter spp.</i> |
| • <i>Salmonella spp.</i> | • <i>Proteus mirabilis</i> |
| • <i>Staphylococcus spp.</i> | • <i>Proteus vulgaris</i> |
| • <i>Streptococcus spp.</i> | • <i>Klebsiella spp.</i> |
| • <i>Clostridium perfringens</i> | • <i>Erysipelothrix spp.</i> |
| • <i>Bordetella spp.</i> | • <i>Actinobacillus spp.</i> |
| • <i>Campylobacter spp.</i> | • <i>Fusobacterium spp.</i> |
| • <i>Corynebacterium pyogenes</i> | • <i>Bacteroides spp.</i> |





Колистина сульфат нарушает проницаемость клеточной стенки бактерии путем соединения с липопотеинами, что приводит к изменению внутриклеточного метаболизма и вызывает гибель грамотрицательных бактерий, в том числе:

- **Escherichia coli**
- **Pseudomonas aeruginosa**
- **Klebsiella spp.**
- **Salmonella spp.**
- **Proteus spp.**

Максимальная концентрация энрофлоксацина в сыворотке крови достигается через 1-2 часа, колистина сульфата - через 1 час.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Энронит назначают телятам, ягнятам и поросятам для лечения колибактериоза, сальмонеллеза, пастереллеза, респираторных и других заболеваний, вызванных чувствительными к энрофлоксацину и колистину микроорганизмами, взрослым свиньям – для лечения атрофического ринита, энзоотической пневмонии и синдрома мастит-метрит-агалактия.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка	Курс лечения
Телята, ягнята	Подкожно	0,5 мл/10 кг м. ж.	3-5 дней
Свиньи свиноматки при синдроме ММА	Внутримышечно		1-2 дня

В связи с возможной болевой реакцией не следует вводить в одно место телятам и свиньям более 5 мл, ягнятам и поросятам – более 2,5 мл лекарственного препарата.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается применение препарата Энронит одновременно с левомецетином, антибиотиками групп макролидов и тетрациклинов, теофилином и нестероидными противовоспалительными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



21 сутки

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

Энронит® OR

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

100 мг энрофлоксацин, 1 000 000 МЕ колистина

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл

1 л

5 л



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективнее монопрепаратов на основе энрофлоксацина с сопоставимой стоимостью курса лечения;
- Высокая активность за счет синергизма действующих веществ;
- Максимальный результат терапии колибактериоза.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Энрофлоксацин – антибиотик группы фторхинолонов, колистина сульфат – соединение группы полипептидных антибиотиков.

Механизм действия энрофлоксацина основан на ингибировании активности фермента ДНК-гиразы, влияющего на репликацию спирали ДНК в ядре бактериальной клетки, что приводит к нарушению синтеза белков и подавлению роста деления и развития грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| • Escherichia coli | • Klebsiella spp. |
| • Haemophilus spp. | • Erysipelothrix spp. |
| • Pasteurella spp. | • Actinobacillus spp. |
| • Salmonella spp. | • Fusobacterium spp. |
| • Staphylococcus spp. | • Bacteroides spp. |
| • Streptococcus spp. | • Bordetella spp. |
| • Clostridium perfringens | • Campylobacter spp. |
| • Enterobacter spp. | • Corynebacterium pyogenes |
| • Proteus mirabilis | • Pseudomonas aeruginosa |
| • Proteus vulgaris | • Mycoplasma spp. |

Механизм действия колистина сульфата заключается в нарушении проницаемости клеточной стенки бактерии путем соединения с липопroteинами, что приводит к нарушению внутриклеточного метаболизма и вызывает гибель грамотрицательных бактерий, в том числе:


- **Escherichia coli**
- **Pseudomonas aeruginosa**
- **Klebsiella spp.**
- **Salmonella spp.**
- **Proteus spp.**





ВЫСОКАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭНРОНИТ ОР В СРАВНЕНИИ С МОНОПРЕПАРАТОМ

Задержка роста штамма *Salmonella enteritidis*¹



Синергизм действующих веществ обеспечивает высокую эффективность применения препарата

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Энронит ОР назначают сельскохозяйственной птице при колибактериозе, сальмонеллезе, хронических респираторных заболеваниях, стрептококкозе, некротическом энтерите, гемофилезе, микоплазмозе, смешанных инфекциях и вторичных инфекциях при вирусных болезнях; пороссятам - при колибактериозе и энтеритах бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к энрофлоксацину и колистину.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка	Курс лечения
Бройлеры, племенная птица, ремонтный молодняк кур, индейки	Путем выпаивания	0,5 мл/1 л питьевой воды	3-5 дней, при смешанных инфекциях, сальмонеллезе, а также при хронических формах заболеваний – не менее 5 дней
Пороссята	Путем выпаивания с водой (в разведении 1:1)	0,3 мл/кг м.ж. (при тяжелой форме заболевания - 0,5 мл/кг м.ж.)	2-3 дня

¹Согласно результатам исследования чувствительности штамма *Salmonella enteritidis* к применяемым антибактериальным препаратам. На графике представлены зоны (мм) вокруг индикаторных дисков соответствующих препаратов, помещенных в микробную среду *Salmonella enteritidis*.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение Энронит ОР курам-несушкам ввиду выделения энрофлоксацина с яйцами. Запрещается применение препарата ремонтному молодняку кур менее чем за 14 суток до начала яйцекладки и курам-несушкам, яйца которых будут использоваться в пищу, ввиду выделения энрофлоксацина с яйцами.

Не допускается применение Энронит ОР одновременно с левомецетином, макролидами, тетрациклинами, теофилином, нестероидными противовоспалительными средствами, препаратами магния и кальция, а также животным с тяжелыми заболеваниями почек и печени.

ОГРАНИЧЕНИЯ



11 суток - ПТИЦА,
14 суток - ПОРОСЯТА

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

НОВИНКА

НЕОКАЛЬФ®



КРЕПКОЕ
РЕШЕНИЕ
ДИАРЕИ



По рецепту

**НОВЫЙ КОМПЛЕКС НА ОСНОВЕ НИТАЗОКСОНИДА И КОЛИСТИНА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЯТ ПРИ ДИАРЕЕ, ВЫЗВАННОЙ КРИПТОСПОРИДИЯМИ,
КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКОЙ, САЛЬМОНЕЛЛОЙ, А ТАКЖЕ КЛОСТРИДИЯМИ**

- ▶ Эффективен против всех актуальных возбудителей диареи телят в неонатальный период
- ▶ Активен против клостридий, в отличие от других препаратов, применяемых против криптоспоридий
- ▶ Отсутствует резистентность к нитазоксаниду
- ▶ Удобен в применении: индивидуальный дозатор
- ▶ Безопасен с первых дней жизни



ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

									Стр.
Альвет	•	•	•	•	•		•	•	117
Альвет-суспензия	•	•	•						119
Ивермек	•		•	•				•	121
Ивермек OR							•		123
Ивермек-ON 	•	•	•	•	•	•	•	•	126
Ивермек-гель					•	•			128
Ивермек-спрей					•	•		•	130
Клозатрем	•		•						132
Левамизол 75	•		•	•	•				134
Мерадок	•		•	•					136
Неозидин	•	•	•		•				139
Неозидин М	•	•	•		•				141
Риказол 	•		•						143
Цифлунит	•								145
Цифлунит-ON	•	•	•	•	•	•	•	•	147
Цифлунит Флок 			•						149



Альвет®

ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ПОРОШОК, ПЕРОРАЛЬНО

200 мг альбендазол

 ПО РЕЦЕПТУ

50 г

500 г

12,5 кг

БЕЗОПАСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С ИНВАЗИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, ОБЛАДАЮЩЕЕ ПОВЫШЕННОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И РЕЦЕПТУРЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность в отношении нематод, цестод и трематод;
- Повышенная биодоступность за счет специально подобранных компонентов;
- Особые вкусовые добавки обеспечивают хорошую поедаемость животными.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Альвет обладает широким спектром антигельминтного действия, эффективен при моно- и полиинвазиях, активен в отношении имаго и личинок нематод и цестод, а также имаго трематод. Обладая овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат Альвет назначают без предварительной голодной диеты и применения слабительных средств согласно приведенным в таблице ниже данным.

ВНИМАНИЕ

Перед массовой дегельминтизацией каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (10-15 голов). При отсутствии в течение 3-х суток осложнений приступают к обработке всего поголовья.





Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Индивидуально:				
КРС	мониезиоз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы	в смеси с концентрированными кормами	3,75 г/100 кг м. ж. (альбендазола 7,5 мг/1 кг м. ж.)	однократно
	хронический фасциолез		5,0 г/100 кг м. ж. (альбендазола 10,0 мг/1 кг м. ж.)	
Лошади	параскаридоз, стронгилятозы (альфортиоз, делафондиоз), анолоцефалез и циатостомоз		3,75 г/100 кг м. ж. (альбендазола 7,5 мг/1 кг м. ж.)	
Собаки	нематодозы		0,375 г/10 кг м. ж. (альбендазола 7,5 мг/1 кг м. ж.)	
	цестодозы		0,75 г/10 кг м. ж. (альбендазола 15 мг/1 кг м. ж.)	

Индивидуально или групповым способом:

Овцы	мониезиоз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы	в смеси с концентрированными кормами	2,5 г/100 кг м. ж. (5,0 мг/кг альбендазола)	однократно
	хронический фасциолез		3,75 г/100 кг м. ж. (7,5 мг/кг альбендазола)	

При групповом способе применения навеску препарата Альвет, рассчитанную на группу не более 150 овец, тщательно смешивают с комбикормом (из расчета 50-100 г комбикорма на животное). Смесь раскладывают в кормушки, обеспечивая животным свободный доступ к ним.

Групповым способом:

Свиньи	аскаридоз и эзофагостомоз	в смеси с концентрированными кормами	5,0 г/100 кг м. ж. (альбендазола 10,0 мг/1 кг м. ж.)	однократно, в утреннее кормление
--------	---------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------------

Препарат в дозе, рассчитанной на группу не более чем 50 свиней, смешивают с половиной нормы корма и раскладывают по кормушкам, обеспечивая животным свободный доступ к ним.

С/х птица	аскаридоз и гетеракидоз	в смеси с комбикормом	0,5 г/10 кг массы птицы (альбендазола 10 мг/1 кг массы птицы)	два дня подряд, в утреннее кормление
-----------	-------------------------	-----------------------	---	--------------------------------------

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение лекарственного препарата стельным коровам и жеребым лошадям в первую треть, свиньям, овцам и собакам - в первую половину беременности, а также курам-несушкам в связи с накоплением в яйцах.

ОГРАНИЧЕНИЯ



20 суток - животные
5 суток - птица



4 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 60 суток.

Альвет®-суспензия

СУСПЕНЗИЯ, ПЕРОРАЛЬНО

100 мг альбендазол

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл

1 л



БЕЗОПАСНОЕ ЭКОНОМИЧНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ С ИНВАЗИОННЫМИ БОЛЕЗНЯМИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА И ЛОШАДЕЙ, ОБЛАДАЮЩЕЕ ПОВЫШЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ И БИОДОСТУПНОСТЬЮ ЗА СЧЕТ ОРИГИНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ МИКРОНИЗАЦИИ И РЕЦЕПТУРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность в отношении легочных и желудочно-кишечных нематод, цестод и трематод;
- Повышенная стабильность и биодоступность суспензии за счет оригинальной рецептуры и технологии микронизации частиц.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Альвет-суспензия обладает широким спектром антигельминтного действия, эффективен при моно- и полиинвазиях, активен в отношении имаго и личинок нематод, цестод, а также имаго трематод; обладая овоцидным действием, снижает зараженность пастбищ яйцами гельминтов.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат Альвет-суспензия назначают с лечебной и профилактической целью, крупному рогатому скоту, овцам и лошадям при нематодозах, трематодозах и цестодозах.

Препарат вводят индивидуально в дозах, указанных в таблице. Предварительной голодной диеты и применения слабительных средств перед дегельминтизацией не требуется.

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	мониезиоз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы	перорально	7,5 мл/100 кг м. ж. (альбендазола 7,5 мг/1 кг м. ж.)	однократно
	хронический фасциолез		10 мл/100 кг м. ж. (альбендазола 10,0 мг/1 кг м. ж.)	
Лошади	параскаридоз, стронгилятозы (альфортиоз, деляфондиоз), аноплосцефалез и циаостомоз		7,5 мл/100 кг м. ж. (альбендазола 7,5 мг/1 кг м. ж.)	
Овцы	мониезиоз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы		0,5 мл/10 кг м. ж.	
	хронический фасциолез		0,75 мл/10 кг м. ж.	

Перед применением препарат необходимо тщательно взболтать.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





Перед массовыми обработками каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (10-15 голов), за которыми ведут наблюдение в течение 3 суток. При отсутствии осложнений препарат применяют всему поголовью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата стельным коровам и жеребым лошадям в первую треть, а суягным овцам - в первую половину беременности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



20 суток



7 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 60 суток.

Ивермек®

ХИТ

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

10 мг ивермектин, 40 мг витамин Е

ПО РЕЦЕПТУ

1 мл

20 мл

50 мл

100 мл

250 мл

500 мл



ЛИДЕР ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ С УНИКАЛЬНОЙ ВОДНО-ДИСПЕРСНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ ИВЕРМЕКТИНА И ВИТАМИНА Е ПОВЫШЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запатентованная водно-дисперсная форма;
- Быстрое всасывание без раздражения места инъекции;
- Содержит самые активные изомеры авермектинов;
- Витамин Е оказывает антиоксидантное действие.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Ивермек обладает выраженным противопаразитарным действием на личиночные и половозрелые стадии нематод желудочно-кишечного тракта, легких и глаз, личинок подкожных, носоглоточных, желудочных оводов, вшей, кровососок и саркоптоидных клещей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Ивермек применяют с лечебно-профилактической целью при арахноэнтомозах и нематодозах:

- крупному рогатому скоту при стронгилятозах, трихоцефалезе, стронгилоидозе, телязиозе, сифункулятозах, гиподерматозе, псороптозе; саркоптозе и хориоптозе;
- овцам и козам при диктиокаулезе, протостронгилезе, мюллерииозе, гемонхозе, остертагиозе, нематодирозе, маршаллагииозе, коопериозе, хабертиозе, эзофагостомозе, мелофагозе, буностомозе, трихоцефалезе, стронгилоидозе, маллофагозе, эстрозе, псороптозе и хабертиозе;
- оленям при диктиокаулезе, остертагиозе, нематодирозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе, эдемагенозе, цефеномиозе и саркоптозе;
- верблюдам при диктиокаулезе, остертагиозе, нематодирозе, стронгилоидозе, трихоцефалезе и саркоптозе;
- свиньям при трихоцефалезе, аскаридозе, метастронгилезе, эзофагостомозе, стронгилоидозе, стефанурозе, гематопинозе и саркоптозе.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат Ивермек вводят животным с соблюдением правил асептики внутримышечно; свиньям в область шеи или внутренней поверхности бедра, другим видам животных – в область крупа или шеи в следующих дозах:

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС МРС Олени Верблюды	Нематодозы, арахноэнтомозы	В/м	1 мл/50 кг	Однократно
	Тяжелые случаи саркоптоидозов			Двукратно с интервалом 8-10 дней
Свиньи	Нематодозы, арахноэнтомозы		1 мл/33 кг	Однократно
	Тяжелые случаи саркоптоидозов			Двукратно с интервалом 8-10 дней

В случае если объем препарата превышает 10 мл, его следует вводить в несколько мест.

Обработку животных при нематодозах проводят осенью перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выводом на пастбище; при оводовых инвазиях обработку проводят сразу после окончания лета оводов; при арахно-энтомозах обработку проводят по показаниям.

Ивермек предварительно испытывают на небольшой группе животных. При отсутствии осложнений в течение 3 дней приступают к обработке всего поголовья.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не разрешается применение препарата Ивермек больным инфекционными болезнями и истощенным животным, а также беременным самкам, молоко которых будет использоваться в пищевых целях, менее чем за 28 суток до начала лактации.

ОГРАНИЧЕНИЯ



28 дней



28 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона – не более 42 суток.

Ивермек® OR

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

10 мг ивермектин, 40 мг витамин Е

500 мл



ПЕРОРАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОЙ БОРЬБЫ С КРАСНЫМ КУРИНЫМ КЛЕЩОМ И ШИРОКИМ СПЕКТРОМ ЭКТО- И ЭНДОПАРАЗИТОВ ПТИЦЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Доказанная эффективность до 100%¹;
- Возможность уничтожать красного куриного клеща на птице;
- Комплексное решение против экто- и эндопаразитов;
- Безопасен для теплокровных, не обладает эмбриотоксичностью.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Обладает выраженным противопаразитарным действием на личиночные и половозрелые стадии нематод, саркоптоидных и гамазовых клещей (в т. ч. красного куриного клеща).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ивермек OR назначают с лечебно-профилактической целью при арахнозномозах и нематодозах:

- курам (цыплятам-бройлерам, племенной птице, ремонтному молодняку и птице в период линьки) при аскаридиозе, гетеракидозе, капилляриозе, энтомозах, вызванных *Aphaniptera* spp. (блохи), *Menacanthus stramineus*, *Menopon gallinae* (пухопероеды), *Ceratophyllus gallinae* (блоха), акарозах, вызванных *Dermanyssus gallinae* (красный куриный клещ), *Knemidocoptes mutans* (чесоточный клещ), *Dermatoryktes mutans* (чесоточный клещ).

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Способ применения	Дозировка	Лечение от эктопаразитов	Лечение нематодозов
Перорально. При задаче в разовой дозе разводят в 1/4 части питьевой воды, рассчитанной на суточное потребление. Рекомендуется за 2 часа перед выпаиванием прекратить подачу питьевой воды для гарантированного потребления препарата.	0,04 мл/1 кг м. т. (400 мкг ивермектина/1 кг м. т.)	1, 2, 5 и 6й дни лечения (один раз в сутки)	Однократно

¹ Эффективность препарата подтверждена испытаниями, проведенными на базе государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии им. К.И. Скрябина Российской академии сельскохозяйственных наук» (ГНУ ВИГИС Россельхозакадемии).





РЕКОМЕНДУЕМ

Для достижения максимальной эффективности и продолжительной защиты компания NITA-FARM предлагает комплекс двух продуктов - Ивермек OR и Ивермек-ON.

Ивермек® OR + Ивермек®-ON

Эффект на максимум

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПТИЦЕВОДСТВА²

**1 день**

Выпойка	Ивермек OR	0,04 мл препарата/1 кг массы тела
Обработка цеха	Ивермек-ON	в разведении 1:100

2 день

Выпойка	Ивермек OR	0,04 мл препарата/1 кг массы тела
---------	------------	-----------------------------------

5 день

Выпойка	Ивермек OR	0,04 мл препарата/1 кг массы тела
Обработка цеха	Ивермек-ON	в разведении 1:100

6 день


Выпойка	Ивермек OR	0,04 мл препарата/1 кг массы тела
---------	------------	-----------------------------------

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Подтвержденная эффективность до 100%;
- Продолжительная защита от эктопаразитов;
- Комплексное действие на экто- и эндопаразитов.

ИВЕРМЕК OR + ИВЕРМЕК-ON - МАКСИМУМ ЭФФЕКТА В БОРЬБЕ С КРАСНЫМ КУРИНЫМ КЛЕЩОМ

Только комплексный подход - дезинсекция помещения и выпойка птицы - обеспечивает максимальный результат в уничтожении клеща.

Степень заражения паразитами

²Применение продуктов, указанных в схеме, осуществляется согласно инструкциям.

100% ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ ГЕЛЬМИНТОВ³

Ивермек OR назначали птице с питьевой водой в стандартной дозе 0,04 мл (400 мкг ивермектина)/1 кг массы тела. В испытании было задействовано 780 голов ремонтного молодняка кур. Эффективность учитывали по результатам копроовоскопических исследований до и через 5 суток после дегельминтизации, расчёт эффективности проводился по типу «контрольный тест».

Результат применения Ивермек OR



- Ивермек OR демонстрирует 100% эффективность в отношении приведенных гельминтов

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Индивидуальная непереносимость компонентов.

Запрещается применять Ивермек OR курам-несушкам, ремонтному молодняку кур менее чем за 14 дней до начала яйцекладки, ввиду накопления ивермектина в яйце.

ОГРАНИЧЕНИЯ



9 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия упаковки - 42 суток.

³ Эффективность препарата подтверждена испытаниями, проведенными на базе государственного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт гельминтологии им. К.И. Скрябина Российской академии сельскохозяйственных наук» (ГНУ ВИГИС Россельхозакадемии).



Ивермек®-ОН

РАСТВОР ДЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ

10 мг ивермектин

1 л



ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ БОРЬБЫ ПРОТИВ КРАСНОГО КУРИНОГО КЛЕЩА И ДРУГИХ ЭКТОПАРАЗИТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективность против красного куриного клеща и других эктопаразитов до 100%¹;
- Имеет нейтральный запах.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Ивермектин, входящий в состав средства, относится к полусинтетическим авермектинам, представляет собой смесь дигидроавермектинов В1а и В1b, обладает выраженным инсектоакарицидным действием на личинки и взрослые особи мух, вшей, блох, гамазовых (в т.ч. красного куриного клеща) и иксодовых клещей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ивермек-ОН применяют для дезинсекции (или обработки) объектов ветеринарного надзора в отсутствие птицы и животных с целью уничтожения личинок и взрослых особей мух, вшей, блох, гамазовых (в т.ч. красного куриного клеща) и иксодовых клещей.

Средство обладает острой инсектицидной активностью и остаточным действием в течение 40 дней после применения.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Для деакаризации используют свежеприготовленный под руководством ветеринарного врача или ветеринарного фельдшера рабочий раствор Ивермек-ОН с концентрацией ДВ 0,01%, что соответствует разведению 1:100 (одна часть Ивермек-ОН на 100 частей воды соответственно).

Для приготовления рабочих растворов Ивермек-ОН разводят в воде при комнатной температуре, при равномерном перемешивании в течение 5 минут.

Срок использования рабочего раствора не должен превышать 24-х часов после его приготовления.

При использовании рабочего раствора Ивермек-ОН применяют распыляющую или опрыскивающую аппаратуру различных марок.

Норма расхода рабочего раствора составляет 100 мл/м² (не впитывающая влагу поверхность) и 500 мл/м² (впитывающая влагу поверхность).



- Лучший продукт Международной выставки «AgroFarm» 2014г.

¹ Эффективность продукта подтверждена испытаниями в ГНУ ВИГИС им. К.И. Скрябина Россельхозакадемии




для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям (при появлении насекомых).

В ходе сравнительных испытаний Ивермек-ОН и средства на основе фосфорорганических соединений против красного куриного клеща (*D. Gallinae*) были получены следующие результаты²:

Эффективность применения Ивермек-ОН в сравнении со средством на основе фосфорорганических соединений против красного куриного клеща³



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Ивермек-ОН не рекомендуется сочетать с другими инсектоакарицидными средствами.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия упаковки – 28 суток.

² Применение средств осуществлялось согласно инструкциям

³ Архипов И.А., Архипова Д.Р., Сафарова М.И., Зубарев В.Н., Сердюкова Т.Н. Сравнительная эффективность инсектицидных средств против клещей *D. Gallinae* // Ежемесячный научно-производственный журнал Ветеринария №6 - Москва 2015 г. - С. 39-40



Ивермек®-гель

ГЕЛЬ, НАРУЖНО

1 мг ивермектин, 15 мг декспантенол,
50 мг лидокаин

30 мл



УНИКАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО В ВИДЕ ГЕЛЯ, УЛУЧШАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНЫХ ЗА СЧЕТ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНВАЗИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальное сочетание активных субстанций ивермектина, декспантенола и лидокаина обеспечивает высокую терапевтическую эффективность;
- Гелевая основа обеспечивает быстрое проникновение действующих веществ во все места локализации паразита;
- Декспантенол обеспечивает быстрое заживление кожи, поврежденной клещами и патогенной микрофлорой;
- Лидокаин устраняет раздражение, снимает зуд и беспокойство животного;
- Акарицидное действие в течение 5-7 дней;
- Лекарственная форма ивермектина обеспечивает низкую всасываемость препарата через кожу и отсутствие токсического действия на организм.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ивермек-гель обладает выраженным акарицидным действием на личинок и половозрелых особей саркоптоидных и демодекозных клещей.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ивермек-гель применяют для лечения собак, кошек при нотоэдрозе, саркоптозе, демодекозе и отодектозе.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При поражении собак и кошек демодекозом, саркоптозом, нотоэдрозом препарат наносят тонким слоем на предварительно очищенные от струпинов и корок пораженные места из расчета 0,2-0,3 мл на 1 кг массы животного, слегка втирая от периферии к центру с захватом 1-2 см пограничной здоровой кожи. Для предотвращения слизывания лекарственного средства животным надевают шейный воротник, намордник или смыкают челюсти петлей из тесьмы, которые снимают через 15-20 минут после нанесения препарата. Обработку проводят 2-4 раза с интервалом 5-7 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарнологических исследований. Животных с обширными участками поражения обрабатывают в два приема с интервалом один день, нанося препарат на пораженные места сначала одной, а затем другой половины туловища. При акарозах, осложненных бактериальной инфекцией, рекомендуется применение иммуномодулирующих и антибактериальных лекарственных препаратов.



При отодектозе (ушной чесотке) наружный слуховой проход очищают смоченным гелем тампоном с препаратом от струпьев и корок, затем вводят в каждое ухо по 0,5-2,0 мл Ивермек-геля (в зависимости от массы животного). С целью более полной обработки всей поверхности уха и слухового прохода ушную раковину складывают вдоль пополам и слегка массируют ее основание. Обработку проводят 1-2 раза с интервалом 5-7 дней. При необходимости курс лечения повторяют. Лекарственный препарат обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одного уха. В запущенных случаях заболевания, осложненных отитами, назначают антибактериальные и противовоспалительные средства.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не следует применять Ивермек-гель одновременно с другими инсектоакарицидными средствами для местного применения, а также противопаразитарными препаратами, содержащими макроциклические лактоны.

СРОК ГОДНОСТИ

4 года со дня производства, после первого вскрытия упаковки – не более 60 суток.



Ивермек®-спрей

РАСТВОР, НАРУЖНО

2,5 мг ивермектин, 20 мг лидокаин,
5 мг декспантенол, 0,5 мг хлоргексидин

30 мл



УНИКАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ИНСЕКТОАКАРИЦИДНОЕ СРЕДСТВО В ВИДЕ СПРЕЯ, УЛУЧШАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЖИВОТНЫХ ЗА СЧЕТ УСТРАНЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНВАЗИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальное сочетание 4-х компонентов позволяет не только справиться с эктопаразитами, но и предотвратить бактериальные осложнения;
- Насос-дозатор обеспечивает более удобную и точную обработку препаратом;
- Не раздражает кожные покровы благодаря мягкодействующим компонентам;
- Входящие в состав компоненты облегчают боль, снимают зуд у животного, а также способствуют быстрому заживлению раны.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ивермек-спрей обладает выраженной акарицидной активностью в отношении преимагинальных и имагинальных фаз развития саркоптоидных, демодекозных клещей, паразитирующих у собак, кошек, пушных зверей и грызунов, а также кнемидокоптовых клещей, паразитирующих у птиц.

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| • Sarcoptes spp. | • Notoedres cati |
| • Psoroptes spp. | • Demodex canis |
| • Otodectes cynotis | • Knemidocoptes spp. |

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ивермек-спрей применяют для лечения собак, кошек, пушных зверей и декоративных грызунов при саркоптозе, отодектозе, нотоэдрозе, псорптозе и демодекозе, декоративных птиц — при кнемидокоптозе.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработку животных проводят на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, предварительно удалив из помещения клетки с декоративными птицами и накрыв аквариумы с рыбами.

Для предотвращения слизывания препарата животному надевают намордник, шейный воротник или фиксируют челюсти петлей из тесьмы, которые снимают после полного высыхания препарата.

Ивермек-спрей наносят на предварительно очищенные от струпиов и корок пораженные участки тела животного до их визуального покрытия лекарственным средством, но не более 0,2 мл/кг массы животного. Пораженные участки в области глаз и носа обрабатывают кончиками пальцев (в перчатке), смоченными препаратом, слегка втирая в кожу.



При обработке флакон с препаратом держат вертикально и, нажимая на спрей-насадку, направляют факел аэрозоля на пораженные участки с расстояния 10-20 см с захватом 1-2 см пограничной здоровой кожи. Одно нажатие на спрей-насадку обеспечивает дозу препарата 0,125 мл.

При поражении собак, кошек и пушных зверей демодекозом, собак и пушных зверей саркоптозом и кошек нотоэдрозом обработку проводят 2-4 раза с интервалом 3-5 дней до клинического выздоровления животного, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований.

Животных с обширными участками поражения обрабатывают в два приема с интервалом один день, нанося Ивермек-спрей на пораженные места сначала одной, а затем другой половины туловища.

До полного высыхания шерсти после обработки не следует позволять животным слизывать препарат.

При отодектозе плотоядных и псороптозе декоративных грызунов препарат наносят на предварительно очищенную от струпьев и корок внутреннюю поверхность ушной раковины и кожу наружного слухового прохода в зависимости от массы животного и размера ушной раковины в дозе 0,5-1,0 мл (4-8 нажатий на спрей-насадку).

Обработку проводят двукратно с интервалом 3-5 дней. Препаратом обязательно обрабатывают оба уха. При необходимости курс лечения повторяют. Лекарственное средство обязательно вводят в оба уха, даже в случаях поражения отодектозом только одной ушной раковины.

При отодектозе, осложненном отитом, назначают антибактериальные и противовоспалительные средства.

Обработку больных кнемидокоптозом декоративных птиц проводят 2-4 раза с интервалом 3-5 дней до клинического выздоровления, которое подтверждают двумя отрицательными результатами акарологических исследований.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не подлежат обработке животные моложе 12-недельного возраста. Беременным и кормящим самкам препарат применяют в случае необходимости под контролем лечащего ветеринарного врача. Кормление щенков и котят материнским молоком в этом случае рекомендуется прервать.

Не применять при индивидуальной повышенной чувствительности к компонентам препарата. Запрещается аурикулярное применение при прободении барабанной перепонки.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства.



Клозатрем®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

50 мг клозантел

100 мл

250 мл



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ГЕЛЬМИНТОЗОВ И ОВОДОВЫХ ИНВАЗИЙ КРУПНОГО И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная эффективность при лечении фасциолёза;
- Лечение нематодозов и оводовых инвазий;
- Направленное действие инъекционного раствора.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Клозантел, входящий в состав лекарственного средства, является производным салициланилида, обладает широким спектром противопаразитарного действия в отношении нематод, трематод, а также личинок оводов:

- *Haemonchus* spp.
- *Nematodirus* spp.
- *Trichostrongylus* spp.
- *Ostertagia* spp.
- *Oesophagostomum radiatum*
- *Bunostomum* spp.
- *Chabertia ovis*
- *Fasciola hepatica*
- *Fasciola gigantica*
- *Hypoderma bovis*
- *Hypoderma lineatum*
- *Oestrus ovis*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Клозатрем назначают с лечебной и профилактической целью крупному рогатому скоту при гемонхозе, эзофагостомозе, буностомозе, трихостронгилезе, остертагиозе, фасциолезе и гиподерматозе; овцам и козам — при гемонхозе, нематодирозе, трихостронгилезе, хабертиозе, буностомозе, эзофагостомозе, фасциолезе и эстрозе.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	Нематодозы, фасциолёз	В/м или п/к	0,5 мл/10 кг м. ж. (клозантела 2,5 мг/кг м. ж.)	Однократно
	Гиподерматоз		1 мл/10 кг м. ж. (клозантела 5 мг/кг м. ж.)	
МРС	Нематодозы, эстроз	П/к	0,5 мл/10 кг м. ж. (клозантела 2,5 мг/кг м. ж.)	
	Фасциолёз		1 мл/10 кг м. ж. (клозантела 5 мг/кг м. ж.)	

Перед массовыми обработками каждую серию Клозатрема испытывают на небольшой группе (10-15 голов) животных разной упитанности. При отсутствии в течение 3 дней осложнений лекарственное средство



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



применяют всему поголовью. Обработку животных против гельминтов с лечебной целью проводят по показаниям, с профилактической – перед постановкой на стойловое содержание и весной перед выгоном на пастбище, против оводовых инвазий – сразу после окончания лета оводов и весной (март - апрель).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение препарата Клозатрем дойным животным, а также коровам, овцам, козам, менее чем за 30 суток до отела или окота, ввиду выделения препарата с молоком.

Не следует применять Клозатрем одновременно с хлороорганическими и фосфорорганическими инсектицидными средствами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



28 суток

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет со дня производства. После первого вскрытия флакон хранят 28 суток.



Левамизол 75

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

75 мг левамизол



ПО РЕЦЕПТУ

50 мл



ТРАДИЦИОННЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ЛЕВАМИЗОЛА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ ЖИВОТНЫХ ПРИ НЕМАТОДОЗАХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оптимальное содержание ДВ;
- Эффективен при борьбе со всеми нематодами;
- Экономичен в применении.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Левамизола гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает широким спектром нематоцидного действия, активен в отношении личиночных и половозрелых фаз развития нематод желудочно-кишечного тракта и легких.

- *Haemonchus* spp.
- *Ostertagia* spp.
- *Trichostrongylus* spp.
- *Cooperia* spp.
- *Dictyocaulus* spp.
- *Protostrongylus* spp.
- *Nematodirus* spp.
- *Bunostomum* spp.
- *Oesophagostomum* spp.
- *Chabertia* spp.
- *Ascaris suum*
- *Strongyloides ransomi*
- *Metastrongylus* spp.
- *Oesophagostomum* spp.
- *Toxocara* spp.
- *Toxascaris leonina*
- *Uncinaria stenocephala*
- *Ancylostoma caninum*

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят без предварительной голодной диеты и применения слабительных средств:

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС МРС	Диктиокаулез, гемонхоз, буностомоз, эзофагостомоз, нематодироз, остертагиоз, хабертиоз, коопериоз, стронгилоидоз	В/м или п/к	1 мл/10 кг м.ж.	Однократно
Свиньи	Аскаридоз, эзофагостомоз, стронгилоидоз, трихоцефалез, хиостронгилез и метастронгилез	П/к		
Собаки	Токсокароз, токсаскаридоз, унцинариоз и анкилостомоз	П/к		

Максимально вводимая доза препарата не должна превышать:

- для крупного рогатого скота – 30 мл;
- для свиней – 20 мл;
- для овец – 4,5 мл.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



ВНИМАНИЕ

Перед массовыми обработками каждую серию препарата предварительно испытывают на небольшой группе животных (5-10 голов), за которыми ведут наблюдение в течение 3 суток. При отсутствии осложнений лекарственное средство применяют всему поголовью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Левамизол 75 нельзя применять совместно, а также в течение 10 дней до и 10 дней после использования фосфорорганических лекарственных препаратов, пирантела, морантела и левомицетина.

ОГРАНИЧЕНИЯ



7 суток



3 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия флакона - 28 суток.



Мерадок®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

10 мг дорамектин

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ АВЕРМЕКТИНОВ, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ИВЕРМЕКТИНУ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ СВЕРХДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ОТ РЕИНВАЗИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Срок защиты от реинвазии - 28 дней;
- Курс лечения – 1 инъекция;
- Преодолевает резистентность к ивермектину;
- Внутримышечное введение.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА


Дорамектин, являющийся основным действующим веществом препарата Мерадок, относится к противопаразитарным лекарственным средствам системного действия класса макроциклических лактонов.

После введения Мерадок **сохраняет защитное действие в течение 28 дней.**

Длительность действия Мерадок (на основе дорамектина) и препарата на основе ивермектина




для перехода на страницу продукта отсканируйте QR-код



Длительность действия препарата Мерадок превосходит цикл развития саркоптоидных клещей, что **гарантирует защиту от реинвазии.**



Динамика изменения концентрации дорамектина в сыворотке крови после применения препарата Мерадок



Применение Мерадок в рекомендуемых дозах для теплокровных **безопасно**. Инъекции препарата безболезненны и не вызывают стресс у животного. Благодаря экономичной дозировке Мерадок вводится одной инъекцией, что менее травмирует животное.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мерадок назначают крупному рогатому скоту, овцам и свиньям для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых нематодами желудочно-кишечного тракта, легких, подкожной клетчатки, слезных протоков, личинками подкожных и носоглоточных оводов, личинками мух, вшами, чесоточными и иксодовыми клещами.



- *Ostertagia ostertagi*
- *O. lyrata*
- *Haemonchus placei*
- *H. similis*
- *Trichostrongylus axei*
- *T. colubriformis*
- *T. longispicularis*
- *Mecistocirrus digitatus*
- *Cooperia oncophora*
- *C. pectinata*
- *C. punctata*
- *C. spatulata*
- *C. sumabada*
- *Nematodirus helvetianus*
- *N. spathiger*
- *Bunostomum phlebotomum*
- *Strongyloides papillosus*
- *Oesophagostomum radiatum*
- *Trichocephalus discolor*
- *Dictyocaulus viviparus*
- *Thelazia* spp.
- *Parafilaria bovicola*
- *Hypoderma bovis*, *Hypoderma lineatum*
- *Haematopinus eurysternus*
- *Linognathus vituli*
- *Solenopotes capillatus*
- *Psoroptes bovis*, *Sarcoptes bovis*, *Chorioptes bovis*
- *Boophilus microplus*
- *Ornithodoros* spp.



- *Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta*
- *Haemonchus contortus*
- *Trichostrongylus axei*
- *T. colubriformis*
- *T. vitrinus*
- *Cooperia curticei*
- *C. oncophora*
- *Oesophagostomum venulosum*
- *Nematodirus* spp.
- *Strongyloides papillosus*
- *Trichocephalus ovis*
- *Dictyocaulus filaria*
- *Psoroptes ovis*, *Sarcoptes ovis*
- *Oestrus ovis*



- *Hyostrogylus rubidus*
- *Ascaris suum*
- *Strongyloides ransomi*
- *Oesophagostomum dentatum*
- *Oesophagostomum quadrispinulatum*
- *Trichocephalus suis*
- *Metastrongylus* spp.
- *Stephanurus dentatus*
- *Haematopinus suis*
- *Sarcoptes scabiei*

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	Нематодозы Арахноэнтомозы	П/к в область шеи	1 мл/50 кг	Однократно
МРС		В/м		
Свиньи			1 мл/33 кг	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

В связи с выделением дорамектина с молоком запрещается применение препарата Мерадок дойным, а также стельным коровам менее чем за 60 суток до предполагаемого отела (начала лактации), дойным, а также суягным овцам менее чем за 70 суток до предполагаемого окота, если молоко планируется использовать в пищевых целях.

ОГРАНИЧЕНИЯ



70 дней - КРС, МРС
77 дней - свиньи

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет со дня производства, после первого вскрытия флакона - не более 90 суток.

Неозидин®

ПОРОШОК, ИНЪЕКЦИОННО

450 мг диминазен, 550 мг феназон

 ПО РЕЦЕПТУ

2,36 г



**БЫСТРОЕ И НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КРОВЕПАРАЗИТОВ
С ВЫГОДНЫМ КУРСОМ ЛЕЧЕНИЯ**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрый лечебный эффект - препарат начинает действовать через 3-5 часов;
- Жаропонижающее и анальгезирующее действие;
- Выгодная стоимость курса лечения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Неозидин обладает широким спектром антипротозойного действия, активен в отношении возбудителей бабезиоза, франсаиеллеза, нутталлиоза, тейлериоза и трипаносомоза, паразитирующих у животных, оказывает противовоспалительное и жаропонижающее действие, способствует уменьшению проницаемости сосудов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Неозидин применяют крупному рогатому скоту, овцам, лошадям и собакам с лечебной и профилактической целью при кровепаразитарных болезнях - бабезиозе (пироплазмозе), франсаиеллезе, нутталлиозе, тейлериозе, трипаносомозе.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Для приготовления инъекционного 7 % раствора во флакон с порошком Неозидин 2,36 г вводят 12,5 мл воды для инъекций или физиологического раствора и получают 13 мл готового к применению препарата. Приготовленный раствор можно хранить в стерильной плотно закрытой емкости в темноте при комнатной температуре в течение суток, в холодильнике – не более 2 суток. Кипячение или нагревание раствора выше 37° С недопустимо.

Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Бабезиоз (пироплазмоз), франсаиеллез, нутталлиоз	В/м	1 мл/20 кг м. ж. (3,5 мг диминазена/1 кг м. ж.)	Однократно
Тейлериоз		1,5 мл/20 кг м. ж. (5 мг диминазена на 1 кг м. ж.)	
Трипаносомоз, вызванный <i>T. brucei</i> (болезнь Нагана)		2,2 мл/20 кг м. ж. (8 мг диминазена на 1 кг м. ж.)	

В случаях, если у больных животных после первого введения Неозидина не снижается температура и не улучшается общее состояние, через 24 часа допускается повторное введение препарата в той же дозе. Больным животным предоставляют покой и дополнительно, в зависимости от физиологического состояния, назначают симптоматические



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





средства (сердечные, антигистаминные, слабительные, витамины, микроэлементы). Собакам перед введением Неозида рекомендуется парентеральное введение антигистаминного средства.

С профилактической целью, при обнаружении в стаде одного или нескольких животных с признаками пироплазмидозов, или после перегона животных в неблагополучную по кровепаразитарным заболеваниям местность, Неозидин применяют однократно в дозе 3,5 мг диминазена на 1 кг массы животного, при необходимости инъекцию повторяют в той же дозе через 10-15 дней. Перед массовой обработкой животных каждую серию препарата Неозидин предварительно испытывают на небольшой группе животных (5-10 голов). При отсутствии осложнений в течение 3-х суток обрабатывают всё поголовье.

При введении препарата в объеме, превышающем 10 мл для крупных животных и 2,5 мл для мелких животных, в связи с возможной болевой реакцией, инъекции следует вводить в несколько мест.

Дозы препарата в зависимости от массы животного и заболевания

Масса животного, (кг)	Доза диминазена на 1 кг массы животного		
	Бабезиоз (пироплазмоз), франсаиллез, нуттаолиоз 3,5 мг	Тейлериоз 5 мг	Трипаносомоз 8 мг
	Объем вводимого 7% раствора (мл)		
10	0,5	0,8	1,1
20	1,0	1,5	2,2
50	2,5	3,5	5,7
100	5,0	7,0	11,5
150	7,5	11,0	17,0
200	10,0	14,0	23,0
250	12,5	18,0	28,5
300	15,0	21,5	34,0
350	17,5	25,0	40,0
400	20,0	29,0	46,0
500	25,0	36,0	57,0

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат нельзя применять одновременно с другими антипротозойными препаратами.

Запрещается использовать Неозидин в течение 4-х недель после вакцинации животного живой вакциной против бабезиоза и анаплазмоза.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Собакам породы шелти, колли препарат следует применять с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

ОГРАНИЧЕНИЯ



21 день



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона препарат хранению не подлежит.

Неозидин® М

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

57,5 мг диминазен, 57,5 мг феназон

 ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл

100 мл



БЫСТРОЕ И УВЕРЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ КРОВЕПАРАЗИТОВ БЛАГОДАРЯ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ФОРМЕ РАСТВОРА ДИМИНАЗЕНА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективность 98,8% с 1 инъекции;
- Быстрый лечебный эффект через 3-5 часов;
- Запатентованная форма повышает эффективность лечения¹;
- Жаропонижающее и анальгезирующее действие;
- Готовый раствор для инъекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Неозидин М обладает широким спектром антипротозойного действия, активен в отношении возбудителей бабезиоза (пироплазмоза), франсаиеллеза, трипаносомоза, тейлериоза и нутталлиоза, паразитирующих у животных.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Неозидин М назначают крупному рогатому скоту, овцам, лошадям и собакам с лечебной и профилактической целью при трипаносомозе, бабезиозе, франсаиеллезе, нутталлиозе, тейлериозе и смешанных инвазиях.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения	Курс лечения
КРС МРС Лошади	Бабезиоз Трипаносомоз Франсаиеллез Нутталлиоз Тейлериоз	В/м	1 мл/20 кг	Однократно	При необходимости повторить через 24 часа
Собаки				Дробно в 2 приема с интервалом в 1-2 часа	

Собакам перед применением Неозидин М необходимо введение инъекционного антигистаминного лекарственного средства согласно его инструкции по применению.

Больным животным предоставляют покой и дополнительно, в зависимости от физиологического состояния, назначают симптоматические средства (сердечные, при атонии кишечника - слабительные).

При введении препарата в объеме, превышающем 10 мл, инъекции следует проводить в несколько мест.

¹ За счёт лучшего проникновения в эритроциты



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





С профилактической целью, при обнаружении в стаде животных с клиническими признаками болезни или после перегона животных в неблагополучную по кровепаразитарным заболеваниям местность, Неозидин М применяют однократно в терапевтической дозе. При необходимости обработку повторяют через 10-15 дней.

Перед массовой обработкой животных Неозидин М предварительно испытывают на небольшой группе (5-10 голов) животных. При отсутствии осложнений обрабатывают все поголовье.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат нельзя применять одновременно с другими препаратами против кровепаразитов.

Запрещается использовать Неозидин М в течение 4-х недель после вакцинации животного живой вакциной против бабезиоза и анаплазмоза.

Собакам породы шелти, колли препарат следует применять с осторожностью под наблюдением ветеринарного врача.

ОГРАНИЧЕНИЯ



21 сутки



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев с даты производства, после вскрытия флакона – 28 суток.

Риказол®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг рикобендазол

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ АНТИГЕЛЬМИНТНЫЙ ПРЕПАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АКТИВНОГО ПРОИЗВОДНОГО АЛЬБЕНДАЗОЛА, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ПРОЧИМ БЕНЗИМИДАЗОЛАМ

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Первый инъекционный препарат на основе активного метаболита альбендазола;
- Одновременное действие на все виды гельминтов;
- 98-100%¹ эффективность применения;
- Быстрое действие и высокая биодоступность;
- Преодоление резистентности к прочим бензимидазолам.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Риказол относится к группе антигельминтных средств. Рикобендазол, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антигельминтного действия в отношении половозрелых и неполовозрелых нематод, цестод, а также половозрелых трематод, обладает овоцидным действием.

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| • <i>Dictyocaulus</i> spp. | • <i>Bunostomum</i> spp. |
| • <i>Haemonchus</i> spp. | • <i>Chabertia ovina</i> |
| • <i>Ostertagia</i> spp. | • <i>Moniezia</i> spp. |
| • <i>Thelazia</i> spp. | • <i>Avitellina centripunctata</i> |
| • <i>Trichostrongylus</i> spp. | • <i>Thysaniezia giardi</i> |
| • <i>Nematodirus</i> spp. | • <i>Fasciola</i> spp. |
| • <i>Cooperia</i> spp. | • <i>Paramphistomum</i> spp. |
| • <i>Oesophagostomum</i> spp. | • <i>Dicrocoelium lanceatum</i> |

Достижение максимальной концентрации в крови



Уникальность рикобендазола заключается в том, что он уже является активным веществом, в отличие от альбендазола, для активации которого требуется целая цепочка биохимических превращений в организме животного.



- Лучший продукт Международной выставки «AgroFarm» 2016г.

¹ Показатель, полученный при применении рикобендазола в дозе 4 мг/кг массы животного при нематодирозе, диктиокаулезе, мониезиозе и стронгилятозе.




для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





Сравнительная антигельминтная активность Риказола и препарата на основе альбендазола



Эффективность дегельминтизации инъекционным препаратом Риказол **превосходит эффективность альбендазола** для орального применения.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Риказол назначают крупному и мелкому рогатому скоту при нематодозах, цестодозах и трематодозах.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Дегельминтизацию животных проводят по показаниям и с профилактической целью – весной перед выгоном на пастбище и осенью перед постановкой на стойловое содержание.

При введении препарата в объеме, превышающем 5 мл для овец и коз, 15 мл – для крупного рогатого скота, инъекции следует проводить в несколько мест. В холодное время года лекарственный препарат перед введением необходимо подогреть до температуры 20-25°C.

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
КРС	Мониезиоз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы	В/м	1 мл/25 кг	Однократно
	Трихоцефалез		1 мл/20 кг	
	Хронический фасциолез, парамфистоматоз, дикроцелиоз		1 мл/12,5 кг	
Овцы и козы	Мониезиоз, тизаниезиоз, авителлиноз, легочные и желудочно-кишечные нематодозы		1 мл/25 кг	
	Хронический фасциолез, дикроцелиоз, парамфистоматоз, трихоцефалез		1 мл/12,5 кг	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказаниями к применению лекарственного препарата является повышенная чувствительность животного к рикабендазолу. Запрещается применение лекарственного препарата при остром франсциозе, во время случного периода, истощенным и больным животным. Запрещается применение лекарственного препарата стельным коровам в первую треть, суягным овцам в первую половину беременности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



30 суток



5 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия – не более 30 суток.

Цифлунит®

РАСТВОР, НАРУЖНО

10 мг цифлутрин

100 мл

500 мл



ИНСЕКТИЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ, ГАРАНТИРУЮЩИЙ ДЛИТЕЛЬНОЮ ЗАЩИТУ КОРОВ И ТЕЛЯТ ОТ ВСЕХ ЛЕТАЮЩИХ НАСЕКОМЫХ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защитное действие до 6 недель;
- Эффективность не зависит от погодных условий;
- Профилактика инфекционных заболеваний КРС, переносчиками которых являются мухи и другие двукрылые;
- Возможность применения телятам массой менее 100 кг;
- Отсутствие раздражающего и токсического эффекта.


ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цифлунит относится к инсектицидным препаратам группы синтетических пиретроидов. Цифлутрин, входящий в состав препарата, обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием, активен в отношении двукрылых насекомых.

- *Haematobia irritans*
- *Haematobia stimulans*
- *Musca autumnalis*
- *Stomoxys calcitrans*
- *Tabanidae*
- *Hypodermatidae*
- *Culicidae*
- *Simuliidae*

Цифлунит обеспечивает надежное защитное действие в течение 4-6 недель против зоофильных мух, слепней, комаров, мошек и подкожных оводов вне зависимости от погодных условий.

Эффективность применения препарата Цифлунит против семейств насекомых¹



¹ Испытания препарата проводили летом в период максимальной численности двукрылых насекомых на КРС выпасного содержания на пастбище в Павловском районе Нижегородской области



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Цифлунит





ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Цифлунит применяют для защиты крупного рогатого скота от зоофильных мух, слепней, оводов, комаров и мошек в пастбищный период.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Обработку крупного рогатого скота проводит ветеринарный врач, фельдшер или специально обученные люди под их руководством. На флакон навинчивают прилагаемый в упаковке дозатор. Цифлунит с помощью дозатора наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца в дозе 10 мл на животное, что соответствует примерно трем нажатиям дозатора, заполненного препаратом. Обработку животных проводят в пастбищный период один раз в 4–6 недель. Дойных коров следует обрабатывать сразу после дойки.

Животным весом менее 300 кг препарат наносят в дозе 1 мл на каждые 50 кг массы тела животного на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Цифлунит не следует наносить на влажную, поврежденную и загрязненную кожу.

Цифлунит не следует применять одновременно с другими инсектоакарицидными препаратами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия бутылки – не более 60 суток.

Цифлунит®-ON

РАСТВОР ДЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ

50 мг цифлутрин

100 мл

1 л

5 л



ПРОВЕРЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНСЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ И ПРИМЫКАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ С ДЕЙСТВИЕМ ДО 3-Х МЕСЯЦЕВ, ПРОТИВ ЧЛЕНИСТОНОГИХ НА ЛЮБОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уничтожает все виды членистоногих;
- Эффективен на всех стадиях развития насекомых;
- Безопасен для металлов, пластмассы, резины и других материалов;
- На основе безопасных растворителей;
- Удобен и эффективен при обработке жилых помещений, дачных участков и территорий вблизи водоемов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Цифлутрин, входящий в состав инсектоакарицидного средства, относится к группе синтетических пиретроидов. Цифлутрин обладает контактным инсектицидным и репеллентным действием, активен в отношении насекомых и клещей, в том числе зоофильных насекомых, включая *Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Stomoxys calcitrans*, слепней (*Tabanidae*), оводов (*Hypodermatidae*), комаров (*Culicidae*) и мошек (*Simuliidae*), а также тараканов, муравьев, жуков-чернотелок (хрущаков) и красного куриного клеща.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Цифлунит-ON применяют для уничтожения тараканов, жуков-чернотелок (хрущаков), муравьев, клопов, блох, комаров, красных куриных клещей, крысиных клещей и других насекомых при обработке помещений и примыкающих территорий.

Средство обладает острой инсектицидной активностью и остаточным действием на насекомых в течение 1-3 месяцев.

РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНЕНИЕ В БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Перед проведением обработки желательно провести механическую очистку и мойку помещения во время санитарного перерыва.

На время обработки из помещений убирают корма, пищевую тару, а также продукцию, которая может адсорбировать инсектоакарицидное средство. В момент обработки в помещении не должны находиться посторонние люди и животные.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





Для уничтожения членистоногих используют свежеприготовленный рабочий раствор Цифлунит-ОН в разведениях, указанных в таблице.

Для приготовления рабочего раствора отмеряют, согласно таблице, необходимое количество инсектоакарицидного средства Цифлунит-ОН, вносят в необходимое количество воды и тщательно перемешивают до полной однородности при комнатной температуре.

Вид членистоногого	Разведение	Количество средства на 1 л воды	Расход рабочего раствора на обработку 1 м ²	
			поверхности, не впитывающей влагу	поверхности, впитывающей влагу
Чернотелка (хрущак), тараканы, красный куриный клещ	1:100	10 мл	50 мл	100 мл
Муравьи, сверчки, мухи (имаго, личинки)	1:200	5 мл		
Клопы, блохи, комары (имаго, личинки), клещи крысиные	1:400	2,5 мл		

Необходимый для обработки объем рабочего раствора готовят непосредственно перед применением. Срок хранения приготовленного рабочего раствора Цифлунит-ОН не должен превышать 24-х часов после его приготовления.

При работе с рабочим раствором Цифлунит-ОН используют распыляющую или опрыскивающую аппаратуру различных марок для нанесения на поверхности.

Норма расхода рабочего раствора может колебаться в зависимости от типа обрабатываемой поверхности: от 50 мл/м² (не впитывающая влагу поверхность) до 100 мл/м² (впитывающая влагу). Убирают нанесенное средство влажным способом - через 24 часа после нанесения, но не позднее чем за 3 часа до начала рабочего дня; из других мест – через 1-3 месяца, или после потери его эффективности. Повторные обработки проводят по энтомологическим показаниям (при появлении насекомых).

Обработку раствором Цифлунит-ОН методом аэрозольного распыления осуществляют в отсутствие птицы, при выключенной вентиляции, в виде тумана, полученного с помощью генератора тумана или другого подобного оборудования. Инсектицидное средство применяется в виде 10% водного раствора (1 часть концентрата и 9 частей воды), с нормой расхода готового раствора 10 литров на 1000 м³.

После окончания аэрозольной обработки кормушки, поилки и оборудование промывают теплой водой, помещение проветривают и просушивают.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Цифлунит-ОН может вступать во взаимодействие с другими инсектоакарицидными средствами, поэтому сочетание его с другими средствами нежелательно, так как это может повлиять на эффективность.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия заводской тары – 28 суток.

Цифлунит® Флок

РАСТВОР, НАРУЖНО

1,13 мг цифлутрин

500 мл



ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСЕКТИЦИД В ФОРМЕ ПУР-ОН ДЛЯ ОВЕЦ И КОЗ ОТ ДВУКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ, ВОЛЬФАРТИОЗА, ВЛАСОЕДА И РУНЦА С ДЛИТЕЛЬНЫМ ПЕРИОДОМ ЗАЩИТЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобная весенняя обработка **во время стрижки**;
- Легкая обработка в зимний период;
- Защита до 4 недель в любое время года;
- Без ограничений по мясу и молоку.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цифлутрин, входящий в состав препарата, обладает выраженным контактным инсектицидным и репеллентным действием, активен в отношении имаго и личинок насекомых, в том числе зоофильных мух (*Haematobia irritans*, *Haematobia stimulans*, *Musca autumnalis*, *Stomoxys calcitrans*, *Wohlfahrtia magnifica*), слепней (*Tabanidae*), комаров (*Culicidae*) и мошек (*Simuliidae*), оводов (*Oestrus ovis*), рунца овечьего (*Melophagus ovinus*), власоедов (*Bovicola ovis*), вшей (*Linognathidae ovillus*, *Linognathidae pedalis*).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Цифлунит Флок применяют овцам и козам с лечебной и профилактической целью против оводов (эстрога), рунца овечьего (мелопфагоза), вшей (сифункулятоза), власоедов (триходектоза), зоофильных мух (вольфартиоза), а также в целях защиты животных от нападения двукрылых насекомых на пастбище.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат наносят наружно однократно животному на кожу спины, раздвинув шерсть, вдоль позвоночника от холки до крестца в следующих дозах:

- 5 мл на животное массой 10-20 кг;
- 7 мл на животное массой 21-30 кг;
- 10 мл на животное массой 31-60 кг.

Животным массой более 60 кг дополнительно наносят по 1 мл препарата на каждые 6 кг веса.

1 НАЖАТИЕ
ДОЗАТОРА =

5 мл
Цифлунит
Флок



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Цифлунит Флок



- Лучший продукт Международной выставки «AgroFarm» 2016г.





ЦИФЛУНИТ ФЛОК ОБЕСПЕЧИТ ДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ОТ НАСЕКОМЫХ - ПАРАЗИТОВ

Эффективность борьбы с вольфартиозом возрастает при применении инсектоакарицидных средств после стрижки

Эффективность препарата Цифлунит Флок против *W. magnifica*

Цифлунит Флок



Цифлунит Флок обеспечивает длительный защитный период после стрижки

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 5 лет со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 60 суток.



АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

									Стр.
	КРС	Лошади	МРС	Свины	Собаки	Кошки	С/х птица	Другие	
Йодопен	•			•					153
Максинон	•								155
Мастенит	•								157
Мастигард	•								159
Мастисан	•								161
Мастомицин	•								162
Миоцид	•								164
Митрек	•								166
Номицеф LC НОВИНКА	•								168
Сенсиверин НОВИНКА	•								170
Сепранол	•								172
Септогель	•								175
Утеротон	•			•					177
Утеротон Форте НОВИНКА	•								179



Йодопен®

СУППОЗИТОРИИ, ВНУТРИМАТОЧНО

в 1 суп. 1,5 г повидон-йод (1,57 % активного йода)

по 2 суп.

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СУППОЗИТОРИИ НА ОСНОВЕ ПОВИДОН-ЙОДА ШИРОКОГО СПЕКТРА АНТИМИКРОБНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕРОДОВЫХ ЭНДОМЕТРИТОВ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий спектр антимикробного действия, присущий активному йоду;
- Отсутствует привыкание микроорганизмов;
- Обильное пенообразование обеспечивает максимальное соприкосновение действующего вещества с эндометрием;
- Не раздражает слизистую оболочку матки;
- Возможность применения в виде раствора.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Йодопен обладает антимикробным, противовоспалительным действием, улучшает пролиферативные процессы в половых органах, сокращает сроки выздоровления животных.

Действующее вещество препарата - органическое соединение йода (повидон-йод) - соединяется с белками микробной клетки, блокируя её дыхательные ферменты, что приводит к гибели.

Микробиологическая эффективность повидон-йода (содержание активного йода 0,1%)			
Вид микроорганизма	Время гибели (сек.)	Вид микроорганизма	Время гибели (сек.)
Staphylococcus aureus	15-30	Pseudomonas aeruginosa	15-30
Proteus vulgares	60-90	Diplococcus pneumoniae	60
Enterobacter spp.	60	Bacillus subtilis	30
Streptococcus faecalis	60	Clostridium septicum	30
Streptococcus pyogenes	60	Escherichia coli	30-60
Streptococcus haemolyticus	15		
Salmonella typhimurium	30		

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Йодопен применяют коровам и свиноматкам для профилактики и лечения острого послеродового эндометрита и других воспалительных заболеваний бактериальной этиологии матки после родовспоможения при осложненных и патологических родах, оперативного отделения последа и абортов.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

Рекомендуем
применять
Йодопен
совместно с
гелем для
ветеринарных
манипуляций на
основе
природных
компонентов -
Гелерон
(стр.237).

Гелерон

Легкость скольжения



250 мл
5 л





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания к применению	Способ введения	Дозировка	Кратность применения
Вводят сразу после отделения последа, аборта или родовспоможения				
КРС, свиньи	С профилактической целью	Суппозитории вводят в полость матки рукой, в полиэтиленовой перчатке разового использования	1 суппозиторий	Однократно
	С лечебной целью			Двукратно, с интервалом 24-48 часов

В особых случаях лечение повторить.

Перед введением суппозитория Йодопен проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста.

Благодаря пенообразующей основе препарата после введения одного суппозитория образуется не менее 300 мл пены, что обеспечивает максимальное соприкосновение действующего вещества с эндометрием.

При закрытии шейки матки и невозможности введения препарата в форме суппозитория, рекомендуется использовать его в виде раствора. Для приготовления раствора рекомендуется растворить один суппозиторий в 150-200 мл предварительно подогретого до 40 °С стерильного физраствора или воды. Разрушение образующейся пены осуществляется механически или с помощью пеногасителей (этиловый спирт). Полученный раствор набрать в шприц Жане или кружку Эсмарха и вводить внутриматочно, медленно при помощи катетера для искусственного осеменения или силиконовой трубки длиной 20-25 см, диаметром 0,5 см, с полистироловой пипеткой на конце. Обработка проводится один раз в сутки, до выздоровления.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение одновременно с другими препаратами для внутриматочного введения.

Йодопен не предназначен для применения животным в период беременности.

ВНИМАНИЕ

Йодопен необходимо хранить в сухом месте, при температуре от 4°С до 25°С.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



24 часа

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев со дня производства, после вскрытия блистера хранению не подлежит.

Максинон®

РАСТВОР, ВНУТРИМАТОЧНО

25 мг левофлоксацин, 10 мг декспантенол

 ПО РЕЦЕПТУ

1 л



НОВЫЙ ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ВНУТРИМАТОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КОРОВ НА ОСНОВЕ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА С МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Фторхинолон последнего поколения в ветеринарии, преодолевающий резистентность к используемым антибиотикам;
- Декспантенол обеспечивает быструю регенерацию и восстановление эндометрия;
- Короткие сроки ограничения на молоко – 2 дня.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внутриматочный раствор Максинон относится к фармакотерапевтической группе фторхинолоны в комбинациях. Входящий в состав препарата Максинон левофлоксацина гемигидрат относится к антибиотикам из группы фторхинолонов и обладает широким спектром действия на аэробные грамположительные и грамотрицательные, анаэробные и другие микроорганизмы:

- *Arcanobacterium spp.*
- *Arcanobacterium pyogenes*
- *Corynebacterium spp.*
- *Enterococcus spp.*
- *Listeria monocytogenes*
- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus spp.*
- *Acinetobacter spp.*
- *Campylobacter spp.*
- *Enterobacter spp.*
- *Escherichia coli*
- *Haemophilus spp.*
- *Klebsiella spp.*
- *Moraxella spp.*
- *Morganella morganii*
- *Pasteurella spp.*
- *Proteus spp.*
- *Proteus vulgaris*
- *Providencia spp.*
- *Pseudomonas spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Serratia spp.*
- *Bacteroides spp.*
- *Clostridium spp.*
- *Fusobacterium spp.*
- *Peptostreptococcus spp.*
- *Chlamydia spp.*
- *Chlamydia psittaci*
- *Mycoplasma spp.*
- *Rickettsia spp.*

D-пантенол - производное пантотеновой кислоты, обладает регенеративными свойствами, стимулирует эпителизацию и заживление кожных покровов и слизистых оболочек, ускоряет митоз и увеличивает прочность коллагеновых волокон, оказывает умеренно выраженное противовоспалительное действие. Не оказывает раздражающего действия на ткани.





ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Максинон применяют для лечения эндометритов и предотвращения развития акушерско-гинекологических заболеваний у коров, вызванных микроорганизмами, чувствительными к левофлоксацину.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед введением препарата проводят санитарную обработку наружных половых органов и корня хвоста. При необходимости освобождают полость матки от воспалительного экссудата.

Максинон вводится внутриматочно с помощью шприца Жанэ, в дозе 50-100 мл на животное, 2-3 раза с интервалом 24 часа до выздоровления.

Для предотвращения послеродовых акушерско-гинекологических заболеваний после родовспоможения при осложненных и патологических родах, оперативного отделения последа и абортс препарат вводят в дозе 150 мл на животное однократно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не предназначен для применения беременным самкам и молодняку, а также животным с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата.

ОГРАНИЧЕНИЯ



9 суток



48 часов

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

Мастенит®

СУСПЕНЗИЯ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

600 мг клоксациллин

ПО РЕЦЕПТУ



3,6 г

АНТИМАСТИТНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КОРОВ В ПЕРИОД СУХОСТОЯ
С ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ БОЛЕЕ 7 НЕДЕЛЬ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Действие 7 недель – весь сухостойный период;
- Широкий спектр активности, в том числе, против штаммов, резистентных к пенициллину;
- Эффективно работает в тканях вымени.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мастенит относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы полусинтетических пенициллинов. Клоксациллин – действующее вещество препарата Мастенит – обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении грамположительных бактерий, обычно выделяемых из секрета вымени в сухостойный период, в том числе:

- **Streptococcus spp.** (включая *Streptococcus agalactiae*)
- **Staphylococcus spp.** (в том числе и штаммов, резистентных к пенициллину)
- **Corynebacterium pyogenes**

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мастенит применяют однократно для лечения мастита коров перед переводом в сухостойный период, но не позднее 42 дней до предполагаемого отела.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат Мастенит вводится коровам непосредственно перед запуском. Перед введением препарата Мастенит необходимо выдоить молоко. Сосок снаружи протирают 70% раствором спирта или специальной антисептической салфеткой. Для спокойных животных снимают только верхнюю часть крышки, закрывающей канюлю шприца, а для беспокойных – снимают полностью. После этого канюлю шприца вводят в отверстие соска и, осторожно надавливая на поршень, вводят лекарственный препарат. В каждую четверть вымени вводят содержимое одного шприца.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не следует применять одновременно с другими препаратами для интрацистернального введения.

Мастенит запрещается применять лактирующим коровам.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



для просмотра
видео
отсканируйте QR-код





ОГРАНИЧЕНИЯ



28 суток



5 суток (после отела)

В случае ошибочного введения препарата лактирующим коровам или если отел произошел ранее 42 дней после введения препарата, молоко можно использовать через 46 суток после введения препарата.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки хранению не подлежит.

Мастигард®

ГЕЛЬ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

1000 мг левофлоксацин, 5 мг нозигептид,
преднизолон 20 мг

ПО РЕЦЕПТУ



10 г

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ КОМПЛЕКС НОВЫХ АНТИБИОТИКОВ И
ПРЕДНИЗОЛОНА ДЛЯ БЫСТРОГО ЛЕЧЕНИЯ ВСЕХ ФОРМ МАСТИТА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Новые антибиотики в составе – левофлоксацин и нозигептид;
- Эффективен против всех известных бактериальных возбудителей маститов, включая золотистый стафилококк;
- Быстрое восстановление продуктивности коровы;
- Выраженное противовоспалительное действие.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мастигард относится к фармакотерапевтической группе – фторхинолоны в комбинациях. Левофлоксацин, входящий в состав препарата Мастигард, оказывает бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы:

- *Acinetobacter* spp.
- *Actinobacillus* spp.
- *Aeromonas* spp.
- *Arcanobacterium pyogenes*
- *Bacillus* spp.
- *Bacteroides* spp.
- *Bacteroides fragilis*
- *Campylobacter* spp.
- *Clostridium* spp.
- *Clostridium perfringens*
- *Corynebacterium* spp.
- *Enterobacter* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Escherichia coli*
- *Fusobacterium* spp.
- *Haemophilus* spp.
- *Haemophilus ducreyi*
- *Haemophilus influenzae*
- *Haemophilus parainfluenzae*
- *Klebsiella* spp.
- *Leptospira* spp.
- *Listeria* spp.
- *Listeria monocytogenes*
- *Moraxella* spp.
- *Moraxella catarrhalis* β +/ β -
- *Morganella* spp.
- *Morganella morganii*
- *Mycobacterium* spp.
- *Pasteurella* spp.
- *Peptostreptococcus* spp.
- *Proteus* spp.
- *Proteus mirabilis*
- *Proteus vulgaris*
- *Providencia* spp.
- *Pseudomonas* spp.
- *Salmonella* spp.
- *Serratia* spp.
- *Staphylococcus* spp.
- *Streptococcus* spp.
- *Streptococcus agalactiae*
- *Streptococcus dysgalactiae*
- *Streptococcus uberis*
- *Trueperella pyogenes*
- *Chlamydia* spp.
- *Chlamydia pneumoniae*
- *Chlamydia psittaci*
- *Mycobacterium* spp.
- *Mycoplasma* spp.
- *Mycoplasma pneumoniae*
- *Rickettsia* spp.
- *Staphylococcus aureus*
- *Staphylococcus intermedius*





Нозигептид, входящий в состав препарата Мастигард, оказывает антимикробное действие на грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, включая:

- **Clostridium spp.**
- **Streptococcus spp.** (в том числе **Streptococcus agalactiae**, **Streptococcus dysgalactiae**, **Streptococcus uberis**)
- **Staphylococcus spp.** (в том числе **Staphylococcus aureus**, продуцирующий бета-лактамазу и коагулазонегативные стафилококки).

Преднизолон, входящий в состав препарата Мастигард, является синтетическим глюкокортикостероидом, оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и противоотечное действие.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мастигард применяют для лечения субклинических и клинических форм мастита у коров в период лактации, вызванных чувствительными к левофлоксацину и нозигептиду микроорганизмами.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед введением препарата Мастигард содержимое доли вымени сдаивают, молоко обеззараживают кипячением и утилизируют. Сосок снаружи протирают 70% раствором спирта или специальной антисептической салфеткой.

Мастигард вводится интрацистернально в дозе 10 г (содержимое 1 шприца) на пораженную четверть вымени. Препарат вводят 1-2-кратно с интервалом 24 часа, при необходимости введение повторить.

При введении спокойным животным снимают только верхнюю часть колпачка, закрывающую канюлю шприца, а беспокойным – колпачок снимают полностью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат не предназначен для одновременного применения с другими интрацистернальными препаратами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



10 суток



4 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки – хранению не подлежит.

Мастисан

СУСПЕНЗИЯ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

28 мг стрептомицин, 14 мг бензилпенициллин,
70 мг сульфадимезин

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



АНТИМАСТИТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В ФОРМЕ МАСЛЯНИСТОЙ ГОМОГЕННОЙ СУСПЕНЗИИ ДЛЯ ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность препарата благодаря синергетическому действию входящих в состав веществ;
- Широкий спектр действия;
- Доступная цена.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Мастисан обладает широким спектром антибактериального действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококки, стрептококки, протей, кишечная палочка, сальмонеллы и др.), обусловленным входящими в состав препарата действующими веществами.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Мастисан применяют для лечения мастита у лактирующих коров.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед введением препарата Мастисан молоко выдаивают из больной четверти вымени и утилизируют, сосок дезинфицируют. Содержимое флакона перед применением нагревают до 36-39°C, тщательно встряхивают до получения равномерной взвеси. Препарат набирают из флакона стерильным шприцем в количестве 5-20 мл, плотно прижимают канюлю шприца к отверстию соскового канала и вводят осторожным нажатием на поршень шприца в сосковую цистерну вымени. После введения проводят легкий массаж соска пораженной четверти вымени снизу вверх. В зависимости от тяжести воспалительного процесса препарат вводят в дозе 5-20 мл с интервалом 24 часа в течение 5-8 дней, а при гнойном и гнойно-катаральном мастите до 10 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат Мастисан не следует назначать одновременно с другими противомаститными препаратами для интрацистернального введения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



3 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства. После вскрытия флакона - 28 суток.





Мастомицин®

ГЕЛЬ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

15 мг гентамицин, 20 мг клиндамицин,
50 мг лидокаин

 ПО РЕЦЕПТУ



10 мл

ПРОТИВОМАСТИТНЫЙ ГЕЛЬ С УНИКАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, УВЕЛИЧИВАЮЩИМИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уникальное сочетание гентамицина и клиндамицина дает синергический эффект;
- Не содержит преднизолон;
- Гелевая основа препарата обладает уникальными свойствами термочувствительности¹;
- Оказывает местное обезболивающее действие;
- Короткие сроки браковки продукции.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Мастомицин обладает широким спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, протей, кишечной палочки, сальмонелл), являющихся основным патогенетическим звеном в возникновении мастита у коров.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мастомицин применяют для лечения различных форм мастита бактериальной этиологии у коров в период лактации.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Мастомицин вводят интрацистернально в дозе 10 мл (1 шприц) на каждую пораженную четверть вымени 2-6 раз (в зависимости от тяжести заболевания) с интервалом 12 часов, вплоть до полного исчезновения симптомов заболевания. Перед введением Мастомицина содержимое соска сдаивают, молоко обеззараживают кипячением и утилизируют, а сосок дезинфицируют. Наконечник шприца вводят в сосковый канал осторожным нажатием на поршень шприца и выдавливают содержимое, после чего проводят легкий массаж четверти вымени и соска в направлении снизу вверх (не проводить массаж при гнойных и гнойно-катаральных формах мастита).

При лечении тяжелых форм маститов у коров для достижения наибольшего терапевтического эффекта и сокращения сроков лечения рекомендуем применение препарата **Мастомицин** в комплексе с инъекционными антибиотиками **Амоксигард**, **Амоксициллин 150**, **Лексофлон**, **Нитокс 200**, **Цефтонит**².

¹При комнатной температуре вязкость геля близка к вязкости жидкости, что облегчает введение препарата. При температуре тела животного гель загустевает, фиксируя антибиотики и лидокаин на эпителии молочной железы, что обеспечивает сохранение концентрации действующего вещества на терапевтическом уровне до следующего введения препарата.

²В зависимости от чувствительности микрофлоры.



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Во время лечения препаратом Мастомицин не рекомендуется применение хлорамфеникола (левомицетина) и макролидных антибиотиков (тилозин, эритромицин, спирамицин), а также одновременное внутриветеринарное введение других препаратов.

ОГРАНИЧЕНИЯ



1 сутки - МЯСО,
3 суток - ВЫМЯ



3 суток

Во время лечения и в течение 72 часов после последнего применения Мастомицина молоко сдаивают в отдельную посуду, обеззараживают кипячением и утилизируют.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства.



Миоцид®

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ В СОСКОВЫЙ КАНАЛ

2,6 г висмута субнитрат



4 г

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ СОСКОВОГО КАНАЛА ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПАТОГЕНОВ В ПЕРИОД СУХОСТОЯ И ПРЕДОТ-
ВРАЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МАСТИТОВ, ИДЕНТИЧНОЙ ЕСТЕС-
ТВЕННОЙ КЕРАТИНОВОЙ ПРОБКЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает заболеваемость маститами;
- Обладает противомикробным и противовоспалительным действием;
- Защищает от проникновения возбудителей маститов;
- Без ограничений на молоко и мясо.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Миоцид относят к группе антисептических средств. Висмута субнитрат, действующее вещество препарата Миоцид, обладает вяжущим, адсорбирующим, противомикробным и противовоспалительным действием. Висмута субнитрат коагулирует белки, образуя на поверхности ткани защитную пленку из денатурированных белков, оказывает сосудосуживающее действие, уменьшает воспаление. После введения препарата Миоцид в сосок вымени образуется сгусток альбумината висмута, который механически закрывает канал, что предотвращает проникновение возбудителей инфекции в вымя и профилактирует возникновение мастита в сухостойный период. Миоцид не резорбируется и не оказывает отрицательного действия на ткани вымени.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Миоцид применяют для профилактики возникновения мастита у коров в сухостойный период.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Миоцид применяют коровам, однократно, после последней дойки, непосредственно перед запуском. Содержимое одного шприца вводят в каждый сосок вымени. Введение лекарственного препарата Миоцид, охлажденного ниже комнатной температуры, может быть затруднено вследствие повышения вязкости.

С целью облегчения введения препарат рекомендуется выдержать до комнатной температуры. Перед введением препарата Миоцид необходимо полностью выдоить молоко из вымени. Сосок снаружи протирают 70% раствором спирта или специальной антисептической салфеткой. Для спокойных животных снимают только верхнюю часть колпачка, закрывающего канюлю шприца, а для беспокойных – снимают полностью. После этого канюлю шприца осторожно вводят в отверстие соска,



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



для просмотра
видео
отсканируйте QR-код



сжимают сосок у основания, и, плавно надавливая на поршень шприца, вводят препарат. После введения препарата сосок вымени и вымя не массировать. Миоцид применяют здоровым коровам. В случае субклинического мастита перед применением препарата Миоцид рекомендуется использовать препарат Мастенит. После отела Миоцид удаляют из соскового канала осторожным выдавливанием пальцами от основания соска.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применять препарат Миоцид при выявлении мастита у животных перед запуском. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата. Запрещается применять препарат в период лактации.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после первого вскрытия первичной упаковки хранения не подлежит.



Митрек®

СУСПЕНЗИЯ, ВНУТРИМАТОЧНО

500 мг цефепирин

 ПО РЕЦЕПТУ



19 г

СУСПЕНЗИЯ ДЛЯ ВНУТРИМАТОЧНОГО ВВЕДЕНИЯ, ЭФФЕКТИВНАЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНДОМЕТРИТА, С МИНИМАЛЬНЫМ СРОКОМ ОЖИДАНИЯ ПО МОЛОКУ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Срок ожидания по молоку 1 день;
- На основе цефалоспоринового антибиотика;
- Однократное применение;
- Шприц с катетером для удобства введения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Входящий в состав препарата цефепирин - антибиотик группы цефалоспоринов - обладает широким спектром бактерицидного действия в отношении:

- *Staphylococcus spp.*
- *Streptococcus pyogenes*
- *Pasteurella spp.*
- *Proteus mirabilis*
- *Fusobacterium spp.*
- *Escherichia coli*
- *Klebsiella spp.*
- *Neisseria spp.*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Enterococcus spp.*
- *Salmonella spp.*
- *Shigella spp.*
- *Haemophilus influenzae*

и других патогенных микроорганизмов, главным образом, выделяемых при подострой и хронической формах эндометрита у коров.

Бактерицидное действие цефепирин заключается в ингибировании синтеза клеточной стенки, что вызывает разрушение цитоплазматической мембраны и гибель бактериальной клетки. Антибиотик устойчив к действию фермента пенициллиназы и сохраняет свою активность в аэробных и анаэробных условиях.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Митрек применяют коровам для лечения подострой и хронической форм эндометрита бактериальной этиологии, а также при скрытых формах эндометрита.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят коровам в полость матки в дозе 19 г (содержимое одного шприца). Для лечения подострой и хронической форм эндометрита препарат Митрек применяют не ранее чем через 14 суток после отела. При необходимости лечение повторяют через 7-14 суток в той же дозе.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Митрек



Для лечения скрытых форм эндометрита препарат вводят через 6-24 часа после осеменения.

Применение препарата Митрек при скрытом эндометрите позволяет излечить 93% коров после первого применения и повысить процент оплодотворяемости на 33%, в отличие от применения внутриматочного раствора, эффективность которого составляет 60%. При этом раствор необходимо применять не менее двух раз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается одновременное применение препарата Митрек и других препаратов для внутриматочного введения, содержащих антибиотики. Запрещено применять стельным коровам.

ОГРАНИЧЕНИЯ



24 часа



24 часа

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки препарат хранению не подлежит.



Номицеф® LC

НОВИНКА

ПО РЕЦЕПТУ

СУСПЕНЗИЯ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

75 мг цефкином



8 г

ИНТРАМАММАРНЫЙ ШПРИЦ НА ОСНОВЕ ЦЕФКИНОМА ОТ КЛЮЧЕВОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - КАЧЕСТВО МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое и эффективное лечение;
- Короткие сроки ограничения на молоко;
- Снижение риска повторных инфекций.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Цефкинома сульфат - цефалоспорин IV-поколения, обладающий широким спектром бактерицидного действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| • <i>Actinomyces pyogenes</i> | • <i>Prevotella spp.</i> |
| • <i>Bacillus spp.</i> | • <i>Proteus spp.</i> |
| • <i>Bacteroides spp.</i> | • <i>Pseudomonas spp.</i> |
| • <i>Citrobacter spp.</i> | • <i>Salmonella spp.</i> |
| • <i>Clostridium spp.</i> | • <i>Serratia spp.</i> |
| • <i>Corynebacterium spp.</i> | • <i>Staphylococcus spp.</i> |
| • <i>Enterobacteriaceae</i> | • <i>Staphylococcus aureus</i> |
| • <i>Enterococcus spp.</i> | • <i>Streptococcus spp.</i> |
| • <i>Escherichia coli</i> | • <i>Streptococcus agalactiae</i> |
| • <i>Klebsiella spp.</i> | • <i>Streptococcus dysgalactiae</i> |
| • <i>Pasteurella spp.</i> | • <i>Streptococcus uberis</i> |

включая штаммы, продуцирующие β -лактамазу.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Номицеф LC применяют для лечения маститов у коров в период лактации, вызванных чувствительными к цефкиному микроорганизмами в том числе: *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* и *Streptococcus uberis*.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Номицеф ЛС вводят после доения, интрацистернально, трёхкратно с интервалом в 12 часов, по 1 шприцу-дозатору в каждую пораженную четверть вымени. Каждый шприц-дозатор предназначен для одноразового использования.

Перед введением препарата Номицеф ЛС содержимое доли вымени сдаивают, молоко обеззараживают кипячением и утилизируют. Сосок снаружи протирают 70% раствором спирта или специальной антисептической салфеткой. При введении спокойным животным снимают только верхнюю часть колпачка, закрывающую канюлю шприца, а беспокойным – колпачок снимают полностью. После этого канюлю шприца вводят в сосковый канал, осторожным нажатием на поршень выдавливают содержимое шприца, затем канюлю извлекают, верхушку соска пережимают пальцами и массирующими движениями снизу-вверх продвигают лекарственный препарат по каналу соска в цистерну вымени. Далее при возможности проводят легкий массаж четверти вымени в направлении снизу-вверх для лучшего распределения лекарственного препарата в цистерне вымени (не проводить массаж вымени при гнойных и гнойно-катаральных формах мастита).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Индивидуальная повышенная чувствительность животного к цефалоспорином, а также к другим β -лактамным антибиотикам.

ОГРАНИЧЕНИЯ



48 часов



84 часа

СРОК ГОДНОСТИ

2 года с даты производства. Содержимое шприца-дозатора необходимо использовать сразу после вскрытия.



Сенсиверин®

НОВИНКА

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

40 мг денаверин гидрохлорид

 ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ С СЕЛЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ НА ОСНОВЕ ДЕНАВЕРИНА ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РОДОВСПОМОЖЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Избирательность действия: снижение сопротивления родовых путей без ослабления родовой активности;
- Качество мировых лидеров;
- Доступность современных решений.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Денаверин гидрохлорид, входящий в состав препарата Сенсиверин, относится к селективным бета-адреноблокаторам, обладает расслабляющим действием на гладкую мускулатуру шейки матки и способствует увеличению эластичности родовых путей. Препарат блокирует отдельные рецепторы матки, тем самым способствует проявлению действия эндогенного окситоцина и нормализует сократительную способность гладкой мускулатуры матки. Денаверин гидрохлорид обладает анестезирующим и противосудорожным действием, а также легким транквилизирующим и жаропонижающим эффектом. Денаверин гидрохлорид быстро метаболизируется в печени и полностью выводится из организма в течение 3-5 часов. Терапевтический эффект денаверина гидрохлорида при подкожном, внутримышечном или интраперитонеальном применении коровам наблюдается через 10-15 минут. Релаксация мышц сохраняется до нескольких часов, а анальгезирующее действие до полутора часов. Денаверин может усиливать действие окситоцина и его аналогов в случае совместного применения. В связи с этим при необходимости совместного применения дозы препаратов должны подбираться индивидуально.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Сенсиверин применяется крупному рогатому скоту (коровам и первотёлкам) для регуляции родовой деятельности и расслабления гладкой мускулатуры шейки матки при:

- родовспоможении (регулирует сокращения матки во время родов);
- патологическом положении плода (неправильные предлежания или членорасположения) с целью его коррекции;
- аномалиях развития плода (крупноплодность, гидроцефалии и др.);
- фетотомии для ограничения риска травмирования родовых путей.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



Действие препарата Сенсиверин начинается через 5-10 минут после введения и полностью проявляется в последующие 10-15 минут.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Нетели: молочная порода	Внутримышечно или подкожно	5,0 мл/животное (200 мг денаверина гидрохлорида на животное)	Однократно
мясная порода		10,0 мл/животное (400 мг денаверина гидрохлорида на животное)	
Коровы		10,0 мл/животное (400 мг денаверина гидрохлорида на животное)	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные средства и симптоматическую терапию.

Запрещается применять в одном шприце совместно с другими препаратами.

Запрещено одновременное применение препарата с другими спазмолитиками.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 дней



0 дней

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.



Сепранол®

СУППОЗИТОРИИ, ВНУТРИМАТОЧНО

60 мг хлоргексидин, 343 мг пропранолол

по 2 суп.

по РЕЦЕПТУ



БЕЗОПАСНЫЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ, СТИМУЛИРУЮЩИЙ АКТИВНОСТЬ МАТКИ, ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЭНДОМЕТРИТОВ КОРОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без антибиотиков и гормонов;
- Стимулирует отделение последа;
- Эффективен против большинства бактерий, а также грибов Candida;
- Предотвращает послеродовые эндометриты¹;
- Воздействует на всю полость матки благодаря пенообразующей форме.




для перехода на страницу продукта отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Хлоргексидина гидрохлорид, входящий в состав препарата Сепранол, обладает широким антибактериальным спектром действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, простейших и грибов.

Сепранол обладает **100%** эффективностью при профилактике послеродовых эндометритов².



Рекомендуем применять **Сепранол** совместно с гелем для ветеринарных манипуляций на основе природных компонентов - **Гелерон** (стр.237).

Гелерон
Легкость скольжения




250 мл
5 л

¹ За счет широкого антибактериального и антимикотического спектра действия и усиления сокращений матки при профилактических обработках.

² Профилактику возникновения послеродовых эндометритов изучали на коровах черно-пестрой «Венгерской» породы в возрасте 3-5 лет, средней упитанности и массой тела 450 кг на базе хозяйства Марковского района Саратовской области.



Препарат Сепранол, образуя обильную пену в полости матки, активно воздействует на слизистую оболочку, заполняя всю область поражённого органа, в отличие от растворов.




РАСТВОР



ПЕНА

Применение препарата Сепранол совместно с антибиотиком при минимальном сроке курса лечения позволяет добиться выздоровления животных в 93% случаев³.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Сепранол применяют коровам для стимуляции отделения последа, профилактики и лечения острого послеродового эндометрита, а также лечения эндометрита, вызванного микроорганизмами, чувствительными к хлоргексидина гидрохлориду.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Дозировка	Длительность курса
КРС	Для отделения последа	2 суппозитория внутриматочно	Однократно
	Для профилактики острых эндометритов		Однократно через 2-4 часа после отделения последа
	Для терапии острых послеродовых эндометритов		Двукратно с интервалом 24 часа
	Для терапии хронических эндометритов		Трехкратно с интервалом 24 часа

³ Сафарова М.И., Панков И.Ю., Панфилова М.Н., Сидоркин В.А. Препарат Сепранол для лечения коров при гнойном эндометрите, осложненном микозами // Ветеринария. 2013. №11. С.33-37



При закрытии шейки матки и невозможности введения суппозитория рекомендуется использовать свежеприготовленный раствор препарата.

Для раствора: 2 суппозитория смешать с 150-200 мл стерильной воды или физраствора, предварительно подогретых до 40° С.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность животного к компонентам препарата.

Запрещается применять одновременно с другими средствами для внутриматочного введения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



48 часов



48 часов

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев со дня производства.

Септогель®

ГЕЛЬ, ИНТРАЦИСТЕРНАЛЬНО

65 мг повидон-йод



10 мл

ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ ПРОТИВОМАСТИТНЫЙ ГЕЛЬ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЛОКА И МЯСА, НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ЙОДА¹

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Без ограничений по использованию молока и мяса;
- Возможно сочетать с антибиотиками, не имеющими ограничений по использованию молока;
- Не содержит гормонов;
- Не вызывает резистентность к микроорганизмам².



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Повидон-йод, входящий в состав препарата Септогель, обладает анти-септическим, дезинфицирующим, бактерицидным, противогрибковым, противопротозойным и противовирусным действием.

ЛЕЧЕНИЕ РАЗНЫХ ФОРМ МАСТИТОВ

Препарат Септогель вводят интрацистернально в дозе 10 мл на четверть вымени:

- при субклиническом и катаральном маститах - 1-3 раза с интервалом 12 часов;
- при фибринозном и гнойном маститах - до клинического выздоровления, с интервалом 12 часов (но не более 10 введений).

При тяжелых формах клинических маститов с целью усиления терапевтического эффекта рекомендуется применять препарат Септогель в составе системной антибиотикотерапии.

Перед введением препарата Септогель необходимо освободить пораженную четверть вымени от содержимого, сосок продезинфицировать. Наконечник ввести в отверстие соскового канала и осторожным нажатием на поршень шприца выдавить содержимое, после чего провести легкий массаж четверти и соска в направлении снизу вверх (не проводить массаж при гнойных и гнойно-катаральных формах мастита).

¹ повидон-йод

² повидон-йод является антисептиком и не вызывает бактериальную резистентность





ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не рекомендуется одновременное применение препарата Септогель с другими противомаститными препаратами, вводимыми интрацистернально. Применение препарата Септогель разрешается не ранее чем через сутки после последнего интрацистернального введения ранее применявшихся препаратов. Не исключается применение других лекарственных препаратов орального и парентерального способов введения.

ОГРАНИЧЕНИЯ



Молоко можно использовать в пищевых целях только после полного исчезновения клинических признаков мастита, подтвержденного соответствующими тестами. Во время лечения молоко из пораженных долей сдаивают в отдельную посуду, обеззараживают кипячением и утилизируют. Молоко, полученное из остальных долей, может быть использовано после кипячения в корм животным.



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 60 суток.

Утеротон®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

5 мг пропранолол

 ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стимулирует мягкие, продолжительные сокращения миометрия матки до 6-8 часов (в отличие от традиционной терапии окситоцином);
- Воздействует на β -адренорецепторы - не блокирует работу эндокринной системы организма в отличие от гормонотерапии;
- Повышает оплодотворяемость после первого осеменения на 20,4% за счет стимуляции миометрия матки;
- Однократное применение Утеротона снижает заболеваемость коров субинволюцией матки приблизительно в 2 раза по сравнению с применением окситоцина;
- Введение препарата сразу после родов позволяет в 1,7-2,2 раза снизить заболеваемость свиноматок «синдромом ММА»;
- Обладает выраженным антистрессовым действием.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Утеротон оказывает блокирующее действие на бета-адренорецепторы миометрия, что способствует проявлению активности эндогенного окситоцина, вследствие чего усиливаются сокращения гладкой мускулатуры матки и молочной железы. Является антагонистом катехоламинов, обладает выраженным антистрессовым действием.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Утеротон применяют для стимуляции родов при атонии, гипотонии матки, профилактики задержания последа, субинволюции матки, для повышения оплодотворяемости, извлечения эмбрионов у коров-доноров, в составе комплексной терапии для лечения послеродового эндометрита у коров и синдрома метрит-мастит-агалактия у свиноматок.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Утеротон вводят внутримышечно или внутривенно.

Показания к применению/Кратность применения	Доза на одно животное, мл	
	Корова	Свиниматка
Стимуляция родовой деятельности и профилактика послеродовых осложнений, однократно в день родов	10	-
Задержание последа, трехкратно с интервалом 12 часов	10	-
Лечение субинволюции матки и послеродовых эндометритов, трёхкратно с интервалом 24 часа (в комбинации с другими препаратами)	10	-
Профилактика синдрома метрит-мастит-агалактия, однократно после родов	-	5
При искусственном осеменении и случке для повышения оплодотворяемости, за 20-30 минут до осеменения	5	5
При извлечении эмбрионов коровам-донорам за 10-15 мин до вымывания	5	-

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Утеротон противопоказан в период беременности и молодняку животных.

Препарат нельзя применять одновременно с адреномиметиками, пропранолол удлиняет действие недеполяризующих миорелаксантов. Седативные и снотворные препараты при одновременном применении с пропранололом усиливают угнетающее действие на ЦНС.

При внутривенном или внутримышечном введении йодсодержащих препаратов на фоне приема пропранолола повышается риск развития анафилактических реакций.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 14 суток.

Утеротон® Форте

НОВИНКА

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

50 мг пропранолол, 30 МЕ окситоцин

ПО РЕЦЕПТУ

100 мл



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает оптимальную продолжительность действия за счет синергетического эффекта;
- Эффективен для профилактики заболеваний в послеотельный период;
- Удобство однократного введения.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Пропранолол оказывает блокирующее действие на бета-адренорецепторы миометрия, что способствует проявлению активности эндогенного окситоцина, вследствие чего усиливаются сокращения гладкой мускулатуры матки и молочной железы. Является антагонистом катехоламинов, обладает выраженным антистрессовым действием.

Окситоцин - синтетический полипептидный аналог гормона задней доли гипофиза. Оказывает стимулирующее действие на гладкую мускулатуру матки, особенно в конце беременности, а также в течение родовой деятельности за счет увеличения проницаемости клеточных мембран для ионов кальция и увеличения его внутриклеточной концентрации. Под влиянием окситоцина снижается потенциал покоя мембраны и повышается ее возбудимость. Вызывает схватки, усиливает сократительную способность матки.

Окситоцин стимулирует секрецию молока, усиливая выработку пролактина передней долей гипофиза. Сокращает миоэпителиальные клетки вокруг альвеол молочных желез, стимулирует поступление молока в крупные протоки или синусы, способствуя усилению отделения молока, в связи с чем лактирующим животным Утеротон Форте рекомендуется применять за 5-15 минут до дойки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Утеротон Форте применяют коровам для:

- стимуляции родовой деятельности (при атонии, гипотонии матки);
- профилактики задержания последа, эндометрита, субинволюции матки;
- лечения послеродового эндометрита у коров в составе комплексной терапии.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Утеротон Форте вводят внутримышечно.

Показания к применению/Кратность применения	Доза на одно животное, мл
Стимуляция родовой деятельности (при атонии, гипотонии матки) Профилактика послеродовых осложнений (в том числе для профилактики задержания последа), однократно	3
Лечения субинволюции матки, однократно	5
Лечение послеродовых эндометритов, однократно	7-10

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Утеротон Форте противопоказан к применению в период беременности и при патологическом расположении плода, а также в случае индивидуальной гиперчувствительности.

Не рекомендуется одновременное применение препарата с: адреномиметиками; недеполяризующими миорелаксантами; седативными и снотворными лекарственными средствами из-за возможного усиления их, в том числе угнетающего действия на ЦНС; йодсодержащими препаратами при внутривенном и внутримышечном их введении в связи с повышением риска развития анафилактических реакций.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.



ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

	 КРС	 Лошади	 МРС	 Свины	 Собаки	 Кошки	 С/х птица	 Другие	Стр.
Регостенон	•								183
Ферголин	•								186
Фертоксел НОВИНКА				•					189



Регостенол

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

0,263 мг D-клопростенол

 ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ГОРМОН ДЛЯ СИНХРОНИЗАЦИИ ОХОТЫ И ТЕРАПИИ БОЛЕЗНЕЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ КОРОВ, СОДЕРЖАЩИЙ ТОЛЬКО АКТИВНЫЙ D-КЛОПРОСТЕНОЛ (ПГФ2α)

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Качество мировых лидеров;
- Высокая активность действующего вещества;
- Экономичное применение;
- Без ограничений на молоко.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Фармакологическая группа - простагландины, тромбоксаны, лейкотриены и их аналоги в комбинациях. D-клопростенол, входящий в состав лекарственного препарата, синтетический аналог простагландина F2α (ПГФ2α). Его применение в лютеиновой фазе полового цикла вызывает регрессию желтого тела и создает условия для начала физиологических процессов, связанных со снижением уровня прогестерона, снятием блокады с гипоталамо-гипофизарной системы и повышением ФСГ и ЛГ в крови животных, что способствует росту фолликулов в яичниках и, как следствие этого, увеличению уровня эстрогенов в крови, появлению половой охоты с последующей овуляцией зрелых фолликулов. D-клопростенол вызывает сокращение гладкой мускулатуры (матки, желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, сосудов).

В организме животных D-клопростенол быстро метаболизируется и выводится в основном с мочой в течение 24 часов.

Эффективность препарата Регостенол при индукции половой охоты*




для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код






Эффективность препарата Регостенол при синхронизации полового цикла*



Эффективность препарата Регостенол при лечении лютеиновых кист*



Эффективность препарата Регостенол при лечении персистентного жёлтого тела*



Эффективность препарата Регостенол при лечении эндометрита*



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Регостенол применяют коровам и телкам для нормализации воспроизводительной функции, синхронизации полового цикла, индукции половой охоты, лечения гинекологических заболеваний, в том числе лечения функциональных расстройств яичников (лютеиновая киста, персистентное желтое тело), лечения фолликулярных кист (в сочетании с хорионическим гонадотропином согласно инструкции по применению), профилактики и лечения послеродовых заболеваний матки, прерывания беременности при патологии плода.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Регостенол вводят глубоко внутримышечно в дозе 1-2 мл на животное, однократно, с соблюдением правил асептики. Выбор дозы в каждом конкретном случае должен определять ветеринарный специалист на основании анамнеза животных в зависимости от сложности патологического процесса и/или от срока наступления клинического эффекта после введения препарата.

* «Оценка терапевтической эффективности лекарственного препарата для ветеринарного применения Регостенол при применении крупному рогатому скоту», испытания проведены в хозяйствах Ленинградской и Волгоградской области, общая численность поголовья 8500 голов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ	СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Индукция половой охоты и синхронизация полового цикла	Регостенол вводят коровам и телкам в любую фазу полового цикла с последующим осеменением при появлении признаков половой охоты. Животным, не пришедшим в охоту на 11-е сутки после первого введения, вводят препарат повторно в той же дозе Если осеменение проводят без выявления охоты, то животных осеменяют через 72 ч и 96 ч после второй инъекции
Лечение функциональных расстройств яичников (лютеиновая киста, персистентное желтое тело)	Регостенол вводят коровам в указанной дозе после установления диагноза с последующим осеменением при появлении признаков половой охоты
Лечение фолликулярных кист	После установления диагноза коровам вводят хорионический гонадотропин, а через 11 суток Регостенол вводят в указанной дозе
Профилактика и лечение послеродовых заболеваний матки (задержание последа, эндометрит, пиометра)	Регостенол вводят коровам в указанной дозе в комплексе со средствами этиотропной, патогенетической и симптоматической терапии При хронических эндометритах возможно повторное введение препарата Регостенол в той же дозе через 10-14 суток
Стимуляция отела и профилактика задержания последа	Регостенол вводят коровам в указанной дозе в день отёла при слабой родовой деятельности, за исключением случаев большого размера и неправильного расположения плода
Прерывание беременности при патологии плода	Регостенол вводят коровам в указанной дозе с 1 недели до 5-го месяца стельности; аборт происходит на 2-7 сутки после инъекции

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению препарата Регостенол является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата, а также период стельности, кроме случаев прерывания беременности при патологии плода или стимуляции отёла. Запрещается применять животным с заболеваниями респираторного или желудочно-кишечного трактов, сопровождающихся спастическим компонентом.

Разрешается применение препарата в период лактации.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



48 часов

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.



Ферголин®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

0,1 мг гонадорелин

 ПО РЕЦЕПТУ

20 мл

50 мл



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ГОРМОН ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА И НОРМАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОРОВ, СОДЕРЖАЩИЙ АКТИВНЫЙ ГОНАДОРЕЛИН (ГнРГ)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Качество мировых лидеров;
- Высокая эффективность;
- Экономичное применение;
- Без ограничений на продукцию животноводства.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ферголин относят к группе гормоны гипоталамуса, гипофиза, гонадотропины и их антагонисты.

Гонадорелин (ГнРГ), входящий в состав лекарственного препарата, является синтетическим аналогом природного гормона гипоталамуса, который стимулирует высвобождение и секрецию из гипофиза гонадотропинов: фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов.

Фармакологические свойства препарата Ферголин связаны с совместным действием этих гормонов: ФСГ стимулирует образование и рост фолликулов, синтез и секрецию эстрогенов, а ЛГ является гормоном, ответственным за созревание фолликула, последующую овуляцию и контроль функции желтого тела. Внутримышечное введение препарата в рекомендованной дозе вызывает быстрое повышение уровней ЛГ и ФСГ в плазме крови, что способствует улучшению качества фолликулогенеза у самок животных. Из места введения гонадорелин быстро всасывается, период полувыведения из плазмы крови составляет около 20 минут. Гонадорелин метаболизируется до неактивных пептидов и аминокислот.


Гонадорелин выводится из организма с мочой и выдыхаемым воздухом.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код




Эффективность препарата Ферголин при стимуляции и синхронизации полового цикла*



Эффективность препарата Ферголин при лечении фолликулярных кист*



Эффективность препарата Ферголин при индукции овуляции*



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ферголин применяют крупному рогатому скоту с целью стимуляции половой охоты, синхронизации полового цикла, индукции овуляции, лечения гипофункции яичников и фолликулярных кист, нормализации полового цикла у коров.

* «Оценка терапевтической эффективности лекарственного препарата для ветеринарного применения Ферголин при применении крупному рогатому скоту», испытания проведены в хозяйствах Ленинградской и Волгоградской области, общая численность поголовья 8500 голов.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ферголин вводят глубоко внутримышечно с соблюдением правил асептики. Доза зависит от вида животного и показания к применению:

ПОКАЗАНИЯ	ДОЗИРОВКА	КУРС ПРИМЕНЕНИЯ
Лечение фолликулярных кист и гипофункции яичников	5 мл	Однократно
Индукция овуляции перед осеменением	2,5 мл	Однократно
Стимуляция половой охоты и синхронизация полового цикла	1-2,5 мл	Однократно
Нормализация полового цикла (в послеродовой период)	1-2,5 мл	Однократно

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

Запрещается применять препарат коровам на поздних сроках беременности.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 часов

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.

Фертоксел®

НОВИНКА

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

4 мг альтреногест

ПО РЕЦЕПТУ

1 л



АЛЬТРЕНОГЕСТ С ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ВКУСОМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА СВИНЕЙ ОТ КЛЮЧЕВОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная формула на высококачественном масле с корректором вкуса;
- Проверенная эффективность;
- Российское производство по GMP гарантирует стабильность поставок.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Альтреногест является синтетическим аналогом прогестагена. Снижает концентрацию эндогенных гонадотропинов (лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ)) в плазме крови, приводит к регрессии фолликулов диаметром более 5 мм, и подавляет рост фолликулов диаметром около 3 мм, что является причиной задержки эструса и овуляции фолликулов в течение всего периода применения лекарственного препарата. После прекращения поступления препарата Фертоксел в организм животных, происходит значительное выделение гонадотропных гормонов (ЛГ и ФСГ) из гипофиза в кровь, стимуляция роста и созревание фолликулов, и синхронное наступление эструса. Альтреногест оказывает существенное влияние на преобразование пролиферативного процесса в эндометрии в секреторный, повышает гипертрофию миометрия и предотвращает спонтанное сокращение матки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Фертоксел применяют половозрелым ремонтным свинкам для синхронизации эструса с целью формирования однородных технологических групп и повышения многоплодия. Свиноматкам Фертоксел применяют после первого опороса для профилактики малоплодия (синдрома второго опороса).





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Фертоксел применяют индивидуально перорально с кормом или принудительно непосредственно в ротовую полость при помощи дозатора. Доза зависит от вида животного:

ВИД ЖИВОТНОГО	ДОЗИРОВКА	КУРС ПРИМЕНЕНИЯ
Половозрелые ремонтные свинки после первого эструса (с 7-9 месячного возраста)	5 мл (альтреногест 20 мг) на животное	Один раз в день в течение 18 дней
Свиноматки, в день отъема поросят	5 мл (альтреногест 20 мг) на животное	Один раз в день в течение 3 дней

При применении Фертоксел с кормом препарат распределяют на поверхность корма непосредственно перед утренним кормлением. На поверхность корма, составляющего половину от общего количества предназначенного для утреннего кормления, при помощи дозатора вносят препарат Фертоксел и после тщательного перемешивания скармливают животным. Комбикорм должен быть распределен таким образом, чтобы каждое животное при групповом содержании имело достаточный доступ для его получения. Вторую половину комбикорма без препарата, предназначенного для утреннего кормления, скармливают животным после того как употреблена полностью его первая часть.

После прекращения дачи препарата синхронизированный эструс, в зависимости от индивидуальных особенностей животных, наступает через 5-7 дней.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Запрещается применение Фертоксел с другими гормональными препаратами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



7 дней

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – не более 2 месяцев.

A
B
C
D

ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

									
	КРС	Лошади	МРС	Свины	Собаки	Кошки	С/х птица	Другие	Стр.
Бутофан	•	•	•	•	•	•		•	193
Бутофан OR 							•		195
Диастатин	•			•					199
Е-селен	•	•	•	•	•	•		•	202
Е-селен OR	•	•	•	•	•	•	•	•	204
Кабуфол НОВИНКА	•								206
Комплекс витаминов А, D ₃ , Е в масле	•	•	•	•	•	•	•	•	208
Минтов							•		210
Нитамин	•	•	•	•	•	•		•	212
Нитамин OR Актив							•		214
Стролитин	•	•	•	•			•		216
Тетравит	•	•	•	•	•			•	220
Тетрагидровит	•	•	•	•	•	•	•	•	222
Ферран	•	•	•	•	•			•	224

Бутофан®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг бутафосфан, 0,05 мг В₁₂ (цианокобаламин)

100 мл



ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СТИМУЛИРУЮЩИЙ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПРОДУКЦИЮ ЖИВОТНОВОДСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращает реабилитационный период;
- Повышает жизнеспособность;
- Улучшает производственные показатели поголовья;
- Повышает сохранность молодняка и взрослого стада;
- Профилактирует бесплодие и послеродовые осложнения;
- Повышает репродуктивность.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Бутофан нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее действие на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию молодняка животных.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат Бутофан назначают крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам и пушным зверям при нарушениях обмена веществ различной этиологии, а также в качестве стимулирующего и тонизирующего средства:

- в целях активизации родовой деятельности и профилактики послеродовых осложнений (тетания матки, родильный парез);
- для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии и неблагоприятным факторам внешней среды;
- для нормализации функций печени, белкового, углеводного и жирового обмена и регенеративных процессов;
- как дополнительное средство при лечении заболеваний, обусловленных недостатком в организме кальция и магния;
- при тяжёлых физических нагрузках и повышенной физической активности у спортивных лошадей (за 2-3 дня до соревнований).



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Доза (мл на животное)	Кратность и курс применения
Взрослые лошади и КРС	Внутримышечно, подкожно или внутривенно (медленно)	10,0-25,0	Один раз в сутки в течение 4-5 дней
Жеребята, телята		5,0-12,0	
Взрослые овцы и козы		2,5-8,0	
Ягнята, козлята		1,5-2,5	
Взрослые свиньи		2,5-10,0	
Поросята-сосуны, подсвинки		1,0-2,5	
Собаки		0,5-5,0	
Кошки, пушные звери		0,5-2,5	

При хроническом течении болезни назначают $\frac{1}{2}$ дозы препарата Бутофан, указанной в таблице. Повторный курс лечения при необходимости проводят с интервалом 5-14 дней.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет со дня производства, после вскрытия флакона - 28 суток.

Бутофан® OR

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

100 мг бутафосфан, 0,0725 мг цианокобаламин (В₁₂)

1 л

5 л



КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕГУЛЯЦИИ КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНОГО ОБМЕНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ, УЛУЧШАЮЩИЙ КАЧЕСТВО КОСТЯКА И СКОРЛУПЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сокращает выбраковку птицы, связанную с низким качеством костяка;
- Сокращает реабилитационный период птицы;
- Стимулирует рост молодняка;
- Снижает бой и насечку.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Бутофан OR нормализует метаболические и регенеративные процессы, оказывает стимулирующее действие на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, повышает резистентность организма к неблагоприятным факторам внешней среды, способствует росту и развитию молодняка птицы.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ВОЗДЕЙСТВИЕ БУТОФАН OR НА МОЛОДНЯК БРОЙЛЕРА

РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ


Бутофан OR позволяет увеличить привесы даже в столь интенсивном производстве, как выращивание бройлерного стада. Комплекс применялся с 7 по 11 день в дозе 2 мл на 1 л питьевой воды.

Живая масса бройлера, г



- Прирост массы тела больше на 4,9%

Конверсия корма, расход корма на 1 кг прироста массы



- Улучшает конверсию корма на 5,2%



- Серебряная медаль Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 2018г.



СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, РАСКЛЁВ (КАННИБАЛИЗМ)

За весь период исследования молодняк бройлера опытной группы имел меньшую интенсивность расклёва.

Интенсивность расклёва у молодняка бройлера, %

**ВОЗДЕЙСТВИЕ БУТОФАН ОР НА КУР-НЕСУШЕК****СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, РАСКЛЁВ (КАННИБАЛИЗМ)**

За весь период исследования куры-несушки опытной группы имели меньшую интенсивность расклёва.

Бутофан ОР применялся с 60-й недели на протяжении первых 5 дней в дозе 3 мл на 1 л питьевой воды.

Интенсивность расклёва у кур-несушек, %

**ЯЙЦЕНОСКОСТЬ КУР-НЕСУШЕК**

За 8 недель наблюдения куры-несушки опытной группы имели превосходство над контрольной по показателям яйценоскости.

Показатели яйценоскости, яиц/голову

Период, нед.	Опытная группа	Контрольная группа
60-62	11,2	11,1
62-64	10,9	10,8
64-66	11,3	10,9
66-68	11,4	11,1
60-68	44,8	43,9

- Увеличение яйценоскости на 2,0 %

У кур-несушек, получавших Бутофан OR, средняя масса яйца превосходила данный показатель контрольной группы.

Средняя масса яйца, г

Возраст, недель	Опытная группа	Контрольная группа
60	61,1	61,2
64	61,9	61,3
68	62,6	61,5

- Увеличение средней массы яйца на 1,75%

СТИМУЛЯЦИЯ ЭМБРИОГЕНЕЗА КУР¹

ДУВКРАТНАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЯИЦ

- ✓ Повышает выводимость яиц на 8%
- ✓ Повышает вывод цыплят на 8%
- ✓ Повышает качество выведенных цыплят до 8,7 балла по системе Пасгар и 9,2 балла по системе Оптистарт

0,5% раствор
Бутофан OR
за 1 час
до закладки
в инкубатор



5% раствор
Бутофан OR
на 19 суток
инкубации

Трансвариальная обработка куриных эмбрионов водным раствором комплекса Бутофан OR стимулирует жизнеспособность и повышает естественную резистентность организма птицы

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Кормовую добавку Бутофан OR назначают сельскохозяйственной птице для нормализации обмена веществ, повышения продуктивности и неспецифической резистентности, в том числе:

- для повышения сохранности поголовья, в том числе при расклеве;
- для повышения сопротивляемости организма к заболеваниям различной этиологии и неблагоприятным факторам внешней среды, в том числе к тепловому стрессу;
- для нормализации функций печени, белкового, углеводного и жирового обмена, регенеративных процессов;
- для повышения продуктивности, стимуляции роста и развития молодняка, улучшения качества яйца.

¹ Исследования проводили с 2014 по 2016 гг. на базе Международного научно-исследовательского центра охраны здоровья человека, животных и окружающей среды» (ООО МНИЦ «ОЗОС»), в экспериментальных хозяйствах Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства» Российской академии наук (ФНЦ «ВНИТИП» РАН), а также в Саратовском государственном аграрном университете имени Н.И. Вавилова (ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»)

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид птицы	Показания	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Куры-несушки, бройлеры	Для повышения сохранности, продуктивности и устойчивости к стрессовым ситуациям	Перорально	2-3 мл/1 л питьевой воды	4-5 дней
Цыплята и рем. молодняк			1-1,5 мл/1 л питьевой воды	
Цыплята-бройлеры	Для снятия теплового стресса		20 мл/1 л питьевой воды	

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона – 28 суток.

Диастатин®

СУСПЕНЗИЯ, ПЕРОРАЛЬНО

80-119 мг хлорид натрия, 59-88 мг хлорид калия,
47-70 мг диоксид кремния, 3,4-5 мг танин,
28-42 мг молочная кислота, 51-76 мг лимонная кислота,
34-51 мг натрий лимоннокислый



500 мл

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕГИДРАТАНТ ДЛЯ БЫСТРОЙ НОРМАЛИЗАЦИИ ПИЩЕВАРЕНИЯ ПРИ ДИАРЕЕ ПОРОСЯТ И ТЕЛЯТ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ЖИЗНИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нормализует pH в кишечнике и баланс электролитов в организме;
- Содержит танины, обеспечивающие вяжущий и уплотняющий эффект;
- Содержит энтеросорбент, нейтрализующий токсины;
- Без антибиотиков в составе.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кормовая добавка Диастатин используется для нормализации процессов пищеварения при функциональных нарушениях работы желудочно-кишечного тракта, легкой и средней степени дегидратации у подсосных поросят и телят молозивного и молочного периодов.

Входящий в состав кормовой добавки неорганический неселективный полифункциональный энтеросорбент на основе высокодисперсного кремнезема обладает сорбционными и детоксикационными свойствами. Танины, входящие в состав кормовой добавки, обладают вяжущими и дубильными свойствами и способствуют лучшему перевариванию и всасыванию питательных веществ, улучшению состояния слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта сельскохозяйственных животных. Макроэлементы поддерживают осмотическое давление в клетках тканей, регулируют водно-электролитный баланс, предупреждая обезвоживание организма, создают оптимальную буферную среду в организме животного с первых дней жизни.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Диастатин используют для нормализации процессов пищеварения при устранении функциональных нарушений работы желудочно-кишечного тракта, легкой и средней степени дегидратации у подсосных поросят и телят молозивного и молочного периодов, вызванных нарушениями технологии содержания и кормления животных, в том числе: сменой рациона, перегруппировкой и скученным содержанием, нахождением в одном помещении разновозрастных животных.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Диастатин применяют перорально индивидуально с помощью дозатора или в смеси с водой (молозивом, молоком) в следующих дозах:



Вид животного	Показания	Способ применения	Дозировка	Курс лечения
Телята	При легкой степени дегидратации	Перорально	10 мл/30-40 кг м.т.ж. 2 раза в сутки	1-3 дня
	При средней степени дегидратации			3-5 дней
Поросята в возрасте до 2 суток	При функциональных нарушениях работы желудочно-кишечного тракта		2 мл 1 раз в сутки	1-2 дня
Поросята в возрасте от 3 до 7 суток			4 мл 1 раз в сутки	

При необходимости Диастатин можно задавать в указанных количествах повторно.

Перед применением Диастатин необходимо тщательно взболтать.

Дозатор после использования промыть и просушить.


1 НАЖАТИЕ ДОЗАТОРА

С ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ
(удобно при применении свиньям) = 2 мл
Диастатин

БЕЗ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА
(удобно при применении КРС) = 5 мл
Диастатин



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ДИАРЕИ ПОРОСЯТ ПОДСОСНОГО ПЕРИОДА В ДОЗЕ 2мл В ДЕНЬ



Эксперимент проведен на 135 головах поросят подсосного периода с клиническими проявлениями диареи в условиях действующего свинокомплекса

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Диастатин совместим с другими кормовыми добавками. В случаях содержания в корме лекарственных препаратов для ветеринарного применения, при использовании Диастатин, возможно снижение эффективности этих лекарственных препаратов в связи с наличием у кормовой добавки адсорбционных свойств.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – 28 суток.

Е-селен®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

**0,5 мг селен (в форме селенита натрия),
50 мг витамин Е**

50 мл

100 мл



ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ В ВИДЕ КОМПЛЕКСА ВИТАМИНА Е И СЕЛЕНА В ИНЪЕКЦИОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА Е И СЕЛЕНА В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выраженное антиоксидантное действие;
- Увеличение привесов и выхода молодняка;
- Иммуностимулирующее, антистрессовое и антитоксическое действие;
- Высокая эффективность при низких дозировках;
- Введение 1 раз в 2-4 месяца;
- Гепатопротекторное действие.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Препарат Е-селен восполняет недостаточность витамина Е и селена в организме животных. Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃, оказывает влияние на состояние иммунитета, общую сопротивляемость организма.

Биологическая роль селена связана с его антиоксидантными свойствами. Он способствует выведению токсических веществ из организма, повышению иммунитета животных.

Введение препарата в организм приводит к быстрому возрастанию уровня витамина Е и селена в организме животных, нормализации обменных процессов.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Е-селен применяют крупному рогатому скоту, мелкому рогатому скоту, лошадям, свиньям, собакам, кошкам и пушным зверям для профилактики и терапии заболеваний, развивающихся на фоне недостаточности витамина Е и селена при:

- нарушениях репродуктивной функции;
- нарушениях развития плода;
- беломышечной болезни, травматическом миозите и кардиопатии;
- задержке роста и недостаточных привесах;
- инфекционных и инвазионных заболеваниях;
- профилактических прививках и дегельминтизациях;
- отравлении нитратами, тяжелыми металлами и микотоксинами;
- стрессах и стрессовых ситуациях;
- токсической дистрофии печени.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят животным внутримышечно или подкожно (лошадям только внутримышечно) в дозах:

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс лечения	
			с профилактической целью	с лечебной целью
Взрослые животные	Внутримышечно или подкожно	1 мл/50 кг м. ж.	1 раз в 2-4 месяца	2-3 раза с интервалом 7-10 дней
Молодняк с/х животных		0,2 мл/10 кг м. т.		
Собаки, кошки, пушные звери		0,04 мл/1 кг м. т.		

Для удобства введения малых объемов препарата его можно разбавить стерильной водой или физраствором и тщательно перемешать.

Лечебная доза может быть увеличена в 1,5 раза, а в регионах, дефицитных по содержанию селена, - до 5 раз.

Доза одному животному не должна превышать: для лошадей – 20 мл; коров – 15 мл; овец, коз, свиней – 5 мл.

Схема применения препарата Е-селен для профилактики беломышечной болезни в геодефицитных по содержанию селена зонах¹

Животные	Способ применения	Доза, мл на 10 кг массы	Интервал, дней	Количество инъекций
Телята, ягнята до 3-х месяцев	Внутримышечно или подкожно	0,5	14	6
Молодняк старше 3-х месяцев		0,2	30	1 (ежемесячно)
Телята, ягнята в группах с заболевшими животными		1,0	7	3
Коровы за 60 дней до отела		15 мл на животное	10-14	3-4
Овцематки за 30 дней до ягнения		0,5	10	2

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Совместное применение с витамином С снижает биодоступность Е-селена. Недопустимо совместное применение с препаратами мышьяка – химический антагонизм. Е-селен разрушается при взаимодействии с тяжелыми металлами (ртуть, медь, свинец, олово).

ОГРАНИЧЕНИЯ



14 суток - СВИНЬИ, МРС,
30 суток - КРС



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 14 суток.

¹ Применение препарата Е-селен по данной схеме допустимо только в хозяйствах, в которых недостаток селена в организме животных подтвержден клиническими и биохимическими исследованиями.

Е-селен® OR

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

**0,5 мг селен (в форме селенита натрия),
50 мг витамин Е**

1 л

5 л



ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ В ФОРМЕ ПЕРОРАЛЬНОГО РАСТВОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА Е И СЕЛЕНА В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Выраженное антиоксидантное действие;
- Увеличение привесов и выхода молодняка;
- Иммуностимулирующее, антистрессовое и антитоксическое действие;
- Высокая эффективность при низких дозировках;
- Гепатопротекторное действие.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃, оказывает влияние на состояние иммунитета, общую сопротивляемость организма.

Биологическая роль селена связана с его антиоксидантными свойствами. Он способствует выведению токсических веществ из организма, повышению иммунитета животных.

Введение препарата в организм приводит к быстрому возрастанию уровня витамина Е и селена в организме животных, нормализации обменных процессов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Е-селен OR применяют для профилактики и лечения заболеваний, вызванных недостатком витамина Е и селена, у сельскохозяйственных животных, в том числе у птиц, а также собак, кошек и пушных зверей.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Показания	Способ введения	Дозировка	Кратность введения
Цыплята, начиная с суточного возраста	С профилактической целью	в смеси с водой или кормом	1 мл/100 кг массы тела (0,1-0,2 мл/1 л питьевой воды)	1 раз в 2-3 недели
	С лечебной целью			2-3 раза с интервалом 1-2 недели
Молодняк и взрослая птица	С профилактической целью		1 мл/100 кг массы тела (0,1-0,2 мл/1 л питьевой воды)	1 раз в месяц
	С лечебной целью			2-3 раза с интервалом 1-2 недели
КРС МРС Лошади	С профилактической целью	в смеси с водой или кормом	1 мл/50 кг м.т. - взрослые жив. 0,5 мл/10 кг - молодняк	1 раз в 2-3 недели
	С лечебной целью			2-3 раза с интервалом 7-10 дней
Поросята	С профилактической целью	в смеси с водой или кормом	0,5 мл/10 кг	1 раз в 2-3 недели
	С лечебной целью			2-3 раза с интервалом 7-10 дней
Свиньи	С профилактической целью	в смеси с водой или кормом	1 мл/50 кг	1 раз в 2-3 недели
	С лечебной целью			2-3 раза с интервалом 7-10 дней
Собаки, кошки, пушные звери	С профилактической целью	в смеси с водой или кормом	0,1 мл/1 кг	1 раз в 2-3 недели
	С лечебной целью			2-3 раза с интервалом 7-10 дней

При необходимости лечебная доза может быть увеличена в 1,5 раза, а в регионах, дефицитных по содержанию селена - до 5 раз.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению служит индивидуальная повышенная чувствительность животных к селену либо избыточное содержание селена в кормах и организме (щелочная болезнь).

Совместное применение с витамином С снижает биодоступность Е-селен ОР. Недопустимо совместное применение с препаратами мышьяка – химический антагонизм.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - 7 суток.

Кабуфол®

НОВИНКА

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

328 мг кальция глюконат, 81 мг кальция глицерофосфат,
42 мг магния хлорид, 8 мг бутафосфан

250 мл

100 мл



КОМПЛЕКС КАЛЬЦИЯ, МАГНИЯ И ФОСФОРА, УСИЛЕННЫЙ БУТАФОСФАНОМ, С МОЩНЫМ СИНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ КОМПОНЕНТОВ, ДЛЯ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРОВ ПОСЛЕ ОТЕЛА, ЛЕЧЕНИЯ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У МОЛОДНЯКА

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Восстанавливает нервно-мышечную проводимость (в том числе в матке) и снимает спазм;
- Повышает неспецифическую резистентность организма к неблагоприятным факторам;
- Первая помощь при лечении острых состояний, вызванных стрессовыми факторами;
- Бутафосфан улучшает обмен кальция, магния и фосфора в организме.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комплексный состав препарата позволяет нормализовать обменные и ассимиляционные процессы, восстановить и сбалансировать соотношение кальция, фосфора и магния в организме. Действующие вещества Кабуфол находятся в соотношении, близком к физиологическому, хорошо и быстро всасываются при парентеральном введении.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Кабуфол применяют крупному рогатому скоту для лечения и профилактики нарушений обмена веществ, связанных с недостатком кальция, фосфора и магния, в том числе: при рахите, остеодистрофии, остеомалации, тетаниях, парезах и других заболеваниях обмена веществ, связанных с недостатком микро- и макроэлементов в организме, а также как дополнительное средство в составе комплексной терапии при токсикозах и аллергиях.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Способ применения	Дозировка	Курс применения
КРС	Подкожно, внутримышечно или внутривенно	2-5 мл/10 кг м.т.ж.	Однократно. При необходимости – повторно в тех же дозах через 24 часа

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказанием к применению препарата Кабуфол является гиперкальциемия, ацидоз, тяжелое нарушение функции почек, мерцательная аритмия предсердий, повышенная чувствительность к компонентам лекарственного препарата.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки - 28 суток.

Комплекс витаминов A, D₃, E в масле

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО, ПЕРОРАЛЬНО

30 000 МЕ витамин A, 40 000 МЕ витамин D₃, 20 мг витамин E

100 мл



ПРЕПАРАТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГИПОВИТАМИНОЗОВ У ЖИВОТНЫХ, ПОВЫШАЮЩИЙ ВЫНОСЛИВОСТЬ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Нормализует обмен веществ и повышает устойчивость к стрессам;
- Обладает иммуностимулирующим действием.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Комплекс витаминов A, D₃, E в масле восполняет недостаток витаминов в организме животных.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Комплекс витаминов A, D₃, E в масле применяется:

- для профилактики и лечения гиповитаминозов;
- для повышения выносливости при стрессах;
- при транспортировке животных;
- при смене рациона;
- во время беременности (только во второй половине);
- в период лактации;
- при нарушениях воспроизводительной функции;
- при задержке роста и недостаточном привесе;
- при инфекционных и инвазионных заболеваниях (как вспомогательное средство);

при ветеринарных мероприятиях:

- профилактических прививках и дегельминтизации;
- после оперативных вмешательств или травм;
- при снижении продуктивности и пониженной прочности скорлупы яиц у кур.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят животным внутримышечно, подкожно или перорально в следующих дозах (мл на животное в сутки):

Вид животного	Доза, мл/гол.	Вид животного	Доза, мл/гол.
Крупный рогатый скот	5-6	Свины	3-5
Лошади	3-5	Поросята-отъемыши	1,5
Телята, жеребята	2-3	Ремонтный молодняк	1,5
Овцы, козы	1-2	Поросята-сосуны	1
Ягнята	1	Новорожденные поросята	0,5
Цыплята	0,1 (только перорально)	Собаки	0,2-1
Несушки	0,2-0,3 (только перорально)	Кролики	0,2

С профилактической целью препарат вводят животным 1 раз в 2-3 недели, с лечебной целью – один раз в 7-10 дней.

Супоросным свиноматкам препарат вводят за 3-4 недели до опороса, сухостойным коровам за 1-1,5 месяца до отела.

При пероральном введении препарат дают животным в смеси с кормом в течение трех недель.

Одновременно с назначением препарата необходимо сбалансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не применять одновременно с кортикостероидами, сердечными гликозидами и тетрациклинами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - 28 суток.

Минтов®

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

5 л

85-115 мг эвкалипта масло эфирное, 35-65 мг мяты перечной масло эфирное, 1-3 мг шалфея масло эфирное, 1-3 мг полыни горькой масло эфирное, 85-115 мг ментол

КОМПЛЕКС ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ЭВКАЛИПТА, МЯТЫ, ШАЛФЕЯ, ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ И МЕНТОЛА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К РЕСПИРАТОРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ПОВЫШЕНИЯ СОХРАННОСТИ И ПРОДУКТИВНОСТИ ПТИЦЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Широкий состав масел;
- Облегчает симптомы при респираторных заболеваниях;
- Стимулирует потребление воды и корма;
- Оказывает позитивное воздействие при тепловом стрессе;
- Подходит для применения перед убоем;
- Не забивает системы поения.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Входящие в состав кормовой добавки натуральные масла эвкалипта, мяты, шалфея, полыни горькой и ментол способствуют улучшению работы респираторных органов, облегчают дыхание, оказывают спазмолитическое, отхаркивающее, противовоспалительное, сосудосуживающее, болеутоляющее действие, стимулируют потребление воды и корма, способствуют улучшению обмена веществ и снижают негативное действие теплового стресса, оказывают адаптогенное действие при неблагоприятных условиях среды и в условиях экстремальных нагрузок, снижают количество поствакцинальных осложнений, способствуют снижению уровня условно патогенной и патогенной микрофлоры в дыхательных путях птицы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Минтов применяют в качестве вспомогательного средства для повышения резистентности к респираторным заболеваниям, а также для повышения сохранности и продуктивности сельскохозяйственной птицы, в периоды стресса (в т. ч. после вакцинации).



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Минтов применяют птице перорально с водой для поения в следующих дозах:

Вид птицы	Дозировка	Длительность курса
Куры-несушки, ремонтный молодняк, цыплята-бройлеры	200 мл на 1000 л питьевой воды	3-4 дня
Индейка	50-100 мл на 1000 л питьевой воды	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Минтов запрещено применять в системе поения одновременно с лекарственными препаратами и другими кормовыми добавками.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения – 2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – не более 28 суток.



Эфирное масло мяты перечной



Ментол



Эфирное масло шалфея



Эфирное масло полыни горькой



Эфирное масло эвкалипта

Нитамин

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

**50 000 МЕ витамин А, 5 000 МЕ витамин D₃,
50 мг витамин Е, 100 мг витамин С**

50 мл

100 мл



**ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ЖИРОРАСТВОРИ-
МЫХ ВИТАМИНОВ В УНИКАЛЬНОЙ ВОДНО-ДИСПЕРСНОЙ ФОРМЕ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ ОРГАНИЗМ ВИТАМИНАМИ НА 2 МЕСЯЦА**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстро восполняет недостаток витаминов;
- Снижает последствия стресса;
- Сбалансированная рецептура;
- Высокая биодоступность;
- Не инкапсулируется в месте инъекции.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нитамин восполняет недостаток витаминов в организме животных. Витамин А регулирует строение, функции и регенерацию эпителиальных тканей и тем самым повышает сопротивляемость против инфекции. Повышенные дозы препятствуют снижению веса и повышают обмен веществ. Витамин D₃ регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в желудочно-кишечном тракте, обладает противорахитным действием. Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃. Витамин С является важным фактором нормального роста и повышает защитные функции организма.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нитамин применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов, нормализации обмена веществ:

- во время беременности (только во второй половине) и в период лактации;
- при нарушениях воспроизводительной функции;
- при задержке роста и недостаточном привесе;
- при инфекционных и инвазионных заболеваниях;
- при проведении профилактической вакцинации и дегельминтизации;
- при оперативных вмешательствах или ранениях;
- при плохой яйценоскости и пониженной прочности скорлупы яиц;
- при стрессовых состояниях;
- при замене кормов на откорме;
- при перемещении животных.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуемые дозы лекарственного препарата с учетом вида животного, возраста и метода введения:

Вид и возраст животного	Способ применения	Дозировка, мл на 10 кг живой массы	Курс и кратность применения
КРС, лошади	Внутримышечно или подкожно	0,2-0,25	Один раз в 4-8 недель
Телята, жеребята		0,2-0,5	
Овцы, козы		0,5-0,8	
Ягнята		1,5-2,0	
Свиньи:			
· Свиноматки		0,3-0,45	
· Свиньи на откорме		0,2-0,3	
· Поросята		0,4-1,0	
Собаки, кошки		0,2-0,3	
Кролики, пушные звери		0,6-1,0	

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Гипервитаминоз и сверхчувствительность к составным частям лекарственного средства.

Препарат нельзя применять одновременно с кортикостероидными гормонами - способствуют выведению витамина D из организма, а также нарушают всасывание и обмен кальция. Одновременное применение препарата с сердечными гликозидами может усиливать их токсическое действие (повышается риск проявления нарушений ритма сердца). Одновременное применение с тетрациклинами увеличивает риск развития внутричерепной гипертензии.

С осторожностью применяют при одновременном назначении НПВС.

Необходимо избегать контакта растворов препарата с дезинфектантами и окислителями.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 14 суток.

Нитамин OR Актив

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

**42500-57500 МЕ витамин А, 4250-5750 МЕ витамин D₃,
42,5-57,5 мг витамин Е, 85-115 мг витамин С**

1 л



УНИКАЛЬНЫЙ СТИМУЛЯТОР, ПОВЫШАЮЩИЙ ПРИВЕСЫ И ПРОДУКТИВНОСТЬ ПТИЦЫ, С ВЫСОКОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая биодоступность благодаря мицеллярной форме витаминов А, D₃, Е, С;
- Повышение стрессоустойчивости в период вакцинации;
- Увеличение привесов молодняка бройлера;
- Повышение интенсивности яйценоскости;
- Обеспечение выхода на производственные показатели яйценоскости и качества яйца;
- Легкое смешивание с водой в любых соотношениях.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Нитамин OR Актив восполняет недостаточность витаминов в организме цыплят и кур. Входящий в состав кормовой добавки витамин А регулирует функции и регенерацию эпителиальных тканей и тем самым повышает сопротивляемость против инфекции. Повышенные дозы препятствуют снижению веса и усиливают обмен веществ. Витамин D₃ регулирует обмен кальция и фосфора и влияет на их всасывание в желудочно-кишечном тракте, обладает противорахитным действием. Витамин Е регулирует окислительно-восстановительные процессы и влияет на углеводно-жировой обмен, усиливает действие витаминов А и D₃. Витамин С является важным фактором нормального роста и повышает защитные функции организма.

Введение кормовой добавки в организм в стрессовых условиях приводит к быстрому возрастанию уровня витаминов в крови, накоплению их в печени и других тканях и, в результате, нормализации обмена веществ, повышению сохранности и продуктивности птицы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Нитамин OR Актив применяют для улучшения сохранности и продуктивности, увеличения яйценоскости кур, снижения вероятности развития метаболических расстройств и сохранения продуктивности птицы в стрессовые периоды.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нитамин OR Актив применяют птице перорально с водой для поения в разовых дозах:

Вид и возраст птицы	Норма ввода	
Сельскохозяйственная птица:	мл/л воды для поения	длительность применения, дней
Цыплята-бройлеры	0,1-0,5	1-3
Молодки, куры-несушки	0,5-1,0	3-5

Разведение кормовой добавки в воде необходимо проводить ступенчато.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Побочных явлений и осложнений при применении Нитамин OR Актив в соответствии с инструкцией не выявлено. Противопоказания не установлены.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия первичной упаковки – не более 7 суток.

Стролитин®

РАСТВОР, ПЕРОРАЛЬНО

50 мг L-карнитин, 250 мг сорбитол, 250 мг магний

1 л

5 л



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает конверсию корма;
- Повышает привесы;
- Увеличивает сохранность поголовья;
- Стабилизирует производственные показатели.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Стролитин обладает анаболическим, антигипоксическим и антитиреоидным действием, стимулирует регенеративную активность тканей, способствует нормализации метаболических процессов, предотвращает остеопороз и активизирует жировой обмен.

L-карнитин, входящий в состав кормовой добавки - аминокислота, родственная витаминам группы B, которая синтезируется в организме из аминокислот лизина, метионина, витаминов C, B₃, B₆, B₉, B₁₂, железа, и ряда ферментов.

L-карнитин находится в мышечной ткани и в печени, где интенсифицирует разрушение молекул жирных кислот. L-карнитин оказывает анаболическое, антигипоксическое и антитиреоидное воздействие, стимулирует регенеративную активность тканей, способствует нормализации метаболических процессов, снижает уровень холестерина, предотвращает остеопороз и апоптоз, улучшает аппетит и активирует жировой обмен. Экзогенный L-карнитин обладает аналогичными эндогенному веществу свойствами.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Стролитин применяют КРС, МРС, лошадям, свиньям и птице:

- для улучшения обмена веществ у сельскохозяйственных животных, в том числе птиц;
- для повышения продуктивности, резистентности организма;
- для улучшения работы печени и почек;
- после перенесенных заболеваний;
- для снижения влияния стрессовых факторов (транспортировка, вакцинация, изменение рациона, тепловой стресс, первые дни жизни, отъем молодняка).



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Стролитин




МОЩНОЕ РОСТОСТИМУЛИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ СТРОЛИТИН НА ПРИМЕРЕ ПОГоловья ПТИЦ

РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У БРОЙЛЕРА¹

Молодняк бройлера, которому задавался Стролитин, показал лучшие результаты по сравнению с контрольной группой.


Комплекс применялся с 1 по 5 день жизни в дозе 1 мл на 1 л питьевой воды.

Живая масса бройлера, г



- Прирост массы тела бройлера больше на 6,9%

Конверсия корма, расход корма на 1 кг прироста массы




- Улучшение конверсии корма на 6,3%

РЕГУЛЯЦИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У КУР-НЕСУШЕК

Цыплята ремонтного молодняка кур-несушек, которым задавался Стролитин, показали лучшие результаты по сравнению с контрольной группой и превысили нормативные технологические показатели, что свидетельствует о мощном ростостимулирующем действии комплекса Стролитин.

Комплекс применялся со 2 по 6 день жизни в дозе 2 мл на 1 л питьевой воды.

Живая масса молодняка кур-несушек, г



- Улучшение конверсии и увеличение среднесуточных приростов на 22,6%
- Прирост массы тела молодняка кур-несушек больше на 18,5%
- Максимальная разница в массе молодняка наблюдалась в конце второй недели и составила более 38,7%

¹ Испытано Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства».

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, СОХРАННОСТЬ²

В течение эксперимента в условиях хозяйства было зафиксировано два периода повышенного отхода цыплят на четвертый и пятнадцатый дни жизни. Данные периоды связаны с физиологическими особенностями развития цыплят и технологическими стрессами, обусловленными технологией промышленного выращивания цыплят в условиях птицефабрики. Стролитин позволяет снизить воздействие негативных факторов.

Падёж цыплят по дням



- Повышает стрессоустойчивость
- Оказывает положительное пролонгированное действие на организм птицы

Показатели сохранности поголовья молодняка кур-несушек

Параметр	Контрольная группа	Опытная группа (Стролитин)
Всего голов	22 400	22 400
Пало голов	320	188
Падёж поголовья, %	1,43	0,84
Сохранность поголовья, %	98,57	99,16

- Сохранность поголовья молодняка кур-несушек больше на 0,6%

² В эксперименте в условиях хозяйства было задействовано 44800 голов цыплят. Цыплята были разбиты на две группы, по 22400 голов в каждой. В исследовании были задействованы клинически здоровые суточные цыплята, ремонтный молодняк кур-несушек.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного		Кратность выпойки	Дозировка	
			общая	для снятия стресса
Молодняк	КРС, лошади	Ежедневно	15 мл на гол./5 дней	20 мл на гол./5 дней
	Свиньи, овцы, козы		1 мл на гол./10 дней	2 мл на гол./5 дней
Взрослые	КРС, лошади		20 мл на гол./10 дней	50 мл на гол./5 дней
	Свиньи, овцы, козы		15 мл на гол./10 дней	40 мл на гол./5 дней
Молодняк и взрослые	Птица		1 мл на литр питьевой воды/5 дней	2 мл на литр питьевой воды/10 дней

Стролитин совместим с кормовыми добавками и лекарственными препаратами, кроме антибиотиков тетрациклинового ряда.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия флакона - не более 28 суток.

Тетравит

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО, ПЕРОРАЛЬНО

50 000 МЕ витамин А, 25 000 МЕ витамин D₃,
20 мг витамин Е, 5 мг витамин F

100 мл



КОМПЛЕКСНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВИТАМИНОВ А, D₃, Е И F В ОРГАНИЗМЕ ЖИВОТНЫХ, ПОВЫШЕНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ В ФОРМЕ РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Возможность перорального, внутримышечного и подкожного введения;
- Повышает выносливость в стрессовых ситуациях;
- Стимуляция иммунной защиты организма;
- Способствует заживлению ран;
- Комплексный состав способствует укреплению костной ткани.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тетравит восполняет недостаток витаминов в организме животных.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тетравит применяют:

- для профилактики и лечения гиповитаминозов;
 - для повышения выносливости в стрессовых ситуациях;
- когда увеличивается потребность в витаминах из-за дополнительных нагрузок:
- во время беременности (только во второй половине);
 - в период лактации, при нарушениях воспроизводительной функции;
 - при транспортировке животных;
 - при замене рациона;
 - при задержке роста и недостаточном привесе;
 - при инфекционных и инвазионных заболеваниях (в качестве вспомогательного средства);
 - при ветеринарных мероприятиях;
 - при проведении профилактических прививок и дегельминтизации;
 - после оперативных вмешательств или травм.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Препарат вводят внутримышечно, подкожно или орально животным в следующих дозах (на животное в сутки):

Вид животного	Доза, мл	Вид животного	Доза, мл
Крупный рогатый скот	5-6	Поросята-отъемыши	1,5
Лошади	3-5	Ремонтный молодняк	2
Телята, жеребята	2-3	Поросята-сосуны	1
Овцы, козы	1-2	Новорожденные поросята	0,5
Ягнята	1	Собаки	0,2-1
Свины	3-5	Кролики	0,2

С профилактической целью препарат вводят животным 1 раз в 2-3 недели, с лечебной целью – один раз в 7-10 дней.

Супоросным свиноматкам препарат вводят за 3-4 недели до опороса, сухостойным коровам за 1-1,5 месяца до отела.

При оральном введении препарат дают животным в смеси с кормом в течение трех недель.

Одновременно с назначением препарата необходимо сбалансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Избегать контакта лекарственного средства с дезинфектантами.

Не применять одновременно с кортикостероидами. С осторожностью применять с НПВС, сердечными гликозидами и тетрациклинами, так как препарат усиливает их действие.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона- 28 суток.

Тетрагидровит

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО, ПЕРОРАЛЬНО

**25000 МЕ витамин А, 5000 МЕ витамин D₃,
25 мг витамин Е, 50 мг витамин С****100 мл**

**ДОСТУПНЫЙ ВОДНОДИСПЕРСНЫЙ КОМПЛЕКС ЖИРОРАСТВОРИ-
МЫХ ВИТАМИНОВ ДЛЯ МОЛОДНЯКА ЖИВОТНЫХ**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает последствия стресса;
- Сбалансированная рецептура;
- Удобная дозировка для молодняка;
- Повышенная биодоступность;
- Не инкапсулируется в месте инъекции и быстро всасывается.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тетрагидровит восполняет недостаток витаминов в организме животных.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Тетрагидровит применяют для профилактики и лечения гиповитаминозов, нормализации обмена веществ:

- во время беременности (только во второй половине) и в период лактации;
- при нарушениях воспроизводительной функции;
- при задержке роста и недостаточном привесе;
- при инфекционных и инвазионных заболеваниях;
- при проведении профилактической вакцинации и дегельминтизации;
- при стрессовых состояниях;
- после оперативных вмешательств или ранений;
- при снижении продуктивности и дополнительных нагрузках;
- при перемещении животных;
- при замене кормов на откорме;
- при плохой яйценоскости и пониженной прочности скорлупы яиц.

Одновременно с назначением препарата необходимо сбалансировать рационы по протеину, кальцию, фосфору, магнию и микроэлементам.



ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Тетрагидровит вводят животным подкожно или внутримышечно, птице - перорально в смеси с водой для поения или кормом.

Рекомендуемые дозы лекарственного препарата с учетом вида животного, возраста и метода введения:

Вид животного	Дозировка	Вид животного	Дозировка
КРС, лошади	0,2-0,25 мл/10 кг м. ж.	Поросята	0,4-1,0 мл/10 кг м. ж.
Телята, жеребята	0,2-0,5 мл/10 кг м. ж.	Собаки, кошки	0,2-0,3 мл/10 кг м. ж.
Овцы, козы	0,5-0,8 мл/10 кг м. ж.	Кролики, пушные звери	0,6-1,0 мл/10 кг м. ж.
Ягнята	1,5-2,0 мл/10 кг м. ж.	Несушки	2,0 мл/1 л воды
Свиноматки	0,3-0,45 мл/10 кг м. ж.	Цыплята	1,5 мл/1 л воды
Свиньи на откорме	0,2-0,3 мл/10 кг м. ж.	Индейки	3,0 мл/1 л воды

С профилактической целью Тетрагидровит применяют 1 раз в 2-3 недели в вышеуказанных дозировках, с лечебной целью дозу и кратность применения увеличивают в 2-3 раза (цыплятам и курам-молодкам применять однократно, а курам-несушкам - двукратно с интервалом в 1-2 недели).

Супоросным свиноматкам Тетрагидровит вводят за 3-4 недели до опороса, сухостойным коровам за 1-1,5 месяца до отела.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Препарат нельзя применять одновременно с кортикостероидными гормонами - способствуют выведению витамина D₃ из организма, а также нарушают всасывание и обмен кальция. Одновременное применение препарата с сердечными гликозидами может усиливать их токсическое действие (повышается риск появления нарушений ритма сердца). Одновременное применение с тетрациклинами увеличивает риск развития внутричерепной гипертензии. С осторожностью применяют при одновременном назначении с НПВС, так как препарат Тетрагидровит усиливает их действие. Необходимо избегать контакта растворов препарата с дезинфектантами и окислителями.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев со дня производства, после вскрытия флакона 14 суток.

Ферран®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

100 мг трехвалентное железо (в комплексе с низкомолекулярным декстраном), **0,005 мг витамин В₁₂**, **0,2 мг витамин В₉**

100 мл



КОМПЛЕКСНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА И ВИТАМИНОВ ГРУППЫ В С ВЫСОКОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ МОЛОДНЯКА, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ПОВЫШЕНИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Двукратное увеличение усвоения железа в организме животного за счет комбинированного состава;
- Способствует росту привесов в первые дни жизни¹;
- Не обладает токсическим эффектом за счет отсутствия фенола в составе, в отличие от других железосодержащих препаратов.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ферран обладает высокой биологической активностью, при парентеральном введении восполняет в организме недостаток железа и витаминов группы В, вызванный экологическими причинами, потерей крови, погрешностями в кормлении или заболеваниями животных.

Клинические испытания доказывают, что применение препарата пороссятам благоприятно сказывается на уровне гемоглобина и биохимических показателях крови животных и способствует дополнительному привесу. По результатам исследований данные показатели при применении препарата Ферран выше, чем при использовании других железосодержащих препаратов.



Клинические испытания препарата Ферран²


		Кол-во введенного железа на голову, мг	Срок исследования - 35 дней жизни									Прирост за 35 дн, %		
Препарат	Состав		Гемоглобин, г/л			Железо, мкмоль/л			Живая масса животных (кг)		Гемоглобин	Железо	Живая масса	
			4 дн	10 дн	35 дн	4 дн	10 дн	35 дн	1 дн	35 дн				
Ферран	Железо декстран (100 мг), витамины группы В	100	81,3	155,2	157,3	16,6	72	73,2	1,20±0,06	8,6±0,16	94%	341%	617%	
Другой железосодержащий препарат	Железо декстран (200 мг)	200	82,4	131,4	140,6	15,5	62,3	64,6	1,20±0,04	8,5±0,12	71%	316%	608%	

¹За счет сбалансированного сочетания железа и витаминов группы В


²«Отчет по исследованию препарата Ферран в сравнении с аналогами для профилактики железодефицитной анемии пороссят». Зав. кафедрой терапии и фармакологии Ставропольского ГАУ, профессор В.А. Оробец. Клинические исследования проводились на 80 пороссятах породы СМ-1.



Динамика содержания железа в крови



Динамика содержания гемоглобина в крови



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ферран применяют молодянку крупного и мелкого рогатого скота, свиньям, жеребяткам, пушным зверям и собакам с лечебной и профилактической целью при анемиях различной этиологии.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Лекарственный препарат вводят животным внутримышечно в область бедра или шеи. При применении Феррана в зимнее время года перед использованием препарат подогревают на водяной бане до 36-39°C.

Вид животного	Дозировка (мл на животное)	Вид животного	Дозировка (мл на животное)
С профилактической целью		С лечебной целью (животным старше 2-недельного возраста)	
Свиноматки за 15-20 дней до опороса	8-10	Поросята	2-3
Поросята на 3-5 дни жизни	1-1,5	Телята и жеребята	6-8
Телята и жеребята на 3-4 дни жизни	4-6	Ягнята	2-3
Ягнята на 5-6 дни жизни	1-1,5	Щенки собак и пушных зверей	2
Щенки собак и пушных зверей на 3-5 день жизни	1		

При тяжелом течении заболевания лекарственное средство вводят повторно через 10-12 дней в тех же дозах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Нельзя применять совместно с антибиотиками группы тетрациклинов, а также пенициллинамином.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 30 суток.

КАБУФОЛ



КОМПЛЕКС КАЛЬЦИЯ, МАГНИЯ И ФОСФОРА, УСИЛЕННЫЙ БУТАФОСФАНОМ, С МОЩНЫМ СИНЕРГЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ КОМПОНЕНТОВ, ДЛЯ БЫСТРОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРОВ ПОСЛЕ ОТЕЛА, ЛЕЧЕНИЯ ГИПОКАЛЬЦИЕМИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ У МОЛОДНЯКА

- ▶ Восстанавливает нервно-мышечную проводимость (в том числе в матке) и снимает спазм
- ▶ Повышает неспецифическую резистентность организма к неблагоприятным факторам
- ▶ Первая помощь при лечении острых состояний, вызванных стрессовыми факторами
- ▶ Бутафосфан улучшает обмен кальция, магния и фосфора в организме

СРЕДСТВА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

	 КРС	 Лошади	 МРС	 Свиньи	 Собаки	 Кошки	 С/х птица	 Другие	Стр.
ГАН	•	•	•	•	•	•	•	•	229
Фулгард	•	•	•	•	•	•	•	•	232



ГАН®

РАСТВОР

50 мг глутаровый альдегид, 50 мг глиоксаль,
100 мг алкилдиметилбензиламмония хлорид

1 л

5 л

20 л



**ВЫГОДНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЪЕКТОВ
ВЕТНАДЗОРА, ОБЛАДАЮЩЕЕ ДОКАЗАННОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ
СВИНЕЙ¹**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективен, сохраняет бактерицидное действие в течение 24 часов при обработке методом орошения и 48 часов при аэрозольной обработке²;
- Широкий спектр бактерицидного, вирулицидного и фунгицидного действия;
- Активен в условиях органических загрязнений и в жесткой воде;
- Не разрушает металлы, пластмассу, резину и другие материалы.

ЗАЩИТНЫЙ
КОСТЮМ
В КОМПЛЕКТЕ!



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ГАН обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью (в том числе против вируса африканской чумы свиней) и фунгицидным действием.

Рабочие растворы ГАН не обладают коррозионной активностью, не портят материалы обрабатываемых поверхностей, не вызывают коррозии металлов, не разрушают пластмассы, резину и другие материалы. Повышенная жесткость воды не снижает активности средства.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

ГАН применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая:

- животноводческие, птицеводческие и звероводческие помещения, находящееся в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты (включая инкубатории, яйцесклады), молочные блоки и кормокухни, санитарно-техническое оборудование, санитарные бойни убойных цехов и пунктов, открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), тару и спецодежду;
- производственные помещения, технологическое оборудование и территорию предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности, а также тару, спецодежду и предметы ухода за животными;
- транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птицы, а также сырья и продукции животного происхождения);
- ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.

¹ Испытания проводились на базе ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии

² Испытания проводились на базе хозяйства Саратовской области в 2006 г.





При вынужденной (текущей и заключительной) дезинфекции перечисленных выше объектов при инфекциях, возбудители которых относятся к группе малоустойчивых (1 группа), устойчивых (2 группа) микроорганизмов и группе вирусов.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Перед проведением дезинфекции проводят механическую очистку и мойку помещений и оборудования.

Рабочие растворы готовят с учетом требуемой для дезинфекции концентрации, путем добавления необходимых количеств средства к водопроводной воде с температурой 8-25°C. При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 100%.

Соотношение ГАН и воды при приготовлении рабочих растворов указано в таблице:

Концентрация рабочего раствора, %	Объем рабочего раствора, л	Требуемое количество	
		ГАН, л	Воды, л
0,5	100	0,5	99,5
1,0	100	1,0	99
2,0	100	2,0	98
4,0	100	4,0	96

РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТ С УЧЕТОМ ЦЕЛИ И МЕТОДА ДЕЗИНФЕКЦИИ

Влажная дезинфекция (метод пенной генерации, орошения и протирания поверхностей)

Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ²
Профилактическая	3 часа	0,5	250 ⁴
Вынужденная (кроме ООИ ³)	24 часа	1	500 ⁴
Вынужденная при ООИ ³	6 часов	2	500
	1 час	4	300

Возможна локальная дезинфекция отдельных, свободных от животных и птиц, стойл, клеток, единиц оборудования, инвентаря и участков поверхностей при обеспечении интенсивной вентиляции и отсутствии людей, животных и птицы в непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

³ Особо опасные инфекции (в т. ч. африканская чума свиней)

⁴ При обработке поверхностей из шероховатых материалов норма расхода рабочего раствора увеличивается до 600 мл/м² (300 мл/м² двукратно с интервалом 60 минут)

Аэрозольная дезинфекция

Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ³
Профилактическая и вынужденная (кроме ООИ ³)	24 часа	10	10

Подготовка дезковриков и дезбарьеров

Вид дезинфекции	Концентрация рабочего раствора, % для заправки дезковриков, дезбарьеров
Профилактическая и вынужденная	1

Замену дезинфицирующего раствора производят по мере необходимости, но не реже чем 2-3 раза в 7 дней.

Для применения рабочих растворов ГАН при отрицательных температурах (до -20°С) рекомендуется готовить рабочий раствор ГАН на основе 30% водного раствора этиленгликоля.



Технологические процессы комплексов и ферм могут способствовать накоплению в местах содержания животных и птицы разнообразной микрофлоры, которая является причиной вспышек инфекционных заболеваний.

Для обеспечения стабильного ветеринарного благополучия животноводства и птицеводства требуется проведение комплекса мер борьбы и профилактики инфекционных болезней.

- **Профилактическую** дезинфекцию проводят в благополучных хозяйствах для предупреждения инфекционных заболеваний. Цель такой дезинфекции - снижение общей микробной контаминации помещений для предотвращения накопления и распространения микроорганизмов в окружающей животных и птиц внешней среде.
- **Вынужденная** дезинфекция включает текущую и заключительную дезинфекцию и выполняется в хозяйствах, неблагополучных по инфекционным болезням животных и птицы, с целью локализации первичного очага инфекции, предотвращения распространения болезни внутри хозяйства и за его пределами.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия - не более 30 суток.

³ Особо опасные инфекции (в т. ч. африканская чума свиней)



Фулгард®

РАСТВОР

250 мг глутаровый альдегид,
210 мг алкилдиметилбензиламмония хлорид,
30 мг дидецилдиметиламмония хлорид

1 л

5 л

20 л



**ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕЗИНФЕКТАНТ С ВЫГОДНОЙ
СТОИМОСТЬЮ ОБРАБОТКИ И МИНИМАЛЬНОЙ ЭКСПО-
ЗИЦИЕЙ**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокоэффективен против патогенов 1, 2, 3 и 4 групп устойчивости¹, в особенности против вируса АЧС²;
- Выгодная стоимость обработки;
- Экспозиция при профилактике - 20 минут;
- Не разрушает металлы, пластмассу, резину и другие материалы.

ЗАЩИТНЫЙ
КОСТЮМ
В КОМПЛЕКТЕ!



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



видео о продукте
Фулгард
(свиноводство)

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Дезинфицирующее средство Фулгард® обладает бактерицидным действием в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирулицидной активностью (в том числе против вируса африканской и классической чумы свиней) и фунгицидным действием (в том числе против спорообразующих форм, дрожжей и плесени), средство эффективно против патогенов I-IV групп устойчивости. Механизм действия заключается в нарушении окислительно-восстановительных процессов в микробной клетке путем вступления в реакцию с аминокруппами белков микроорганизмов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Фулгард применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая:

- животноводческие, птицеводческие и звероводческие помещения, находящееся в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты и окружающие их территории (включая инкубатории, яйцесклады, территории выгулов и дорог), молочные блоки и кормокухни, санитарно-техническое оборудование, санбойни, убойные цеха и пункты, открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), тару и спецодежду;
- производственные помещения, технологическое оборудование и территорию предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности, а также тару, спецодежду и предметы ухода за животными;



¹ По результатам ФБУН НИИД Роспотребнадзора, «Протокол микробиологических исследований № 02-111.Н/17, от 03.07.2017».

² По результатам ГНУ ВНИИВВиМ Россельхозакадемии, «Отчет испытаний дезинфицирующей активности средства «Фулгард» производства ООО «НИТА-ФАРМ» в отношении возбудителя АЧС».

- транспортные средства (включая автомобильный, железнодорожный, водный и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птицы, а также сырья и продукции животного происхождения);
- ветеринарные клиники (станции), лаборатории, виварии, цирки и зоопарки.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Перед проведением дезинфекции проводят механическую очистку и мойку помещений и оборудования.

Рабочие растворы готовят с учетом требуемой для дезинфекции концентрации, путем добавления необходимых количеств средства к водопроводной воде с температурой 8-25°C. При расчете концентрации рабочих растворов средство принимают за 100% вещество.

РАБОЧИЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТ С УЧЕТОМ ЦЕЛИ И МЕТОДА ДЕЗИНФЕКЦИИ

Дезинфекция при АЧС

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОТИВ АЧС
ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ 0,3%

Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ²
Метод орошения. Вынужденная при АЧС	30 минут	0,3	300

Влажная дезинфекция (метод пенной генерации, орошения и протирания поверхностей)

Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ²
Профилактическая	20-30 минут	0,15	250-350
Вынужденная (кроме ООИ ³)	3 часа	0,3	200-400
Вынужденная при ООИ ³	3 часа	1	200-400

Возможна локальная дезинфекция отдельных, свободных от животных и птицы, стойл, клеток, единиц оборудования, инвентаря и участков поверхностей при обеспечении интенсивной вентиляции и отсутствии людей, животных и птицы в непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

Аэрозольная дезинфекция

Вид дезинфекции	Экспозиция, время	Концентрация раствора, %	Норма расхода раствора, мл/м ³
Профилактическая и вынужденная (кроме ООИ ³)	6 часов	30	2,5

³ Особо опасные инфекции



Подготовка дезковриков и дезбарьеров

Вид дезинфекции	Концентрация рабочего раствора, % для заправки дезковриков, дезбарьеров
Профилактическая и вынужденная	0,6 (в зимнее время - до 1,3-2%)

Замену дезинфицирующего раствора производят по мере необходимости, но не реже 2 раз в 7 дней.

Для применения рабочих растворов Фулгард при отрицательных температурах (до -20°C) рекомендуется готовить рабочий раствор Фулгард на основе 30% водного раствора этиленгликоля.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения – 3 года со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов – не более 30 суток.



ДРУГИЕ ФАРМ-ГРУППЫ

									
	КРС	Лошади	МРС	Свиньи	Собаки	Кошки	С/х птица	Другие	Стр.
Гелерон	•	•	•	•	•	•		•	237
Гель двойного действия	•	•	•	•	•	•		•	238
Кальция борглюконат 20%	•	•	•	•	•				239
Кофеин-бензоат натрия 20%	•	•	•	•	•				241
Ксиланит	•	•	•		•	•			243
Септо-спрей	•	•	•	•	•	•		•	246

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

248



Гелерон®

ГЕЛЬ, НАРУЖНО

Фитокомплекс из эфирных масел растений: апельсин, бергамот, жасмин, иланг-иланг, розовое дерево, ромашка, пихта

250 мл

5 л



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛУБРИКАНТ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- 3 в 1: применение при родовспоможении, УЗИ, осеменении;
- Легкость проведения процедур;
- Особый состав обеспечивает улучшенное скольжение;
- Легко смывается.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Лубрикант Гелерон представляет собой гель на водной основе, обеспечивающий длительное скольжение и увлажнение, не обладает адгезивными свойствами. Благодаря нейтральному значению pH не раздражает кожу и слизистые оболочки. После нанесения на обрабатываемую поверхность не высыхает и сохраняет свои качества в течение 15-20 минут на открытом воздухе. Гель совместим с акушерскими перчатками из полиэтилена и латекса. Легко смывается водой.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Лубрикант Гелерон рекомендуется применять:

- для лучшего скольжения, уменьшения раздражения и болезненных ощущений при ректальном обследовании, а также при осеменении ректоцервикальным способом;
- для обработки рук ветеринарного специалиста перед манипуляциями (в перчатках и без перчаток);
- для обработки ветеринарного инструментария (зондов, катетеров, акушерских инструментов и т.п.);
- для УЗИ – исследований;
- для обработки сосков животных во время и после доения.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

При использовании средства доза определяется ветеринарным специалистом в зависимости от вида манипуляции.

Лубрикант Гелерон применяют наружно и местно, нанося руками в необходимых количествах и распределяя по всей обрабатываемой поверхности.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Противопоказания при использовании геля отсутствуют.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства.

WWW.NITA-FARM.RU



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





Гель двойного действия

ГЕЛЬ, НАРУЖНО

Ментол, экстракт красного перца,
эфирные масла гвоздики и эвкалипта, экстракт прополиса

250 мл



ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПРОЦЕССОВ КРОВО-ОБРАЩЕНИЯ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ НА ОСНОВЕ ЭКСТРАКТОВ НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Сверхкритический углекислый экстракт натурального перца красного жгучего бережно сохраняет все природные компоненты, создавая особый эффект разогрева;
- Охлаждающее действие эфирных масел останавливает развитие воспалительных процессов.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Представляет собой гель на водной основе, обладающий охлаждающе-разогревающим действием. За счет специально подобранного фитокомплекса обладает успокаивающим действием, оказывает пролонгированное действие на микроциркуляцию и обменные процессы путем чередования тонизирования (охлаждающее действие ментола и масла эвкалипта) и релаксации (согревающий эффект экстракта красного перца), устраняет застойные явления. Специально разработанная основа геля облегчает негативные ощущения, способствует проникновению активных компонентов геля.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гель двойного действия назначается:

- для восстановления после интенсивных физических нагрузок в сочетании с приемами массажа;
- для усиления микроциркуляции крови и лимфы для снятия отечности, дискомфорта и для ускорения выведения молочной кислоты из мышц после физических нагрузок;
- для создания охлаждающего, а затем согревающего эффектов в коже и подлежащих тканях;
- для ускорения процессов восстановления тканей.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Гель двойного действия применяют наружно и местно, нанося тонким слоем на сухую чистую поверхность кожи в необходимых количествах, распределяя по всей обрабатываемой поверхности, массируя до полного впитывания. Рекомендуемая кратность применения – 2 раза в день.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Не наносить на слизистые оболочки и поврежденную кожу.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код



Кальция борглюконат 20%

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

200 мг кальция глюконат, 18,5 мг борная кислота,
13 мг натрия тетраборат

100 мл

250 мл



ПРЕПАРАТ С ДЕСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИМ, АНТИТОКСИЧЕСКИМ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отсутствует раздражающий ткани эффект;
- Возможность подкожного применения.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Оказывает десенсибилизирующее, антитоксическое и противовоспалительное действие; повышает в крови уровень ионизированного кальция, необходимого для осуществления процесса передачи нервных импульсов, сокращения поперечнополосатых и гладких мышц, усиления сокращения сердечной мышцы, формирования костной ткани, свертывания крови.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Препарат применяют с лечебной и профилактической целями при следующих болезнях животных:

- послеродовой парез, спазмофилия, эклампсия, шоковое состояние, рахит, тетания, остеомалация;
- задержание последа, предродовое и послеродовое залеживание;
- аллергические заболевания (крапивница, сывороточная болезнь);
- отравление солями магния, токсические поражения печени.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Борглюконат кальция, подогретый до температуры 35-37°C, вводят животным внутривенно (медленно) или подкожно из расчета 0,5 мл на 1 кг массы животного. При подкожных инъекциях дозу препарата вводят дробно в разные места. Препарат вводят животным однократно, а при необходимости повторно в тех же дозах через 24 часа.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код





Максимальные разовые дозы (мл на животное):

Вид животного	мл на гол.
Крупный рогатый скот	250-300
Лошади	150-200
Овцы и козы	50-100
Свиньи	30-100
Собаки	5-25

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, гиперкальциемия, повышенная свертываемость крови, диарея, дегидратация, органическое поражение почек.

Недопустимо совместное применение с карбонатами, салицилатами, сульфатами, антибиотиками тетрациклинового ряда, сердечными гликозидами.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 2 суток.

Кофеин-бензоат натрия 20%

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

75 мг кофеин, 120 мг бензоат натрия

20 мл

100 мл



ПРЕПАРАТ ВОЗБУЖДАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ У ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Первое средство при реанимации.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Кофеин-бензоат натрия обладает возбуждающим действием на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы животных. Он усиливает и регулирует процессы возбуждения в коре головного мозга, усиливает положительные условные рефлексы и повышает двигательную активность. Стимулирующее действие кофеина приводит к повышению физической работоспособности, уменьшению усталости и сонливости.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Кофеин-бензоат натрия 20% назначают лошадям, крупному рогатому скоту, овцам, козам, свиньям, собакам. Применяют для возбуждения центральной нервной системы при отравлении ядами, переутомлении, мышечной слабости при различных заболеваниях.

Применяют с целью возбуждения сердечно-сосудистой системы при слабости сердечной деятельности, пониженной возбудимости и проводимости в сердце, шоковых состояниях. Применяют при хроническом миокардите, миодистрофиях, хронических миодегенерациях, в качестве сосудорасширяющего средства при спазмах сосудов головного мозга, почек, сердца.





ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Кофеин-бензоат натрия 20% применяют подкожно в следующих дозах (мл на одно животное):

Вид животного	Доза, мл
Лошади и крупный рогатый скот	5-10
Овцы, козы и свиньи	0,5-2
Собаки	0,2-0,5

Дозы и сроки применения зависят от массы животного и течения болезни.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Выраженная гипертензия, возбужденное состояние.

Запрещается смешивать в одном шприце с препаратами, содержащими дубильные вещества, а также с препаратами, обладающими кислой реакцией.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

3 года со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.

Ксиланит®

РАСТВОР, ИНЪЕКЦИОННО

20 мг ксилазин

 ПО РЕЦЕПТУ

50 мл



ЭФФЕКТИВНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ СЕДАТИВНОЕ, МИОРЕЛАКСИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает беспокойство животных при проведении ветеринарных обработок;
- Безопасно обездвиживает животных для проведения легких оперативных вмешательств.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Ксилазина гидрохлорид, входящий в состав лекарственного средства, является антагонистом центральных α_2 -адренорецепторов, оказывает успокаивающее, миорелаксационное и обезболивающее действие, стимулирует как центральные, так и периферические альфа-рецепторы.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Ксиланит предназначен для применения сельскохозяйственным животным, собакам и кошкам с целью успокоения, обезболивания и миорелаксации при проведении клинического осмотра, рентгенологических исследований, для обездвиживания беспокойных и агрессивных животных, в том числе во время транспортировки; в качестве средства премедикации при оперативных вмешательствах, болезненных манипуляциях, а также для местной и общей анестезии.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Ксиланит вводят внутримышечно или внутривенно (медленно, в течение 1-2 минут).



Крупному рогатому скоту Ксиланит вводят внутримышечно в зависимости от показаний в дозе 0,25-1,5 мл на 100 кг массы животного (0,05-0,3 мг ксилазина гидрохлорида на 1 кг массы животного). В зависимости от применяемой дозы Ксиланита у животного наблюдается седация и миорелаксация разной степени:

а) 0,25 мл/ 100 кг – **легкий седативный эффект** с понижением тонуса мускулатуры и сохранением положения тела в пространстве. Используют для успокоения животного.

б) 0,5 мл/ 100 кг – **умеренная седация**, с выраженным снижением мышечного тонуса (животное, как правило, сохраняет вертикальное положение) и некоторым анальгетическим эффектом. Используют для



проведения клинических исследований, малых хирургических вмешательств преимущественно в комбинации с местной анестезией.

в) 1,0 мл/ 100 кг массы животного – **выраженная седация** и снижение мышечного тонуса (животное лежит), высокая степень анестезии. Используют для длительных хирургических вмешательств с возможным дополнением местной или общей анестезией.

г) 1,5 мл/ 100 кг – **глубокая седация**, с полным снижением мышечного тонуса и высокой степенью аналгезии. Используется только взрослым животным после предварительной голодной диеты при очень болезненных и продолжительных операциях и при родовспоможении.



Мелкому рогатому скоту Ксиланит вводят внутримышечно в зависимости от показаний в дозе 0,05-0,25 мл на 10 кг массы животного (0,1-0,5 мг ксилазина гидрохлорида на 1 кг массы животного).



Лошадям Ксиланит вводят в дозе 7,5-15,0 мл/100 кг (1,5-3,0 мг ксилазина гидрохлорида на 1 кг массы животного) внутримышечно или 3,0-5,0 мл/100 кг (0,6-1,0 мг ксилазина гидрохлорида на 1 кг массы животного) внутривенно струйно медленно, в зависимости от показаний и типа высшей нервной деятельности животного.

Седативный эффект наступает обычно в течение 5 минут после введения и продолжается около 20 минут. Легко возбудимым животным лекарственное средство вводят в максимальной дозе; вводить препарат при спинном положении животного не рекомендуется.



Собакам при проведении манипуляций, не сопровождающихся болевыми проявлениями, Ксиланит вводят внутримышечно в дозе 0,5-1,0 мл/ 10кг (1-2 мг ксилазина гидрохлорида на 1 кг массы животного), кошкам – внутримышечно или подкожно в дозе 0,15 мл/кг (3 мг ксилазина гидрохлорида на 1 кг массы животного).

При болезненных манипуляциях возможно сочетанное применение Ксиланита с другими лекарственными средствами (барбитуратами, анальгетиками или местными анестетиками).

Анестезия с помощью барбитуратов должна проводиться не ранее, чем через 20 минут после введения Ксиланита, то есть после достижения глубокой седации. При соблюдении этих условий дозировка барбитуратов должна быть снижена в два-три раза.

Животных до наступления полного действия Ксиланита не следует беспокоить. Если необходимая глубина седации не достигнута, дополнительные инъекции для достижения желаемого эффекта не рекомендуются. Повторное введение Ксиланита в более высокой дозе возможно не ранее, чем через 24 часа, после полного восстановления физиологического состояния животного.

Животные после применения Ксиланита должны находиться под наблюдением до полного восстановления их физиологического состояния. При применении

Ксиланита в комбинации с каталептическими и анестезирующими препаратами их дозировка должна быть уменьшена в два или три раза от указанной в инструкции по применению. У некоторых животных после применения Ксиланита может наблюдаться кратковременное снижение кровяного давления, учащение пульса и дыхательных движений, указанные симптомы исчезают самопроизвольно и обычно не требуют дополнительного ветеринарного вмешательства. В случае выраженной дыхательной недостаточности животному проводят массаж грудной клетки для восстановления нормального дыхания.

У крупного рогатого скота высокие дозы Ксиланита могут вызвать гиперсаливацию. При проведении операций у крупного рогатого скота в боковом или спинном положении следует поддерживать грудную клетку и, при возможности, наклонить голову и шею для предупреждения аспирации слюны или рубцовой жидкости. Снижению саливации способствует применение атропина сульфата. В целях предотвращения рвоты у собак и кошек животных до применения Ксиланита необходимо выдержать на голодной диете в течение 6-24 часов.

При передозировке и остановке дыхания животному рекомендуется душ холодной водой и искусственное дыхание.

Специфическими антидотами ксилазина гидрохлорида являются блокаторы альфа-адренорецепторов (например, антипамезол), которые применяют животным в соответствии с инструкциями.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Ксиланит запрещается применять самкам в последнюю треть беременности в связи с окситоциноподобным эффектом на матку (кроме случаев родовспоможения), животным при механическом повреждении желудочно-кишечного тракта (закупорка пищевода, заворот желудка, грыжа), с нарушением проводимости сердечной мышцы в анамнезе. Животным при болезнях легких лекарственное средство следует применять с осторожностью.

ОГРАНИЧЕНИЯ



5 суток



4 суток

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет со дня производства, после вскрытия упаковки – не более 28 суток.



Септо-спрей®

РАСТВОР, НАРУЖНО

30 мг повидон-йод

100 мл



СОВРЕМЕННЫЙ АНТИСЕПТИК ДЛЯ МЕСТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПОВИДОН-ЙОДА¹, ОБЛАДАЮЩИЙ БЕЗБОЛЕЗНЕННЫМ, НО ПРИ ЭТОМ БОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- При нанесении отсутствует стресс у животных, так как не вызывает ожога кожи и слизистых оболочек благодаря мягкому действию водного раствора органического йода и, в том числе, отсутствию агрессивных растворителей, подобных спирту;
- Более выраженное противомикробное действие благодаря комплексу повидон-йода. Высвобождение активного йода происходит плавно, что способствует более продолжительному контакту антисептика с патогенной средой;
- Защита от попадания в рану вредоносных микроорганизмов благодаря образованию тонкой защитной плёнки на наносимой поверхности;
- Активен в отношении всех видов микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, простейших) благодаря свойствам повидон-йода;
- Отсутствие резистентной микрофлоры;
- Возможность нанесения на слизистые оболочки полости рта и др.



для перехода на
страницу продукта
отсканируйте QR-код

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Септо-спрей является антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим средством.

Йод активен в отношении всех видов микроорганизмов (бактерий, вирусов, грибов, простейших), резистентность к нему отсутствует.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Септо-спрей применяют для местного лечения асептических и инфицированных ран, заболеваний кожи и слизистых оболочек, ожогов 1 и 2 степени, экзем и дерматитов, а также для обработки операционного и инъекционного поля.



¹ Органический комплекс йода

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Септо-спрей применяют наружно, нанося его на пораженные участки путем распыления с расстояния 10-20 см от поверхности до ее визуального покрытия лекарственным средством. При лечении асептических и инфицированных ран, ожогов 1 и 2 степени, экзем и дерматитов Септо-спрей наносят 1-2 раза в сутки в течение 5-10 дней. При необходимости перед нанесением препарата проводят туалет раны.

Лечение слизистых оболочек полости рта и глотки проводят нанесением лекарственного средства путем нажатия на насадку-спреер на пораженные участки 2-3 раза в сутки в течение 5-10 дней. Перед распылением рекомендуется промыть слизистые оболочки теплой кипяченой водой. Нельзя поить и кормить животное в течение 30 минут после обработки Септо-спреем.

Обработку операционного и инъекционного поля проводят путем распыления с расстояния 10-20 см до визуального покрытия подготовленного участка кожи. Обработку проводят дважды, дав обработанной поверхности подсохнуть.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Гипертиреоз, индивидуальная повышенная чувствительность животного к йоду (в том числе в анамнезе) и другим компонентам препарата.

ОГРАНИЧЕНИЯ



0 суток



0 суток

СРОК ГОДНОСТИ

2 года со дня производства, после вскрытия флакона - 60 суток.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Температура, частота дыхания, частота пульса у здоровых животных

Вид животного	Температура тела (в градусах)	Число ударов сердца в минуту	Частота дыхания в минуту
КРС	37,5-39,5	50-80	12-25
МРС	38,5-40,0	70-80	16-30
Свинья	38,0-40,0	60-90	15-20
Птица	40,0-42,0	150-200	12-30 (курица)
			16-40 (голубь)
			10-20 (гусь)
			16-30 (утка)
Лошадь	37,5-38,5	24-42	8-16
Собака	37,5-39,0	70-120	14-24
Кошка	38,0-39,5	110-130	20-30
Кролик	38,5-39,5	120-200	50-60
Верблюд	36,0-38,6	32-52	5-12
Олень	37,6-38,6	36-48	8-16

Продолжительность беременности здоровых животных, количество потомства и масса новорожденного

Вид животного	Продолжительность беременности, дней	Количество потомства, голов	Живая масса новорожденного, кг
КРС: молочные породы	279-281 (280)	1 (иногда 2)	20-35
мясные породы	284-289 (285)	1 (иногда 2)	25-50
Овцы	144-156 (150)	1 (часто 2)	3-4
Козы	146-157 (150)	2	2,5-3
Свиньи	110-118 (114)	8-16	0,8-1,5
Лошади	320-355 (336)	1	35-60
Собаки	56-65 (63)	8-12 (крупные породы)	0,2-0,6
		6-10 (средние породы)	
		2-4 (карликовые породы)	
Кошки	56-63 (60)	4-6 (рождаются слепыми)	60-70 г
Кролики	28-33 (31)	7-9 (рождаются слепыми)	45-60 г

Половая цикличность у здоровых самок животных

Вид животного	Наступление течки после родов, дней	Продолжительность течки, дней	Период относительного покоя, дней	Прекращение течки в связи с возрастом, лет
Корова	20-50	16-32 часа	18-24	20-22
Овца	15-35	1-2	15-19	8
Коза	16-30	1-2	14-20	8
Свинья	55-60	1-3	18-22	6-8
Кобыла	8-9	2-11	21-23	22-27
Сука	4-5 мес.	9-14	22-24	10
Кошка	30-50	9-15	15-28	10
Крольчиха ¹	4-5	-	4-6	4-5

¹ У кроликов течка обусловлена процессом спаривания, а также временем года

Продолжительность родов и отделения последа

Вид животного	Продолжительность раскрытия шейки матки	Средняя продолжительность изгнания плода	Средняя продолжительность отделения последа после родов
Корова	до 12 ч.	от 20 мин. до 6 ч., в среднем 3 часа	до 3-12 ч.
Коза, овца	около суток	от 15 мин. до суток	до 3-12 ч.
Свинья	2-6 ч.	Первый плод через 2-6 ч., остальные через 2-20 мин.	Вместе с плодом или вскоре после родов
Кобыла	от нескольких часов до 1-2 дней	30 мин., иногда 5-10 мин	Вместе с плодом или через 5-30 мин., реже через 2 ч.
Сука	3-6 ч.	от 10-15 мин. до 12 ч.	
Кошка	3-6 ч.	от 10-15 мин., до 3-7 ч.	

Нормы водопотребления

для сельскохозяйственных животных, л на голову в сутки

Вид животного	Расход воды на поение	Вид животного	Расход воды на поение
Коровы	65	Ягнята и козлята	3
Нетели	40	Собаки	0,9
Молодняк старше 6 мес.	25	Кошки	0,3
Молодняк до 6 мес.	10	Кролики, норки, соболи	3
Лошади взрослые	50	Лисицы, песцы	7
Молодняк до 1,5 лет	35	Куры	0,25
Лактирующие свиноматки	25-35	Цыплята	0,12
Хряки	8-10	Индейки	1,0
Свиньи супоросные	12-20	Индюшата	0,7
Поросята-отъемыши	1-5	Утки	0,75
Подсосные поросята	1-2	Гуси	1,3
Овцы и козы	8	Цесарки	0,3

НОВИНКА

ФЕРТОКСЕЛ



По рецепту

АЛЬТРЕНОГЕСТ С ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ВКУСОМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА СВИНЕЙ ОТ КЛЮЧЕВОГО РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

- ▶ Специальная формула на высококачественном масле с корректором вкуса
- ▶ Проверенная эффективность
- ▶ Российское производство по GMP гарантирует стабильность поставок

НИТА-ФАРМ – КЛЮЧЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ РОССИИ

В тесном взаимодействии с ветеринарными
врачами-практиками мы глубоко изучаем
потребности рынка и лучшие мировые
инновации

30+
ЛЕТ НА РЫНКЕ

Наша цель – не просто достигнуть высочайшего
качества, но и превзойти ожидания наших
клиентов, предоставляя им лучшие продукты,
которые делают мир лучше каждый день



**МЫ – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ
НОВЫХ ПРОДУКТОВ
В РОССИИ**

22

ПАТЕНТОВАННЫХ
ПРОДУКТА

20 НОВИНОК
за 2025 год

ВСЕ О НОВИНКАХ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

САЙТ



WWW.NITA-FARM.RU

В КОНТАКТЕ



[@nitafarm](https://vk.com/nitafarm)

ТЕЛЕГРАМ



[@nita_farm](https://t.me/nita_farm)

MAX



[@nitafarm](https://max.ru/nitafarm)