NITA-FARM®
ветеринарная фармацевтика

ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

МЕРАДОК®

Дораметин 1%
Раствор для инъекций

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ СО СВЕРХДЛИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ РЕИНВАЗИИ



ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ

Мерадок®

Стальная преграда



ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЙ ПРЕПАРАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ АВЕРМЕКТИНОВ, ПРЕОДОЛЕВАЮЩИЙ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ИВЕРМЕКТИНУ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СВЕРХДЛИТЕЛЬНУЮ ЗАЩИТУ ОТ РЕИНВАЗИИ






ПРЕИМУЩЕСТВА

- Срок защиты от реинвазии - 28 дней
- Курс лечения - 1 инъекция
- Преодолевает резистентность к ивермектину

СОСТАВ


1 мл МЕРАДОК = 10 мг доранектин




ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Доранектин - основное действующее вещество Мерадок, связываясь с рецепторами клеток мышечной и нервной ткани нематод и членистоногих, увеличивает проницаемость мембран для ионов хлора, вызывая блокаду проведения нервных импульсов паразитов.

Доранектин легко резорбируется с места введения и достигает максимальной концентрации уже в течение 4-5 суток. Фармакокинетические свойства доранектина обеспечивают длительное сохранение терапевтических концентраций ДВ в организме животных, что обеспечивает их защиту от паразитарных заболеваний и реинвазии в течение 28 дней.



Дорамектин относится к последнему поколению макроциклических лактонов и является продуктом жизнедеятельности микроорганизмов из семейства стрептомицетов.




Дорамектин получают путем мутационного биосинтеза, где мутировавший штамм Streptomyces avermitilis был использован для производства авермектинов.

ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Вид животного	Дозировка	Способ введения
КРС	1 мл на 50 кг	Подкожно
МРС		Внутримышечно


Мерадок обладает доказанной 100% эффективностью при однократном применении и сохраняет защитное действие в течение 28 дней.

График 1. Длительность действия Мерадок



Длительность действия Мерадок превосходит цикл развития саркоптоидных клещей, что гарантирует защиту от реинвазии.

График 2. Изменение концентрации дорамектина в сыворотке крови после применения Мерадок



Применение Мерадок в рекомендуемых дозах для теплокровных безопасно. Инъекции препарата безболезненны и не вызывают стресс у животного. Благодаря экономичной дозировке Мерадок вводится одной инъекцией, что менее травмирует животное.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Мерадок назначают крупному рогатому скоту и овцам для лечения и профилактики заболеваний, вызываемых нематодами желудочно-кишечного тракта, легких, подкожной клетчатки, слезных протоков, личинками подкожных и носоглоточных оводов, вшами, чесоточными и иксодовыми клещами.

Крупному рогатому скоту Мерадок применяют при заболеваниях, вызываемых:

- нематодами желудочно-кишечного тракта (половозрелые и личинки): Ostertagia ostertagi (включая инкапсулированные личинки), O. lyrata, Haemonchus placei, H. similis, Trichostrongylus axei, T.colubriformis, T. longispicularis, Mecistocirrus digitatus, Cooperia oncophora (включая инкапсулированные личинки), C. pectinata, C. punctata, C. spatulata, C. sumabada (синоним Mcmasteri), Nematodirus helvetianus, N. spathiger, Bunostomum phlebotomum, Strongyloides papillosus, Oesophagostomum radiatum, Trichocephalus discolor;
- легочными нематодами (половозрелые и личинки) – Dictyocaulus viviparus;
- нематодами слезных протоков – Thelazia spp.;
- подкожными нематодами – Parafilaria bovicola;
- личинками подкожных оводов: Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum;
- вшами: Bovicola bovis, Haematopinus eurystemus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus;
- саркоптоидными клещами: Psoroptes bovis, Sarcoptes bovis, Chorioptes bovis;
- иксодовыми клещами – Boophilus microplus;
- аргасовыми клещами – Ornithodoros spp.

Овцам Мерадок применяют при заболеваниях, вызываемых:

- нематодами желудочно-кишечного тракта: Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta (половозрелые и личинки, включая резистентные к производным бензимидазола), Haemonchus contortus (половозрелые и личинки), Trichostrongilus axei (половозрелые и личинки), Trichocephalus ovis, T. colubriformis (половозрелые и личинки), T. vitrinus (половозрелые и личинки), Cooperia curticei (личинки), C. oncophora (половозрелые и личинки), Oesophagostomum venulosum (половозрелые), Nematodirus spp. (половозрелые и личинки), Strongyloides papillosus;
- легочными нематодами – Dictyocaulus filarial;
- чесоточными клещами: Psoroptes ovis, Sarcoptes ovis;
- личинками носоглоточного овода – Oestrus ovis.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Убой крупного рогатого скота и овец на мясо разрешается не ранее чем через 70 дней после последнего введения препарата. В случае вынужденного убоя животных ранее установленного срока мясо может быть использовано в корм пушным зверям.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет со дня производства, после вскрытия
флакона - не более 90 суток.

Для записей

Для записей

Для записей

NITA-FARM®
ветеринарная фармацевтика

ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ
ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ ЖИВОТНЫХ

НИТА-ФАРМ – КЛЮЧЕВАЯ ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ РОССИИ

В тесном взаимодействии с ветеринарными врачами-практиками мы глубоко изучаем потребности рынка и лучшие мировые инновации

30+
ЛЕТ НА РЫНКЕ

Наша цель – не просто достигнуть высочайшего качества, но и превзойти ожидания наших клиентов, предоставляя им лучшие продукты, которые делают мир лучше каждый день

Good Manufacturing Practice Certification
GMP Quality

МЫ – ЛИДЕР В РАЗРАБОТКЕ НОВЫХ ПРОДУКТОВ В РОССИИ

22
ПАТЕНТОВАННЫХ ПРОДУКТА

20 НОВИНОК
за 2025 год

ВСЕ О НОВИНКАХ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

САЙТ
WWW.NITA-FARM.RU

ВКОНТАКТЕ
@nitafarm

ТЕЛЕГРАМ
@nita_farm

MAX
@nitafarm